



Ad Revell. D. Jacobum Vercelloniam
a Patricio Arto Reverentium ac
Phil. ^{proptantissimum}

Vercellone tuus liber hic, que ^{corbis} conspiciat
Est dignus calamo, ingenio: tuo;
Plurima namq: aperit, non primis publica facta
Nec non permagno, parva labore docet.
Quid tibi pro meritis referet nunc ordo meritorum?
Quae statuet laudi digna trophaea tui?
Regia, te excipiet gaudens, Heliconia ~~Bractea~~ ^{Bractea}
Laurigero et serbo, cinget Apollo comas;
Sic eterna tui vivunt monumenta laboris,
Et tua laus, pariter fama, pervenit exit.

Debite observantia, ac affectione
monumentum posui
Joh. Martinus Canda Phil. et Med.
Poeta

[The text on this page is extremely faint and illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. It appears to be a handwritten letter or document.]

VERCELLONI

OPERA

MEDICA

VERCELLONI
OPERA
MEDICA

I A C O B I
V E R C E L L O N I
P E D E M O N T A N I

Phil. & Med. Doctor.

SECIMINA MEDICA DVO

ALTERVM Anatomico-Physicum Continens
Inuenta Noua circa *Deglutitionem, Vera Di-*
gestionis Instrumenta, & circa Vermes;

ALTERVM Medico-Practicum De *Pudendorũ*
Morbis, & Lue Venerea

Sacro Excellentissimoque

SENATVJ MEDIOLANENSJ

ET NOMINATIM

D. LUCAE PERTVSATO

Præsidi Amplissimo

D I C A T A.

ASTÆ Typis Ioannis Baptistæ de Zangrandis Superiorum permisso 1715.

Ab ipso Auctore dono missus

HERODOTVS

In Polymnia.

NISI Diuersa intèr se Sententia dicatur, non potest quis eligere meliorem; Sed necesse habet eà, quæ dicta est, vii. At cum plures dicta sunt, licet tanquàm aurum purum deligere: quod per se discerni cum nequeat comparatum cum alio discerni potest.

Amplissimis , Prudentissimis , Sapientissimis ,

TOTO ORBE

CÉLEBERIMIS VIRIS,

PRÆSIDJ,

SENATORIBVS

COETERISQVE ORDINIBVS

Inclyti , Augusti , Sacri

SENATVS

MEDJOLANENSIS

PATRIÆ PATRIBVS,

DOMINIS CLEMENTISSIMIS

SAL. ET FELIC: PRECATVR

JACOBVS VERCELLONVS PEDEMONTANVS.

J Gnotus Ignotos quærit Mœ-
cenates, PATRES CON-
SCRIPTJ; quærendi tamen
vnica hæc ratio est, quòd cupit
ha-

E P I S T O L A

habere notissimos. Vsq̃ue adeò nã
que infita est animantibus quibus-
uis illa *Storgi*, seù Parentium er-
gà Liberos propensio, vt nemi-
nem inuenire sit tam voccordem,
qui credere velit Foetus suos nisi
perspecto. Quarè & cùm mihi
obtigerit aliquandò Libellum hũc
abortiuisse, cùmque adeò inani-
mem penitũs atque informem
Numini cuipiam deuouendum
duxissem, cuius, tanquàm alte-
rius *Lucinæ*, amplexu Vitam for-
mamque adipisceretur, nil pro-
indè aliud suspiciendum fuit,
quàm Sublime *Nomen Vestrum*
ceù cuius iubar vbique fulgidum
mihi

DEDICATORIA

mihi iccirco non poterat non esse
conspicuum . Etenim planè eò
Dignitatis Virtute euecti estis ,
VIRI ORNATISSIMI , vnde
totus illustratur Orbis ; nec quis-
quam est tam novus istius Incola,
qui radios Sapientiæ *Uestree* non
sentiat , aut non demiretur . Te-
stis huius rei fidissimus est Histo-
ria , testis Iurisprudencia , testis
denique ipsa imprimis *Medicina*
nostra , quæ aliàs facta propria
in aliena inquirere inassueta , qu-
ùm tamen eorum satagit , quæ
siuè *Medici* decorum , siuè publi-
cas calamitates concernunt , nihil
aliud in medium iàm offerre no-
uit ,

E P I S T O L A

uit, quàm Sanctiones ac Edi-
 cta SENATUS MEDIO-
 LANENSIS. Quo factum, vt
 in ijs obseruandis toti sint Pro-
 fessores Nostri, vtque vel nu-
 perimis hisce diebus ipsorum
 Elogia è Borealibus vsque Ca-
 thedriis fuerint evulgata*. Quam-
 uis, haud ex auditu tantum;
 Fama Excelſi *Vestri Nominis* ad
 me peruenerat insupèr ex obtu-
 tù: quùm nimirùm in meà pe-
 regrinatione Italica in *Urbem*
Vestram delatus ea tùm nosse
 potui, quæ aliàs nec somniaſsem
 quidèm. Uidi scilicèt [loquar
 cum Epirota illo Romà quon-
 dàm

* *Lipsia à Ioan.*
Bohn. l. de Off. Med.

DEDICATORIA

dàm reduce] Urbem Orbi parem , Arcopagum Vrbi , & quam tot Reges , quot *Senatores* implebant . Et ne illa memorem , quæ siuè Maiestatem , siuè Regimen *Uestrū* concernunt [vtpotè quæ incomprehensibilia , à Suttore etiām , qui vltra crepidam , vtaiunt , iudicium ferre non debet , dignè satis extolli nequeunt] dicam solummodò vidisse Me Splendentissimum illum *Medicorum* Confessum abs *Vobis* in subsidiū Pauperum *Ægrotantium* quotidie conuocatum , & qui adeò verè , *Corona Pietatis Vestre* appellari meretur : *Medicorum* itēm

§

simul

E P I S T O L A

simul consultantium Modestiam
per *Uos* (teste *Septalio* Vestro)
ijsdem inculcatam ; Xenodochio-
rum denique Amplitudinem ,
Diuitias , Administrationem ,
quæ certè nil aliud sapere viden-
tur , quàm Magnificentiam , Li-
beralitatem , Pietatem *Mediola-*
nenſium . His itaque notitijs, tan-
quàm ducibus instructus , quidni
in hac inopia mea rectà in *Uos*
respexissem , quosque Animo per-
petuò gestabam non habuissem
presentissimos ? Cùm , inquam ,
secus *Uos* , Foetum hunc alijs tra-
didissem informandum , ac luce,
qua

DEDICATORIA

quà ipsi carent , imbuendum liquissem? Restat duntaxat, vt ignoto mihi, Supercilio *Vestro* benignè annuatis ; sique tantum Patrocinium affectaui, memineritis, **PATRES CONSCRIPTI**, Tenuia ingenia , nisi audeant, nihil esse , & cùm auiculæ ipsæ quò humiliores eò altiùs nidulari contendant . Deus *Vos* Uestrasque familias diù seruet incolumes, caducisque his bonis omnibus satiatos eternùm tandèm fortunet ac beet .

Vouebam SanDamiani apud Astenfes pridie Kal. Decemb. **MDCCXI.**

MDCXXI

Assentis p[re]dictis 14. Decemb.

Venerabili 24. Decemb.

best.

toe certain land in town of

duelphus his house contains

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of

land in the town of



SERIES

Paruorum Initiorum,

Quâ &

HVIVS DISSERTATIONIS

Contextus explanatur.

PROOEMIUM

- | | | |
|-------|--|---------|
| I. | M edicinæ dignitas | pag. 1. |
| II. | M Extenuatur à Pseudo-Medicis. | p. 2. |
| III. | Veri Medici sunt & Philosophi. | p. 4. |
| IV. | Quotuplex sit Philosophia? | p. 5. |
| V. | Experimentalis omnium partium Philo-
sophiæ Princeps. | p. 7. |
| VI. | Intér Experimentalia verò eminet Ana-
tomia. | p. 9. |
| VII. | Ut & inter Anatomica excellit ea cog-
nitio, quæ concernit Chylificationem. | p. 10. |
| VIII. | Authoris iccirco de hac re deliberatio. | p. 12. |



SEC

S E C T I O P R I M A

De Glandulis OEsophagi Conglomeratis.

I.	Masticationis explicatio integra	p. 20.
II.	Deglutitionis verò defectuosa	Ibid.
III.	Et quare?	p. 21.
IV.	Unde & Chiloseos expositio falsissima	p. 30.
V.	Quid propterea Author tandem decreuerit.	p. 31.
VI.	OEsophagi magnitudo, figura, situs;	p. 35.
VII.	Partes continentes, & 1. Tunica Membranosa.	p. 37.
VIII.	Tunica 2. Musculosa.	p. 40.
IX.	OEsophagi diuisio in duos Tubos.	p. 42.
X.	Ulterior Authoris inquisitio in istos Tubos.	p. 43.
XI.	Novi excretorij ductûs ad eosdem Tubos.	p. 44.
XII.	Primum illorum par à glandulis Gastricis Conglomeratis.	p. 48.
XIII.	Structura huiusmodi glandularum.	p. 50.
XIV.	2. par à glandulis Dorsalibus Conglom.	p. 55.
XV.	Glandulæ Dorsales Conglomeratae.	p. 58.
XVI.	3. par. à glandulis Bronchialibus Conglom.	p. 61.
XVII.	Glandulæ Bronchiales Conglomeratae.	p.
XVIII.	4. par à glandulis primæ Diuisionis Asperæ arteriæ Conglom.	p. 65.
XIX.	Glandulæ primæ diuisionis Asperæ Arteriæ Conglomeratæ.	p. 66.
XX.	5., 6., nonnunquàm etiàm 7. par à glandulis Trache-	

Trachealibus tergeminis <i>Conglom.</i>	p. 68.
XXI. <i>Glandulae</i> Tracheales triformes .	p. 69.
XXII. <i>Postremum par à glandula</i> Thyroidœa <i>Congl.</i>	p. 75.
XXIII. <i>Glandula</i> Thyroidœa <i>Conglomerata.</i>	p. 76.
XXIV. <i>Admonitio circa apparentiam</i> Ductuum <i>enunciatorum.</i>	p. 79.
XXV. 3. <i>Tunica</i> Neruea .	p. 80.
XXVI. <i>Novi</i> Lymphæ ductus <i>ad hanc</i> <i>Tunicam.</i>	p. 84.
XXVII. <i>A glandulis</i> Iugularibus <i>Conglom.</i>	p. 87.
XXVIII. <i>Crusta</i> Vvilosa .	p. 89.

S E C T I O S E C V N D A

De Humore verè Digestiuo.

I. <i>Uſus</i> <i>Tunicæ</i> Membranosæ,	p. 91.
II. <i>Ut &</i> Musculosæ.	p. 92.
III. <i>Officium</i> novorum ductuum,	p. 93.
IV. <i>Nec non</i> Troclearum.	p. 94.
V. <i>Cūr</i> OEsophagus <i>divisibilis in</i> duos Tubos	Ibid.
VI. <i>Munus itém</i> glandularum <i>Conglomerat.</i>	p. 99.
VII. Gastricarum.	p. 101.
VIII. Dorsalium.	p. 102.
IX. Bronchialium	p. 103.
X. Primæ diuisionis <i>Asperæ</i> arteriæ.	p. 106.
XI. Trachealium.	p. 107.
XII. Thyroidœæ	p. 111.
XIII. <i>Uſus</i> Thymi.	p. 112.
	XIV.

XIV.	<i>Ratio situationis glandularum eiusmodi Conglom.</i>	p. 116.
XV.	<i>Officium denique Tunicae Nervosae.</i>	p. 117.
XVI.	<i>Crustae Uvilosae.</i>	Ibid.
XVI.	<i>Et Succorum stagnantium in Oesophago.</i>	p. 118.
XVIII.	<i>Humor glandularum Oesophagi Uasculovessiculosarum verum est fermentum Digestivum.</i>	p. 119.
XIX.	<i>Probat 1. ex multitudine, atque ex diversitate Opinionum de hoc fermento.</i>	p. 119.
	<i>Opinio Petri Castelli.</i>	p. 120.
	<i>Helmontij.</i>	Ibid.
	<i>Riolani.</i>	p. 121.
	<i>Gabrielis Fontani,</i>	Ibid.
	<i>Petri Borelli.</i>	p. 122.
	<i>Sennerti.</i>	Ibid.
	<i>Craanenij.</i>	Ibid.
	<i>Hogelandi,</i>	p. 123.
	<i>Iacobi de Bak.</i>	p. 124.
	<i>Joannis Maior.</i>	p. 126.
XX.	<i>Probat 2. à falsitate earundem Opinionum Ostenditur falsitas 1. 2. 3.</i>	Ibid.
	<i>Quarta.</i>	p. 127.
	<i>Quinta.</i>	Ibid.
	<i>Sexta.</i>	p. 128.
	<i>Septima.</i>	p. 129.
	<i>Octava.</i>	p. 130.
		p. 131.
		Nonæ

Nona.	p. 134.
Decima.	p. 136.
XXJ. Probatur 3. positivè, & 1. ratione falsedinis liquoris supradicti.	p. 158.
XXIJ. 2. Ratione fusionis.	p. 160.
XXIIJ 3. Ratione commixtionis cum re fermentanda.	p. 160.
XXIV. 4. quia est homogeneous cum alimentis.	p. 126
XXV. 5. nec non etherogeneous.	p. 167.
XXVJ. Quomodo soluat alimenta.	p. 170.
XXXJJ. Quæstio, An solutio alimentorum sufficiat ad Chylificationem?	p. 172.
XXVIJJ. Respondetur, quod non.	p. 174.

S E C T I O T E R T I A

De Vermibus.

J.	Quidnam prætereà requiratur?	p. 179.
IJ.	Re Vermes, aut istorum Oua:	p. 181.
IJJ.	Probatur hoc ex ipsorum existentia in uno- quôque Viuente:	p. 183.
JV.	In succo nutritiuo Planarum,	p. 184.
V.	In OEsophago Avicularum.	p. 189.
VJ	In OEsophago Canino.	p. 191.
VIJ.	In OEsophago Humano.	p. 193.
VIIJ.	Glandula Thyroidæa merum Vermium est Ouarium.	p. 194.
IX.	Probatur Experientia.	p. 195.
	* *	X. Et

- X. *Et Ratione Autoptica.* p. 204.
- XJ. *Oua Verminosa homini sunt connaturali :* p. 206.
- XIJ. *Elucitur Sententia Veterum de Vermium
Generatione* p. 207.
- XIIJ. *Reijcitur altera Recentiorum à Vallisniero* Ibid.
- XIV. *Opinio Vallisnieri manca.* p. 214.
- XV. *Confirmat Nostram.* p. 217.
- XVI. *Sol. Verminosi Seminis fecundatio est
homini præternaturalis* p. 220.
- XVIJ. *Pr obatur denique Oua Verminosa esse
principium illud Chylificativum supra
quæsitum ex ipsa vermium structura* p. 221.
- XVIIJ. *Ex accidentibus Verminosi, & reme-
diorum antelminticorum actione.*
- XIX. *Satisfit obiectis, & respondetur aliquibus
quæsitis.* p. 237.
- XX. *Concluditur proinde, nil Deesse humori glan-
dularum Conglomeratarum OEsophagi
ad veri fermenti digestiui rationem.* p. 246.
- XXI. *Probatur s. hæc Conclusio à simili.* Ibid.
- XXIIJ. *In Cane,* p. 247.
- XXIII. *Sue,* p. 252.
- XXIV. *Vitulo,* p. 254.
- XXV. *Explicantur phænomena Digestionem con-
cernentia, & 1. Fames,* Ibid.
- XXVI. *Sitis.* p. 259.
- XXVII. *Morbi.* Ibid.
- XXVIJ. *Remediorum Stomachiorum actio.* p. 262.

EPILOGUS, SEV CONCLUSIO

- I. *Ergò liquor glandularum OEsophagi verum*
est fermentum Digestivum, p. 268.
- II. *Et est duplex.* Ibid.
- III. *Solutivus,* p. 269.
- IV. *Et Transmutativus.* Ibid.
- V. *Hic é glandula Thyroidœa* p. 270.
- VI. *Ille emanat é reliquis.* p. 271.
- VII. *Vera OEsophagi descriptio.* p. 272.
- VIII: *Perfecta denique Deglutionis explicatio.* p. 272.

Errata,

QUæ proptér Authoris absentiam innumera occurrere debuerunt, Benignus Lector condonabit, idem atque emendabit.

EX Commissione Ad. R. P. Lectoris Jacobi Bonatti Ord. Præd. Vicarij Generalis S. Officij Astæ, perlegi opus, cuius titulus est de *Glandulis OEsophagi Conglomeratis, Humore vero Digestivo &c.* elaboratum à D. IACOBO VERCELLONO PEDEMONTANO & nil in eo, quod lædat Fidem Orthodoxam, aut bonis aduersetur moribus, aut pias offendat aures, animaduvertere valui, ideoque prælo dignum, nec non publicæ vtilitati profuturum censeo: Alie 30. Septemb.

F. Dionysius de Belmont Seruita, Regiæ Celsitudinis Sabaudie Consiliarius, & Theologus: In Vrbe Astæ Examiner Synodalis, & S. Officij Consult.

CVM iussu R. P. Jacobi Bonatti Vicarij S. Officij Asten. legerim librum cui titulus IACOBI VERCELLONI PEDEMONTANI *Phil. & Med. Doctoris de Glandulis OEsophagi Conglomeratis humore vero digestivo, & Vermibus dissertatio Anatomico-Medica*, in eoque nihil contra Fidem, bonos mores, & Principes sed tantum quæ Iatrices in augmentum collimant deprehenderim, ideò publicum in bonum imprimi posse candidè testor

Jo. Baptista Vulpinus Asten. Urbis, eiusque Ditionis Pro Archiater, &c.

Attentis Præfatis attestationibus

IMPRIMATUR

F. Iacobus Bonatti Ord. Præd. Vicarius Generalis, Sancti Officij Astæ.



J A C O B I
VERCELLONI

PEDEMONTANI
PHIL., ET MED. DOC.
DE

GLANDVLIS OESOPHAGI
CONGLOMERATJS,

HVMORE VERO DIGESTIVO

ET

UERMIBVS

DISSERTATIO

ANATOMICO-MEDICA I.

Proœmium.



ARTEM præ coëteris à Summo
Opifice commendatam, cuius
Elogia Mortalium Sapientissi-
mus conscripsit, quamque
Magnates Orbis gratia, hono-
re, laude nullo non tempore profecuti sunt,
Artem, inquam, Medicam alias vniuersas

J.
medicina
dignitas.

Eccles. 38.

multis

*Ab ipso meo Auctore, mihi perquam cara, dona
missa.*

multis parasangis anteire quid mirum ?
 Ars est verè *Ars artium*, summa discipli-
 narum; meta, obiectum, cumulus, imò
 & amplissima facultatum omnium encyclo-
 pedia. Nàm de facto; si quævis ars, aut
 scientia ad *vita* vtilitatem directa est: vti-
 litas autèm maxima in *sanitate* sistitur, iux-
 Flid. 6,30 tā eiusdem *Sapientissimi* illud, *Non est census*
 Jn Leg. *suprà censum salutis corporis*; aut *Platonis*
 hoc aliud, *Primum ac potissimum* rectè va-
 lere: si, inquam, *sanitas* totalis est *Me-*
 3. Pat: *dicina* scopus, quemadmodùm & *Medi-*
cus Magister vita audit *Scaligero*, quid su-
 perest? nisi, vt dicamus cum hoc ipso,
Liberalium artium illustrissimam esse Medi-
cinam, cuius pedissequæ sunt omnes, quæ ad
Vitam, Victumque paratæ sunt etiám fabri-
cæ genera omnia &c.

IJ:
 Extenua-
 tur à Pse-
 udo-me-
 dicis.

Jn Leg.

Verùm in hac prærogatiua gloriæ non
 tam præstantia *Artis*, quàm insufficien-
 tia *Artificis* sæpè deprehenditur. Quip-
 pè, cùm illa omnia complectatur, hic
 aliquandò nihil, ad extremum neutrum
 in utròque inuenitur. Conquestus est de
 hac iactura mecum iamdudùm etiám *Hip-*
pocrates: Medicina (sic enim habet eiusdem
Textus) *omnium artium præclarissima est;*
verùm

verum propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, & ob vulgi ruditatem, quod tales pro Medicis iudicat, & habet, iam eò res devenit, ut omnium artium longè vilissima censeatur. Quicquid nihilominus adhuc mitius huius criminis inculpandus est vulgus. Simiam enim agit plerumque; & sapientes, quos interdum imitari affectat, vel invident *veris Medicis* (nempè, ut *vescentium dentibus edentuli*, ex *D. Hieronymo*) vel minus sapiunt, quam ut de ijs iudicium ferre valeant, vel incuriosi sunt, aut alijs quibuscunque manibus agitati: quæ causa est, cùm de illis, non nisi quoád exteriorem corticem, hoc est nomine tenus tantum, iudicium ferre valeat; utque vulpes elusa à ciconia, lambat vitreum vas, pul-tem haut attingat. Ast mininè tamen omnium excusari merentur illi (bestiæ, potius, quam homines) quotquot illotis, ut aiunt, manibus pedibusque; sine pera, loco, viatico, vno atque altero aphorismo duntaxat in memoriam congesto, paucisque receptis à Magistro patre filijs nonnumquam magis sciolo habitis, tanta demùm supellectile, quanta neque ad Agyrta sufficeret, raptim ad *Æsculapj* fanum

Hist. Nat.
29.

in præf. ad
lib. de Of-
fic. Med.

fanum se se conferunt ibidè m vel abstru-
fiora *Medicina* myſteria tractaturi : ac ne-
que interim porrò aliud præſtant, quàm
quòd, teſte *Plinio*, *alienis periculis diſcant*,
experimenta per mortes agant, atque animas
hominum negociantur. Horum equidem occa-
ſione factum eſt (inquit *Bohnius*) cùr in *Me-*
dicos in uniuersum, ſeu horum artem, tot
iniurioſa ac inepta dictèria atque ſcommata à
diuerſis fuerint prolata, ut audito vix *Medi-*
ci nomine, auari, maleuoli, nequitioſi, men-
dacis, fraudolenti, ac gloriabundi hominis-
nomen plerique mortalium audire ſibi per-
ſuadeant : & uſqueadeò quorundam *Medico-*
rum malitia in omnes, qui *Artem hanc pro-*
fitentur, ex communi opinione translata ſit,
ac à paucis nonnullis artificibus in uniuersam
Artem vitium transfuſum, ut probus quiſ-
que ac peritus *Medicus ex Medicorum ordi-*
ne deleri cupiat.

IIJ.
Veri Me-
dici ſunt,
& Philo-
ſophi.

Attenim verò [ſubintrat hìc denuò *Hippo-*
crates] ſimilimi eiufmodi *Medici ſunt perſo-*
nis, quæ in tragoedijs introducuntur; quemad-
modum enim illi figuram quidem, & habitum,
ac perſonam eorum, quos referunt, habent,
illi ipſi autèm verè non ſunt : ſic, & *Medici*
fama quidem, & nomine multi, re autem,
& opere.

Et opere valdè pauci. Quod nimirum indicat decere æquum cordatum ac genuinum *Medicum* omni scientiarum genere abundare, planè vt *Ars*, quam excolit, vniuersum, vt dictum est, ambitum claudit humanarum intellectuum: competere, inquam, *Medico* veracem esse Sapientiæ amatorem, non friuolum ac personatum. Ettenim, vt per hanc homo cœteris animantibus præesse solet, sic & *Medicus* alijs artificibus quibuscunque. Quid? quòd hic illud insuper peculiare habet ex Sapiencia, vt non tam parem exhibere se possit *Arti*; verum & sapiat plusquam hominem. Siquidem eiusdem *Diuini Senis Oraculo Medicus Philosophus* l. de decen. Orna. *Deo æqualis*.

Tametsi non fugit, & sæpè meipsum moneo, videam, animaduertam, meminerim quàm difficilis comparatu hæc sit Sapiencia, idèst Philosophia, præcipuè quoad illam partem (*Timorem Domini*) in qua & Sapienciæ initium, iuxta *Regium* JV. *Vatem*, & Sapiencia ipsa (eiusdem *suprà citati Sapientissimi dicto*) tota consistit. *Terrena* quippè hæc quandiù magis obuia sunt, æterna minús consideramus

Quotuplex sit Philosophia

Psal. 119.

in Institu-
tion. ma-
nuscrip.

in Prom.
l. 2. de
Plac. Phil.

in Lexic.
Castell.

mus ; & prætereá , intellectus nostri miræ angustæ , vtpoté qui ægrè illa percipit , quæ antè pedes sunt : quanto itaque minús immortalia , immarcescibilia , sempiterna ? *Hæc arcana* (repetam hîc , quod olim & à me alibi dictatum est) *cùm solus D.O.M. nobis revelare possit , illi non solum eadem docenda linquamus ; verùm etiã pro nobis horum secretorum affectus deprecemur , animosque dedamus nostros cœlesti modestia temperatos , aliòqui servos inutiles , malos , rebelles , ingratos , alienos , uti nos ille suos faciat filios suo immenso atque ineffabili spiritu mentes nostras complens ignotus mortalibus , admirabili que opulentia sceleratas linguas has suo regens nutu , ut nobis salutaria , grata ipsi docere liceat . Ec.* Missis igitur , quæ suprà nos , & quæ nihil ad nos , ceù Physicos , spectare dixit Zeno : quòd cœteras Philosophiæ partes , Metaphysicam scilicet , Mathematicam , Physicam , Ethicam , Politicam , & Æconomicam , quæque nec vera Scientiæ sunt [inquit Piccolomineus] ; sed formidolosa potiùs quædam veluti opinationes : harum singulas , Brunonis decreto , scitu necessarias esse Medicis extrá dubium est.

Quic-

At nihilominus tamen hæc ita accipiē-
da venit huiusmodi necessitas, quasi ex sciē-
tiæ à Medico indifferentè apprehendi de-
beant, atque eodem modo. Inest quippè
ordo cùm in rebus omnibus, tùm præci-
puè in scientificis, quem pervertere scien-
tiarum amatorem iniquum est. Videndum
igitur potiùs quænam earum prioritatem
postulet, quæque posterioritatem. Cogno-
scet autem hoc quivis facilè, qui nouerit
intellectum esse duplicem, ad cognoscen-
dum, atque ad faciendum: vndè Scientia,
& Ars, quas non principijs, sed fine distin-
gui docent Philosophi. Ex quo adeò infer-
tur discenda esse à Medico imprimis, quæ
finem ipsius spectant, idest, quæ Artem:
deindè, tanquàm ab obtento puncto, line-
as quoquouersum debere duci ad circuli
peripheriam, siuè animum erigi ad vni-
uersalitatem. Quo stante; requiruntur ad
Artem comparandam singularium notio-
nes ab *Experientia*, & *Animaduersione*; ad
Scientiam verò sufficiunt comprehensiones
per intellectum: *veluti si quis* (exemplum
est iterum permagni *Hippocratis*) *de subli-*
mibus in aere rebus, aut de subterraneis dicat
Et quomodo se habeant sciat, tamen neque di-
centi

V.
Experi-
mental
omnium
partium
Philoso-
phiæ pr-
inceps

l. de Vet.
Med.

de Plant.
lib. 1.

de 3. The-
ophrast.
de caus.
Plant. c. 1

centi, neque audientibus manifestum satis fue-
rit vera-nè sint, an secús; neque enim est, ad
quod quis se conferat, cuique innitatur, ut
veritatem cognoscat. Medicina verò iám ab
antiquo existit, & principium, & via inuen-
ta, per quam inuenta & multa, & probè
habentia comperta sunt: per multum adeò tem-
pus [nota Diuini Vatis augurium] & reli-
qua deinceps inuenientur, si quis idoneus sit,
& iám inuentorum gnarus ex his ad perqui-
rendum procedat. Iuxta quod itidè Aristoteli
præceptum est, ab exemplis naturæ pe-
tendas esse rationes nostras, non ab argumentis
nostris rerum naturas subuertendas, ut liquet
ex eius libris. Et fanè ex laudabili insti-
tuto hoc (experiendi scilicet, atque ob-
seruandi) quantum vel vnius sæculi curri-
culo profecerit, Medicina nostra, neminem,
credo, latet. Prædixerat hoc ipsum etiám
non itá pridè Scaliger suprà laudatus:
Experimentalis Philosophus, inquit [idest
Naturalista, aut Physicus] ex se parit omnes
scientias, quæ versantur in materia; & Medico,
Musico, Astrologo, & Nauta, & fabris om-
nibus, & ipsi coquo dat, quæ ipsi adhibitis certis
prescriptionibus exerceant: perindè, quasi
sola experientia sufficiat ad maximi artifi-
cum

cum, *Medici*, entelecheiam, siuè perfectionē

His non obstantibus; quandoquidē vel in ipsa naturali, seu experimentalī sciētia complura inuenire est satis infirma, multa quòque minùs necessaria, venit indagandum quid in illa tutissimum, ac potissimū habeatur, vt eidem, velut ad clavum, alligato filo inextricabilem naturæ labyrinthum rimari subindēque euadere queamus.

Certissimum autē est hoc, *Nihil nobis notius, quàm ipsi nobis*: vndē & Delphicum illud NOSCE TE IPSVM; quod tametsi ad animum transferri soleat, à *Cartesio* eiusdemque affeclis, propriè tamen Corpus audit, & cū præsertim *Notitia corporis prior sit notitia mentis*, quemadmodū contrā illum neruosè disputat amplissimus Præceptor meus *P. Hieronymus Sacherius* in *Alma Ticinense Mathematicum Professor* celeberrimus, Vir nonnisi cum elogio mihi nominandus. Vndē adeò constat præfici debere à *Medico* exactam *Anatomes* notitiam alijs quibuscunque ceū minùs manifestis eò ampliùs, quòd hæc sciētia ad omnes alias viam sternere dicitur *Galeno*; siuè, vt ipsius verbis vtar, *quòd summoperè conferat ad supremi Numinis cognitionem.*

B

Iam

VJ.
Inter experimental. verò
eminet
Anatomia.

In Medit.
tat.

In lib. de
Anim.
manuscr.

I. de os.
Part.

VIJ.
Vt, & in-
ter Anat-
omica ex-
cellit ea
cognitio
quæ con-
cernit
Chylifi-
cationē

Hist. An.

Jàmque in hac deductione præeminen-
tiarum sequitur inuestigandum quænam
Anatomicarum animaduersionum alijs an-
teponenda sit, vtque quadratus lapis in
substructione præmittendus. Circà quòd
profectò iuvat meminisse quemadmodum
adæquatum *Medicinæ* obiectum est *vita con-*
seruatio; ac propterea, quòd vti *vita à victu*,
[vndè & nomen est] pendet; sic Medico
incumbere videtur, vt ea primitùs addif-
cat, quæ Corporis *Nutritionem* spectant;
ac minimè quaquàm quòad alimenta,
duntaxat, siuè quòad istorum seriem at-
que historiam; verùm quòad Mechanicam,
siuè instrumenta eadem in genuinum cor-
poris nutrimentum conuertendi. Namque
alias *alimentum* (si *Aristoteli* credimus) est
totum id, quod futurum est hoc, cuius ratione
dicitur *alimentum*, atque in sensu Phisico ni-
hil est aliud, quàm materia, ex quà coete-
ra omnia fiunt: siuè, sunt quinque illæ
minutiæ corpusculorum terrestrium, aque-
orum, salinorum, sulphureorum, & si
libet, etiàm mercurialium, quæ mutua
sua textura & alimentum ipsum, & tem-
peramentum ipsius elementare compingunt
Nutrimentum autèm *Chylus* est, Sanguis est,
imò

imò, & nutritiua istius pars ipsis Corporis particulis approprianda, & assimilanda. Interest itaque Medico ante omnia nosse quo pacto *Chylus* iste ex alimentis resultet, & quo itidem artificio paretur. Jacta siquidē sunt in hoc fundamenta *Artis*, suprā quibus adeò nobis, qui omnia metimur ex ipsis, tutò liceat exēdificare. Et de facto quid de Microcosmo suo garriat Philologus, Institutionista, aut Anatomicus cuius componentes partes haut nouerit? *Partes enim corporis* [ait *Etmullerus*] *sub triplici differentia sunt: nempe sunt vel contentæ, vel continentes, vel impetum facientes. Inter contentas verò partes eminet imprimis: Chylus, siue Lac, & Sanguis, liquores Corporis primarij & primogenij, ex quibus vegetabilium nutritiuo succo omnes partes solidæ, siue continentes conflantur, quæ huius materiae proximarationi itidem in sanguineas & spermaticas immediatè ex Chylo oriundas subdiuiduntur. Quid itidem agat Practicus cū methodicus, tū præcipuè rationalis? cum probè nescius fuerit quam-nam in Ventriculo remedia sua sint passura alterationem. Celebre profectò est *Willisy* hac de re iudicium. Quandoquidē medicamenta (sunt eius verba) sicut, & alimenta iisdem inge-*

*Instit.
Medic. 3.*

*Pharmac.
Rat. sect. I
c. 2.*

ingeruntur vijs, & per eosdem ubique feruntur ductus, idcirco velut ad Chyloseos, ita ad Pharmacie rationes, & fiendi modos rite intelligendos partium ac viscerum, in quibus dramata utraque ista peraguntur notio summe necessaria existit. Nouere hanc certè considerationis huiusmodi necessitatem Medici præsertim hodierni, quibus adeò iam nihil antiquius, quàm vt Artem suam ex tali Chyloseos contemplatione, tanquàm à capite, nuncupent rati non decere ipsos commentationum suarum initium aliundè desumere, quàm vndè & humanum corpus suum arcessit.

VIIIJ.
 Authoris
 propterea
 super
 hac re
 delibera-
 tio,

Quæ iccirco cum altè iamdiù pectori infedissent (ex quo scilicet nobilissimæ istius *Artis* rudimenta posui) nihil arbitratus sum vnquàm magis conducturum ad meam ipsius iam abditioribus eiusdem Sacris initiati felicitatem, quàm & ne functionis prædictæ secretum quoquo modo effugisset. Quapropter statui prius, quàm pedem vlteriùs in prouinciam conferrem, omnem, quod aiunt, lapidem mouere, omnia experiri, nihilque intactum relinquere, quod ad instrumenta Chylificationem supradictam celebrantia cognoscenda pertineret, idque
 tametsi ru-

rudis, tametsi puer, atque ad labores ferendos omnino inhabilis: Quid enim prætereà non coegisset propositum in eo opere emolumentum ac glorię pundus? Ad hunc igitur finem aggressus sum statim extrinsecus à me, nempe ex alyis, sciscitari, quid de eiusmodi organis usque adeò prolatum esset: pellegi nimirum Authorum gravissimorum monumenta, Professores celeberrimos sanioresque *Artis* Mistagogas ubique ac diutissime conueni; Nec tamen (nescio quo fato id factum sit: an ex naturæ improbitate? fateor potius ingenij tenuitatem) ex tot commentationibus, responsionibus, thesibus, quibus me perpetuò adieci, nihil uspiam extorquere potui, quod auidum veritatis animum fatiarit. Comperi sanè nonnulla à quibusdam prolata, quæ ingenuorum ex parte fidem promerebantur; ast nec pauciora interim emergebant æqualis ponderis, imò nonnunquam grauiora, quæ meum à prioribus assensum abstraherant: veluti cum legebam dari in nobis humorem, *fermenti* nomine, cuius vi præmansi in ore cibi dissoluantur in Ventriculo ac digerantur, hoc luce meridiana clarius mihi constabat; at non sic

porrò, quod subyciebatur, liquorem scilicet illum esse aut *salivam*, aut *succum* quendam ex lateribus ventriculi transudantem, aut utrumque simul, aut Chyli à proximè prægressà Chylificatione reliquias in fundo eiusdem ventriculi restitantes &c.. Quandoquidèmliquebat ista hæc energia eiusmodi carere, quæ siuè ad solutionem, siuè ad alimentorum in chylum trãssformationem præfatam desideratur. Ob quam rem porrò quantas passus sim animi iactationes is videat, qui dubia quandòque nouerit, neque tamen copiam habuerit elligendi meliora: siquidem cum *Homero*

Odiss.

— *Nec apparuit ultra.*

Tellus, sed nobis cælum undique, & undique Pontus.

Quin imò, quò plus vigiliarum in elucubrationibus eiusmodi impendebam, eò indoctior euadebam: sicque in luce rerum tenui caligabam, in mediocri coecutiebam, in maximà coecus eram. Deus bone (erumpebam proptereà tacitus sic deindè mecum contrà id genus explicationū?) hæcciné igitur Ars, quam sellegi! infida, fallax, dubia, principijs obscurissimis innixà! His, inquam, regulis ipsa infirmitate

tate infirmioribus *Medicus* se comparabit ad citas, tutas, iucundasque sanationes! Verùm non tam diffidentia in *Artem*, quòd viderem hanc ab ipsa, vt aiunt, ianuà aberrare: ast maxima imprimis Medicorum Principum væcordia apparebat, qui nolunt rem alitèr se habere, quàm ut ipsi aliquandò dictarunt. Quo adeò factum, vt, cùm eosdem comperissem de re dubia, tam tenacitèr sentire, sic ipsorum auctoritas mihi imposterùm suspecta fuerit. Atque hinc planè in hac opinione mea confirmatus negocium, quod præ manibus erat, cum solo naturæ libro conferendum, duxi missis alijs quibuscumque vel coelesti calamo exaratis: nimirum sibi, non alys fidendum est bono Philosopho. Quid enim turpius, quàm ex omnium rerum domino ac dictatore intellectu nostro mancipium, efficere alienæ libidinis? Quamobrèm, & profanæ superbiæ putem vbique negligere auitam prudentiam, & absurdum reuerentiæ genus, quod nos perpetuò aliorum institutis velit addicere. Authorum enim ingenia multis difficultatibus ob rerum nouitatem circunueniri debuisse quis est, qui nesciat? Vndè prisci illi Sapientes *Chilificationis*,

rationis, siuè *fermentationis in ventriculo* vel inuentores, vel cultores videntur quædam minús exactè tradere coacti. Sic enim comparatum est in natura omnium principiorum, vt quoniam femina cohibeant in se omnia futuræ molis, confusa multa contineant quocircà, vt quidquid venerat in mentem, sæpè importunà inuasionè aliarum commentationum sedes occupauit: quo factum, vt non pauca videamus imperfecta, alia coaceruata, nec pauciora præposita. Verùm enim verò in re tam arduà Marte proprio duntaxat vti periculosa plenum opus alex. Memineram namque quàm parùm constat acies ingenij mei ad naturæ arcana meditanda, ceu qui iuxta *Persium*.

Mecum habito, & noui quàm sit mihi curta supellex;

ex alia verò parte præclara quæque facinorosa stabili firmoque talo sistenda esse vtcunque perspicuum est. Quapropter, & temeritatis notam mihi potius inflictam iri suspicabar, qui nempè vellem rebus iam vnius sæculi assensu comprobatis veluti dicam scribere, animumque assuescere ijs, quæ doctissimus quisque nequàquam audeat.

Quid

Quid igitur egissem, aut quommodo me
ab eiusmodi angustiis liberare potuissem?
Ad extremum tamen spem errigere cæpit
illud *Euripidis*:

in Bæchid

*Attenim trophœum nobile haud unquàm viri
Statuere pauidi; —*

cui occinebat hoc aliud *Theocriti*,

in Syrac.

*— Tentando ad Troiam venerè Pelasgi,
Cuncta puellarum pulcherrima perficit Vfus.*

Quidni igitur ipse paritèr expertus essem
saltim.

Quid valeant humeri, quid ferre recusent?
tanto magis quòd calcar addebat testimoniũ
Senecæ pollicentis exæquatum iri aliquando
ab vno, quod cœteri intactum reliquissent.

*Multa nàmque, ait, egerunt, qui ante nos
fuerunt, sed non peregerunt: multum adhuc
restat operis, multumque restabit: neque ulli
nato post mille sæcula præcidetur occasio aliquid
adhuc adyiciendi. Itèm. Veniet tempus, quo
ista, quæ nunc latent, in lucem dies prorhaet
Et longioris aui diligentia: veniet tempus, quo
posterì nostri tam aperta nos nescivisse mira-
buntur. His ergò velut stimulis incitatus
tandèm operi me accinxi, inque eo tandiũ
meditatus, tandiũ moratus, tãdiũ tergiuer-
fatus sum, vt iam videar mihi aliquid te-*

Epis. 7.

nere, quo antea carebam: videlicet lippi-
 re videor illud fermentum, quod ad *Chyli-*
ficationem supradictam euincendam expeti-
 tur: rectè-ne autem viderim, an secus, de
 hoc penes alios iudicium sit. Vsq̃ue adeò
 namque insita est mortalibus illa philautia,
 idest amor sui, vt neminem tam modestum,
 tam attentum, tamque oculatum inuenias,
 quin in proprijs æstimandis quãdam ani-
 mi propensione coecutiat atque hallucine-
 tur. Qui si adeò erroris monitus fuero, pa-
 linodiam canere, meque iterum in meam
 pelliculam conuertere vtique non grauabor.
 Tempus enim, si Deus me & iuuentute
 hac mea, & reliquis subindè ætatibus ali-
 quousque frui concedet, vtrò aderit melio-
 res his nanciscendi aues: sin ita, acerbos
 hos fructus seuerioribus consilijs maturare
 non desinam. Coeterum ista (siuè epiphil-
 lida appelles, siuè præiudicia, parum
 moror) veluti ramum, tametsi carthace-
 um, atque illi Æneidum longè ab similem
 Dijs *Medicinæ* Arbitris offerre, ac Tholis
 Virtutum ipsorum suspendere vsque volui
 intendens hoc ampliùs, exhibere nimirum
 me infimul quasi specimen Magistratibus
Artis, quo cognoscant, an ego Nouitius,

Ty-

Tyro-Medicus Diuinum, Sacrum, periculofumque Artificium meritò aliquandò tandem fim proffeffurus. Sed ad rem.





SECTIO PRIMA

DE GLANDVLIS OESOPHAGI CONGLOMERATIS.

J.
Mastica-
tionis ex-
plicatio
integra.



Rimùm itàque innegabile vide-
batur, quod vulgò de *Mastica-
tione* circumfertur; cibum vide-
licèt duriorẽ primò dentibus
Caninis & Incisorijs, postmo-
dum Molaribus perfringi, motùque Lingue
Buccis ac Labijs sepiùs in ore volui, saliuâ
imbui ad meliorem vtcunq; saporem,
commistionem, digestionem, fermentatio-
nem &c. Quatinùs liquet negocium illud in-
strumentis huiuscemodi in vniuersum vti-
que expeditum iri.

II.
Degluti-
tionis ve-
rò defec-
tuosa.

Pariformitèr & quod subindè de *Deglu-
titione* recitatur: cibum iam masticatum
atque ad radicem Lingue perductum istius
motu ac eleuatione ad Oesophagum moueri
vltrà Laryngem & Epiglottidem: & quod
posterior deindè in hoc motu Lingue incur-
uetur & supra Laryngem se, instar Pontis
inflectat; quòd isto interim sex priores
œso-

OEsophagi musculi distenti partem eiusdem posteriorem fursùm atque extrorsùm expandant parte anteriori depressa atque omninò patula : & quòd denique cibo potùue in Gulę orificium proiecto præfati musculi statim ab operatione cessent, ac loco ipsorum se contrahant aly OEsophagi ipsumque OEsophagi initium constringentes, vt materiam in illo contentam vltèrius protrudant. Ettenim ista, quatenùs conformari plurimùm cum suo obiecto conspiciebam, eatenùs verà apparebant, & ne saltem notabilem aliquẽ linquerent dubitationi locum.

At non sic porrò, quæ ad extremum de eadem *Deglutitione* venditantur : constrictionem OEsophagi, adeòque & cibi potùsue protrusionem, vltèrius continuari vsque ad Stomachum per constrictionem, fibrarum annularium tunicæ eiusdem OEsophagi musculosæ: & quòd in hoc penitùs vniuersa istius visceris operatio consistat: siuè, quòd idem est, protrusione illà totum absolui in tali organo cataposeos, hoc est *Deglutitionis*, negocium.

Rationes quippè hinc indè ac passim confluebant, quibus suggerebatur ab eâ fistulà aliquid aliud præstari, & quod structu-

JIL.
Et quare

ræ eiusdem organicæ magis respondeat: id verò imprimis me monebat, quòd viderem illius, nempe OEsophagi, longitudinem tantam existere, quanta plurimis alyis functionibus vnà peragendis vltteriùs sufficeret. Quid enim? Tubus sesquipalmaris, imò aliquandò longior, nauci illi ministerio totus dicabitur! Nonné ad id, amabò, vel bidigitalis superfuisset? *Naturam autem nihil frustra facere* totiès ab *Aristotele* alyisque inculcatum est, vt citare loca sit vel ostentatio, vel superstitio; sed dices, situm Ventriculi paulo remotiorem eiusmodi prolixitatem in OEsophago expostulare. Nec renuo; quicquid neque aliquis inficias ibit, quominùs sub ea causa aliæ non minùs necessariæ venire possint. *Natura namque semper negotiosa est*, neque vilius legibus obstricta multo magis patitur à suis ipsius operibus cogi: idest (cum *Lipso*) *Hunc ad modum partita est Natura vices atque operas in ys, quæ condidit, vt idem non solum diuersis sit diuersum speciebus; sed etiam eodem in corpore alias atque alias comparet affectiones.* Intuere Intestina ex. gr., eadem & chylum perficiunt, siuè præcipitant, separant, exprimunt, colant inque speciales al-

alveolos quosdā gradatim, pro ratione purificationis eiusdem ablegāt: foeces egerunt &c. Qui igitur neget tubum illum propterea aliquo alio munere similiter esse functurum? Replicabis productionē OE sophagi respicere prætereā longiorem sensus gustandi durationem. Esto! quin imò hoc volo; ast ipsum tamen minimè insertum legitur in illa descriptione, quæ de tali viscere habetur. Dicitur enim OE sophagus, quòd sit *Canalis membranofus à faucibus ad Ventriculum protensus ut esculenta & potulenta in eundem Ventriculum diducat*, prætereā verò nihil. Quapropter crediderim potius id officij in OE sophago hactenus ne somniatum quidem fuisse, & cū præsertim Moderni omnes sensationem quamlibet naturales functiones concernentem Ventriculo adscribant, ne quidpiam fortassè derogent *Acido suo Gastrico*, quod in causa nutritionis tanquam omnium artium hominem suspiciunt ac venerantur, nedum verò ceū phantasticum quoddam Idolum, Hircocervum, aut Chimoeram diruere atque abycere satagunt. Demus verò nihilominus OE sophagum ob hanc alteram causam, nempe ad sensum Gustus diutiùs protrahendum, longiorem fieri debuisse

debuisse à natura, quam quòd sola ciborum protrusio poposcerit, annè tamen dicendum erit propterea, his geminis vsibus vniuersam comprehendi eiusdem naturæ tale organon conformantis idæam atque intentionem?

Rursus non intelligebam, quamobrém ad vnam Luram, *Infundibulum* (qualem scilicet esse perhibent *OEsophagum Bartholinus* & coeteri *Anatomici*) compingendam tunicæ plusquam septiformes (si *Verheyenio* credimus) accersiri debuerint? Nempè, præter vnam *Membranofam*, quæ cum externo *Tracheæ*, *Pulmonis*, *Cordis*, coeterorumque vitalium opificiorum habitu inito foedere totum fermè *Thoracem* [vt & internè etiam *Abdomen*] in consensum rapit, insunt eidem *OEsophago* primò alia *Musculosa* dicta, quæ duplici *carnearum* ac tertio *tendinearum* [vt ego adnotaui] fibrillarum ordine contexta est; deindè alia *Vasculosa*, ac rusum alia *Glandulosa*, quibus denique *Nerveam* addit præfatus *Scriptor*. Tot igitur membranas si eum in finem duntaxat comparatas credis, vt *sacculum*, siuè *infundibulum* farciant, occidi, pery nullus sum. Neque enim percipere possum quamo-

l. 2. *Anat.*
Ref. c. 12.

Anat. Tr.
3. c. 10.

quamobrém in tali hypothefi OEsophagus simplicior effe non debuiffet?

Infupér, miffio *communi* inuolucro, *Mufculofa* certè membrana, quæ eiufdem *Gulæ* fubftantiam maiori ex parte confingit, tanta energia pollet, quantâ alia vnquàm. Qui verò cogitet tot viribus opus effe ad bolos fponfe fua deorfum vergentes, & cum præfertim in cliuo lubrici liberi ac penè recti tubuli, ideft ad Pharyngem, conftituti fuerint infrá cogendos? Equidem Inteftina, quæ idem pondus habent extrudendum, quod & OEsophagus (cùm videlicèt quicquid per hunc ingeritur in Ventrículum, idem poft per illa egeratur) vt vt, iterúm, decuplò longiora fint ifto, magisque inuia, feù magé anfractuofa, nihilo feciús tali tantâque vuillorum mufculofo- rum frequentia nequáquam ftipantur.

Uteriús (inquit adhuc idem *Verebyen*) *circà* OEsophagi *structuram* eiusque *tunicas* venit ob-
feruandum, quòd ille *transuerfim* *difsectus* etiám
prima fronte appareat *constare duplici tubulo*
altero alteri superposito, qui *sine alia separa-*
tione præuia facillimè abinvicem diuiduntur
Ec. Quorsúm autèm hæc diftinctio? Si OE-
 sophagus aut cibos in Ventrículum vrgeret
 D dun-

duntaxát, aut, ad summum, etiam gustaret!

Uerùm enim verò dies ante me deficeret, quàm vt enarrare possem singula, quotquot negatiuè ex structura partium petita argumenta me suafum ibant, vt crederem totale illius, nempè OEsophagi, munus haut meritò in toties decantatâ alimentorum protrusione sistendum esse. Seorsùm ergò hæc, & quæ fortassè meliùs cognoscentur infrá, quod affirmatiua respicit: quoties vel exteriorem tantummodò Gulæ habitum contemplabar, toties ipsius præstantia oculis offerebatur quotidie maior. Noueram námque aliàs assistere eidem circumquaque totius Microcosmi machinas primipilares, Pulmonem intellige, Cor & cætera Vitalia; ex quorum proinde consortio & correspondentia mutua aliqualem prærogatiuam in ipsam eandem Gulam redundare debere, quisquis nullo negotio fuisset interpretatus. Deindè, quòque adspexeram satellitium præbere eidem innumera alia corpora imprimis glandulosa, quorum aliqua *Vesiculosa* ad Jugulum sita quatuordecim vel in alterutro eiusdem latere à *Warrthono* deprehensa sunt: coetera *Vasculo-vesiculosa*

itè in alias OEſophago proximas regiones ablegata. Ettenim bina eademque inſignis magnitudinis compereram propè Pharingem ſiſti ad carthilaginem Thyroidèam: lateribus autèm eiufdem-met OEſophagi plura interdùm, quàm viginti, & quæ vel parenchimatofa erant, vel carnea, vel ſanguineo-adipoſa; coloris itèm differentis, ſubrui nimirùm, rubri, partim rubri, partim flauī, alteròue medio atri, altero gilui &c. magnitudinis denique omniuariæ. Rurſus circà eiufdem fiſtulæ medietatem quædam collocabantur ad anticam ipſius faciem quatuor aut quinque numero: alia quòque ad poſticam, ſed pauciora, plerumque bina, & quæ ſubſtantiâ à prioribus valdè diſcrepabant; vltimo verò tria aut quatuor iuxtà totiès memorati OEſophagi in Ventrículum inſertionem. Quibus perluftratis, nemo, ni fallor, reputaſſet tot organa tantamque glandularum congeriem, numerum, aut prouentum Thoraci fortuitò incluſum: *Naturam certè (Scaligeri hoc eſt decretum) ſi quis cogitat inconſultò quicquam agere, videbitur ab Ariſtotele, explodetur à Platone, Galeni etiàm iuſſu vapulabit.* Excipiet fortaiſè aliquis, non

*Exerc. 68.
S. I.*

esse temerè factum à Natura , quod lymphæ Thoracem irrigantis inferuit collectioni : neque OEsophago alligatas esse illas glandulas; verùm potius Trachææ, Pulmoni, Cordi , alyfque partibus , quas nempè ipse sepe atq: alluere videtur. Propter quod, & quatinus *nullum dissentaneum potest predicari de dissentaneo affirmatè* , vt loquuntur *Dialectici* ; siuè , quòd, quæ Natura disiunxit in rebus , ea etiam nos disiungere debemus per propositiones in Arte, stolidè quis censuerit, glandulas illas vnius Gule gratia in Thorace fuisse reconditas . Ad quod respondeo . quòd quæ nobis vulgò tradunt Anatomici de Glandularum conglomeratarum officio suspecta esse debent . Quippe quòd , si demas Cerebrum , Hepar , Lienem , Pancreas, Renes, & siquæ sunt alia , reliquæ eiusmodi glandulæ non alio munere fungi dicuntur , quàm colligendi illam , seu resumendi lympham suprà allegatam : & nihilominus tamen quantum vel substantiâ , vel structura eæ differant inter se nemo non nouit . Qui ergò nesciat diuersam partium dispositionem diuersas in corporibus importare facultates . Verùm de Vsu , vt & de fabrica , seu differentia
gland-

glandularum conglomeratarum vniuersim,
 & speciatim ad OEsophagum *alibi* erit dis- Sect. 2.
 serendi locus. Pro arabone hic tantum sit
Vesiculosas omnes, vtpote complura vascula
 dimittere cōpertas, quę in venas refundun-
 tur, aut in alias cauitates, nedum lym-
 phe collectioni, istius potius generationi;
 aut, ad minimum, instaurationi vacare:
Vasculo-vesiculosas autem, cum proprio ex-
 cretorio vase ditatae sint, peculiaris cuius-
 dam liquidi secretioni. Quo posito, quā
 fiat, quæso? si, vti cuilibet liquere potest,
 Trachea, Pulmo, Cor &c. tali recremento
 minimè egeant.

2. nempè ad instantiam de connexione
 dictarum glandularum cum yis partibus po-
 tius quàm cum OEsophago, resp. non va-
 lere illationem, ideò non influnt, quia
 non cohærent; cum videamus quotidie
 vel in ipso-met corpore plures partes ab
 inuicem longè semotas, & quæ nihilominus
 intima inter se commercia exercent: *Natu-*
ra [inquit Author suprà citatus] *valet in* Exerc. 175i
eodem corpore, in eodem subiecto multas par-
tes, non solum diuersas; sed et contrarias tum §. 3.
congregare, tum perficere atque etiam conser-
uare. Hinc Hepar, Pancreas &c. vt vt ab In-
 testi-

testinis separata ys tamen vnicè allaborant. Quid ? quod distinctionem recensitarū glandularum ab OEsophago fieri debuisse reputabam, ne istius motus impediretur.

3. *Interoga iumenta* [vt est in *Sacris Paginis*] & docebunt te: Videbis namque in Cane glandulas illas adeò insitas ipsi OEsophago, vt horum neutrum absque alterius intetrimeto diuidere valeas. Et demum annè citrà spem foret inuenire emunctoria illarū glandularum, quæ ad OEsophagum desinant?

Mitto, quæ aduersus Theoriam Medicam passim ab explicatione illa emergebant absurda, quæque aduersus Praxin adeò, vt omnibùs pensitatis conycere mihi licuerit ad extremum, quòd, quemadmodum vsus OEsophagi genuinus, nempè integer ac perfectus. Physicos adhuc latuit ita & *Deglutitionis* expositio, quæ ceu conclusio ex eiusmodi *premissa* erui debebat, mutila, manca, imò & ne inchoata quidè haftenus extiterit.

Deglutitio autè siquidem via est ad *Chylificationem* [quasi scilicèt, quòd, vtì *Prima Digestio fit in Ore*, ex trito illo Medicorum veriuerbio ; sic iam ex nunc dicere non ambigam secundam in OEsophago celebrari)

IV.
Vnde &
Chylofe-
os expo-
sitio fal-
sissima.

ri) si proindè factum foret, vt qualiter suspicio ad me deuenit, illius processus integer Phisycorum mentem nundùm subierit, Chylificationis systema hucusque proclamatum corruat necessum est; hoc eliso, quid in Anatomicis sanum asseruatum iri putas? Rectè certè *Poeta*.

Orsus mali finis malus,
cui alludit hoc aliud Logicorum: *Ex falso nunquam potest sequi verum*, abyssu scilicet, vt in adagijs est, abyssum semper inuocante. Quo factum, vt quicquid de cibi, potûsue in chylum conuersione inflatis buccis haftenus publicatum est, id mihi non tam suspectum, quàm & omninò falsum, prætereà habendum fuerit, ac præcipuè illud: *cibum iam in Ventriculo conclusum undique, & totum imprægnari saliva, & humore acido undique transudante ex lateribus Ventriculi*; vt cuilibet hæc nostras in OEsophagi fabricam atque vsum animaduersiones haut lippis oculis inspecturo fiet palàm.

Aeol.

Ettenim non tam errata cognouisse, quàm iisdem postea supplere *Medico*, vt & alij cuius Artifici palmarium est; at cui tamen facinori asuescere nundùm poteram.

Si-

V.1
Vothoris
propter
super ha-
ere deli-
baratio.

Siquidem metuëram, ne, dùm aliorum
 castigatores esse vellem, ipse castigari meri-
 to meo deberem: & cùm præsertim solas
 rerum umbras intueri valeam; ad clarissi-
 mum autem Naturæ lumen, ut noctua ad
 solem, cœcutiam. Deerant pariter consilia
 ad id agendum, duces, viæ, cœteris qui-
 buscunque in alienos omninò sensus con-
 spirantibus. Quid igitur facerem, aut quò
 me verterem nesciebam. Decreueram ali-
 quandò iccirco sphalmata illa Posteris re-
 linquere emendanda; sed vetuit id statim
 pietas necessum esse persuadens defectus
 cuiuslibet, etiam leuissimi, castigationem
 maturare: quamobrè & vel imbecilles po-
 tiùs animi mei sensus promulgandos esse
 ita, ut saltem glacies frangatur, quo me-
 liora ingenia etiamnùm concretum illud,
 velut flumen, nauigare, Spartamque
 hætenus incultam ornare atque expoli-
 re queant: quo, iterum, in dubium
 reuocato, quod antehac pro irrefragabili
 habebatur, discant iam *Medici* abs *Cartesio*
de omnibus dubitare; & quo tandem dissimi-
 lium inter se opinionum comparatione Ve-
 ritas è Cœlo (quò se subtractam fabulantur
 ludiones Poetæ) nobis præsentior fiat: quate-
 nus

nus regula est Dialecticorum receptissima
Opposita iuxta se posita magis elucescunt. His
 igitur suasionibus victus prouinciam hanc
 suscipere destinaui; at vix tamen vestigiū
 in eandem posueram, cum enī interpellan-
 tem audio *Galenum* diuque clamitantem,
 non esse errorem quicquid vsque ad præse-
 ntem diem reticuerunt Anatomici; partes
 que omnes, imprimis verò *Deglutitionem*,
 concernentes tanquā, ab yisdem fusè ex-
 positas, vltiori disquisitione non egere:
 Et cum denique *non sit optimi Artificis* [sunt
 eius verba] *singula profsequi.* Quibus pro
 indè, ceū boatibus, territus gressum re-
 ducere iam parabam; sed detinuit me,
 nihilominus rursū ea cogitatio, qua
 conuictus fueram illam partium OEsopha-
 gi descriptionem hucusque exactè tradi-
 tam nullo modo fuisse: id profectò quod
 error-ne, an omissio, appellandum fuerit,
 haud multum refert; illud autem maxi-
 mè, si quidquam non ommittatur. *Boni*
quippe Artificis pars est (reclamabat vicissa-
 tim *Scaliger*) *quā paucissima possit ommit-*
tere. Verū (vt Anonymi cuiusdam sensa
 super hac ipsa re in medium proferam.)
Galenum arbitror illud penè ex super-
 E bia

2. de VS.
Part. 4.

de Caus.
ling. L. 6. 3.

bia dixisse, & quo Philosophos cum omnes
tùm imprimis *Medicos* pronunciatis suis,
tanquam oraculis, omnimodè obstringeret:
utque *sustineremus* (erant illius verba) *ab ea*
veritatis vendicatione, propter quam in peri-
culo eramus, ne in offensionem incideremus infi-
mæ facis eruditorum. Namque aliàs magna
illorum est væcordia, qui nolunt quic-
quam nobis esse novum; horum nihil An-
tiquos latuisse. *Quid enim* [insurgit hîc de-
nuò Scaliger] *cum Galeno interijt universum*
humanum ingenium? Nonnè artes per sæcula
ceperunt incrementa? Vobis ipsis imponitis silen-
tj servitutem? Nonnè hæ sunt scientiæ libera-
les? *Quæ servitus ista sit* (excipit Lipsius) *tu*
(auditorem alloquitur) mecum (siuè cum
Seneca) *aude profaci: Non me cuiquam man-*
cipavi, nullius nomen fero: multum magno-
rum virorum iudicio tribuo, aliquid & meo vin-
dico. Liberum quippè est in Philosophicis
cuicunque & aliena arbitria carpere & sua
defendere, & quibusvis demum armis Ve-
ritatem tueri. Quo stante, vestigium po-
nere exercitationi isti ampliùs non dubita-
ui, viamque aperire singulis, quo quot sci-
re auerent quemadmodum naturales fun-
ctiones illæ (*Deglutitio ac Digestio*) ritè pan-
gantur

de Insam.

Manud.
ad Stoic.
Phil. dis.
5.

gantur. Detegam itaque imprimis qualis & quanta sit OEsophagi structura; tum quis partium eundem componentium usus. His enim probe erutis vix dubito, quin eiusmodi operationum ordo ac ratio, ceu consequentiæ ex suis præmissis legitimè deducantur. Attenim vrò initium, facturo *Anatome*, illa Medicarum certitudinum, (vt in Proœmio patuit) scaturigo, ante omnia inuocanda venit. Lydius siquidè hic est lapis, quo assertionum nostrarū soliditas probari debet; Elice itidem & Cinofura, ad quam, ceu magnes, mens nostra declinet. Cuius tamen ad aras immeritò licet accedam, hoc est, nulla Anatomici indutus prærogatiua; nihilominus qui nescit, primis mortalium ausibus *Deum* fauere, & quibus insuper audere oportet sic nempè, vt interdum *Catum è rudi reddit magistra necessitas*, cum *Suida*.

Sectis ergò Iuuenum hominum repentino præsertim extinctorum [ettenim hæc initio monenda fuerunt, ne exciderent; Senum nempè atque Infantum corpora in hoc casu minùs vsuenire, aut quotiès saltem ductus illi erunt explorandi, de quibus infra; item neque tabida aut alio,

VJ.
OEsoph.
mag niti-
do, figu-
ra situs.

quopiam morbo consumpta, neque diù fun-
nerata &c.) sectis, inquam, statim ab obitu
[id, quod alterum emolumentum erit] il-
lorum cadaueribus, quotquot ad manus ve-
nire potuerunt, OEsophagum, totale illud
Deglutitionis organum, à fronte atque à ter-
go, vt aiunt, hoc est diligentér & vel se-
cundùm minimas partes, examinare cæpi.
Ecce autèm qualis prima eiusdem facies
offerebatur! Canalis quidam oblongus à
Pharynge eiusdemque constrictorio muscu-
lo (quem ad se transmissas alimentitias gle-
bas vlteriùs in OEsophagum impellere su-
prà iam indicatum est) ad Ventriculum de-
sinebat, latitudinis instar tenuis intestini,
figurę alibi rectę, alibi obliquę. Nam cir-
ca quintam Thoracis vertebram paulo dex-
trorsùm inclinabat, cogente ipsum scilicèt
ibidem arteria *Magna*; deindè iterùm
sedem suam in Thoracis medio repetebat:
ac paulo post denique relicto eo, cui hæte-
nùs alligabatur, Dorso, antrorsùm reflecte-
bat ad Ventriculum. vnde adeò situs cer-
nebatur OEsophagus à parte posteriori *As-
perę* arterię initio sumpto à binis inferiori-
bus Colli vertebris, à quibus mox vsque
ad quintam illam eiusdem Thoracis Dorso,

vt

vt dictum est, annectebatur: indèque rursū post liber solutusque exporrigebat se se ponè Pericardium ad Diaphragma, quod subito ingrediebatur per peculiare foramen sibi à Natura comparatum; ac postremò in sinistrum Ventriculi orificium implantabatur.

Et quod structuram: tectus erat is ubique primū *membrana* exili à vertebrarum ligamentis orta penes multos; secūs autē alios vel à Peritonæo duntaxat vel à Pleura. Quicquid in hac controuersia si quis & me de suffragio meo rogaret, non possem non proferre candidè, eorum neminem rectè sentire. Quippè, quod priorum est, obseruauit ego fibras tendinum, aut ligamentorum [de verbis namque non disputo] quæ connexioni vertebrarum vacant nullatenus extendere se se suprā OEsophagum, præcipuè suprā illam partem, quam à Dorso (vt iam iam adnotatum est) seiungi perhibuimus. Quæ igitur eæ talem tunicam texent, aut implicabunt? Quod verò attinet posteriores; comperi sæpè numero membranam Ventriculi extimam, quæ *Bartholino toti OEsophago continua* dicitur, ubi ad Diaphragma deuenit, reflectere suprā lamellam ipsius inferiorem, inque hanc late se extendere

VII.
Part. cō-
ponentes
& l. Tu-
nica me-
mbranosa

l. 2. Anat.
Refer. c. 12

dere ità , vt nescias an , quæ eiusmodi lamellam operit exterior tunica cum exteriori Ventriculi inuolucro continuetur , an hoc cum illa. Par ratio quòque est de Pleura. Hæc ettenim , quicquid OEsofophagum extrinsecus amiciat in Thorace , cum tamen mox in Septum offendit , proycit se , vt ità dicam , suprà lamellam istius superiores , atque ità circulum suum repetit. Quæ causa est profectò , cùr integumentum Gulæ *Membranosum* à neutra huiusmodi tunicarum [Peritonæo ac Pleura) productum arbitrer; & præterea , quia neutra earum ad alterum penetrat Diaphragmatis latus præcipuè per illud foramen , per quod OEsofophagus pertransit. Vitat enim hoc insuper tunica ipsius *Musculosa* , de qua moxmox erit sermo: quandoquidem nimirum ex ea compaginatur interior prædicti Septi substantia quod Meditullium appellatur , affirmante hoc mecum ipso etiam *VVillisio* cuius hic est Textus . *Hoc cuius Septi fabricam intuenti eiusque in Zootomijs motum obseruanti primo aspectu apparebit ; nempe quòd , cum musculo huic composito plures insint fibrarum carnearum series , harum duæ interiores ex utroque OEsofophagi tran-*
seunt.

seuntis latere consita &c. Quarè immeritò quispiam iudicarit fibras Peritonæi & Pleuræ vicissim susdèque excurrere per illud foramen, per quod OEsophagus labitur in Ventrículum. Vt itaque huic mentem aperiam meam, dicam tenue illud velum, quod OEsophagum externè ambit, nec à Pleura, simpliciter, neque à Peritonæo vnicè deriuari; verùm quod secundùm illam partem, quæ Thoraci inclusa est, à priori: secundùm alteram verò, à posteriori ortum trahat, vt liquet. Videantur insuper in hac lite eiusdem *VWillisij, Diemerbroeky*, aliorumque iudicia. Atamen verò vtvt parui apud Anatomicos momenti questio hæc nonnullis videri possit; apud Medicos tamen maiorem, quàm quis duxerit, considerationem meretur. Quippè, cum tunica illa OEsophagi extima *communis* sit, hoc est cum omnibus omninò partibus regionem, in quà ipsa est, incolentibus consentiat; si propterèa accidat illam ab his nonnunquam male habentibus in consensum trahi, neque porrò ratio huiusmodi consensus *Medico* innotescat, planum est huic non mediocre negocium confisum iri posse. Verùm hæc ad Pathologos.

Quod

*I. Pharm.
Rat. §. I
c. 2,*

*Anat. l. 2.
c. 18.*

Quod nostrum est : detracto illo *communi* inuolucro , in conspectum prodyt illicò tunica *Musculosa* in ordine quidè *secunda* dicta, quamuis inter proprias antesignana vocari mereatur , & cum præsertim ipsum OEsofophagum maiori ex parte constituat. Huius autem fibræ spissiores reuerá cernebātur, quàm quòd simplicem decet membranam . Propter quam causam nonnullis *perforatus Musculus* audiri maluit , præcipué *Hoffmanno* , vt qui eam insuper & paralyfi obnoxiam nouit & convulsioni. Et , quod processum attinet huiusmodi fibrarū: duplex is apparebat , alter alteri contrarius . Superiores quippè fibræ rectæ , siuè longitudinales conspiciebantur , inferiores verò transuersales, siuè annulares . Rursus longitudinalium nonnullæ (quia OEsofophagus circà initium latior est) in descensu ad se mutuò inclinatæ hinc indè partibus subiectis implantabantur ; aut certè [inquit *Verebyen*) si alibi angulos efficiunt , hi valdè exigui sunt , ac vix observabiles : licet quis [pergit oculatissimus *Anatomicus*] præiudicio occupatus facilè tales angulos sibi proponeret . Si enim tunicam istam (musculosam) sursum traxeris , in parte magis tensa angulos

los superiora spectantes efficies; è conuerso, si easdem fibras deorsum extenderis. Sed quas nos series, aut ductus, idem Vereyhen dixit tunicas, distinxitque in vnicâ binas membranas; quicquid reuerà hæ non sint aliud, quàm totidem fibrarum diuersi ordines, videanturque velût duo viminum strata vnâ eandemque cratem cancellantia. Quod si tamen ex varijs ductibus varias libet fingere pelliculas, adyciam nunc ego geminæ illi tunicæ *Musculosæ* laminæ etiàm tertiam, quam nescio, quomodò ab Authoribus prætermissa, aut sequentibus membranis fuerit attributa. Aduerti namque in interiori longitudinalium fibrarum superficie quosdam pediculos membranofos eo ordine digestos, quo erucarum cruscula, amplexari continuò in se, atque admittere in spacios, quæ inter binos quoslibet intercedebant, totidem subiectas annulares fibras, subindèque abire in aliud planum à superstantibus omninò diuersum: similiter & alias papillas lanuginosas, quibus inferiores, seu annulares fibræ, vndique obductæ erant, præsertim in concauâ sua parte; ex quarum idcirco nexu & colligatione mutuâ tela, illa denique resultabat, quam addidimus.

Hoc autem stratum si proprio quopiam nomine insignire cupis, in promptu est dicere, quòd, sicuti petiola ac lanugo præfata se habent instar tendinum, siuè ligamentorum, quibus musculosæ fibræ donari solent, & ad quos proindè constitvuntur illi anguli, quos OEsophagus in motu suo vermiculari describit, idest in *Deglutitionis* actione; sic tertia hæc *Musculosæ* membranæ lamina Tendinosa iure vocari mereatur, & quo saltem nihil deesse iudices illi tunicæ ad veri musculi rationem.

IX.
OEsophagi
divisio
in duos
tubos.

Coeterùm arbitrari, quòd eiusmodi subtegmen portio quædam sit aliarum tunicarum vltra existentium, absurdum est. Norunt namque omnes (idque & á nobis suprà insinuatum fuit) constare OEsophagum duplici tubulo altero in alterum inuaginato atque abinuicem facillimè separabili, quorum prior ex tunicis *Exteriore* & *Musculosa* componitur, posterior ex reliquis. In hac itaque disunctione, si ea lamella posteriori tubulo obsequeretur, haud inficiarer, quominus ad istum pertinere posset; verùm cum é conuerso potius priori adhærescat, non video quamobrèm *Musculosa* membranæ iure meritòque adiudicanda sit, & cum

in-

insupèr ab hâc nullo pacto diuelli queat. Sed, misso hâc, conspiciatus postea ægrè factum iri posse, quòd vtì superiores tunicae, sic reliquæ deinceps in conspectum venturæ essent, absque quòd alter eiusmodi tubulorum ab altero seiungeretur, huic operi me accinxi, inque eo statim reperi talem OEsophagi diuisionem perbellè occurrere in inferiori parte, quamuis superiora versus difficiliùs contingeret.

At verò inter separandum tales tubos acciderat sæpenumero iâm plura aduertisse, quæ mediè inter vtrumque offerebantur, & quorum tamen cognitio ad me nundum peruenerat, fortè quia OEsophagi, qui tùm præ manibus aderant à vicinis partibus erant abscissi. Talem ergò remoram pro mea virili supplantaturus negocium, quod mente agitabam, protinùs expediendum censei hoc pacto.

Selectis itâ, vtì iam memini, cadaueribus præcipuè quorum exta adhuc fumare cernebantur, abscidi primò Ventrículum transversaliter ac paulo inferius orificium eiusdem finistrum: deindè circa Stomachum [sic enim infimam OEsophagi regionem appello, quam nempe alij etiâ Cardiam

X,
Vltior
Authoris
inquit.
in istos
tubos.

Neque enim solū
alios red-
arguere de-
bemus, sed
& nostra
inuenta po-
nere & in-
mentionis
modum in-
dicare: sic
enim con-
modius au-
ditorum a-
nimos com-

paramus.
Scalig. in
3 hist. ani-
mal. c. 4. f.
4

vocare consueverunt] aliquale Septi por-
tione relicta collaris instar, in Thoracem as-
cendi ; vbi protinùs vtràque Aorta (vt
cum vulgo Anatomicorum loquar] vel po-
tiùs Carotidibus ac Subclauys ; infernè ve-
rò toto ipsius Aortę trunco, venis insuper
neruisque, quàm fieri potuit, distantissimè
à Corde amputatis, *Asperam* arteriam
percussit indito gladiolo inter Epiglottidem
& carthilaginem Thyroideam: quem qui-
dè ictum secuta post OEsophagi scissio-
ne, totam molem, quà nempè ipse OE-
sophagus, Trachea cum annexis Pulmo-
nibus & Corde, quaque reliqua mox enu-
merata continebantur auellere inchoauit
cum hac tamen cautione: nè videlicèt in-
ter extrahendum illam aliquid in Dorso
relinqueretur, quod ad OEsophagum per-
tineret; verum & nè hoc accideret, palpan-
do ac retinacula paulatim discerpendo, ma-
nu intrà eiusdem Dorfi spinam partemque
OEsophagi posteriorem admota blandèque
diducta, vtcùnque effectum est.

XI.
Noni ex-
cretorij
ductus ad
illos tu-
bos.

Hisce peractis, ac mole illa in asserem
coniecta atque inuersa, frustulum Uentri-
culi supradictum partemque OEsophagi in-
feriorem succidere aggressus sum vsque ad
eum

eum locum , vbi Aorta *Descendens* falsò nuncupata (cùm nimirum *Ascendens* nuppiam reperiatur , sed loco istius Carotidum ac Subclauiarum rami ab Aorta immediate surgentes , vt modò declaravi) OEsophagum sibi ante in comitem adscitum deferit dimittitque.

Hic enim obiter notandum est (& saltèm donec peritissimi in Aortę Viri , atque in Anatomia me magis versati hac de re clariora proferant) Aortę truncum ferè adusque insertionem suam in Diaphragma non esse ità rectum , atque ac ab illis delineatur. Ettenim ipse visus sum mihi conspexisse istum , postquàm paulo ab egressu à sinistro Cordis thalamo deorsum reflexus angulũ exteriora spectantem depixerat , reclinare se se introrsum suprà Dorfi spinam , atque in dextro istius latere alterum angulum describere , donec sensim recurvatus læuorsum iterum accederet , atque hinc tandem recta haberetur in Abdomen per binos processus , qui musculus Diaphragmatis posteriorem constitvunt . Huius autem sinuositatis causam si quæris non aliam ego tradiderim , quàm quæ à *Louuero*, *Ruyschio* alijsque affertur in Facto de distributione

Observant.

*Traët. de
Mnt. Cord
c. 1.*

*in Respon
ad Ep st.
Probl. 5.*

Aortæ statim ab exitu suo á Corde: scilicet ne sanguis, qui cum impetu proycitur ab illo, omninò accurreret ad remotiores partes, vtque adeò flexuris eiusmodi remoratus magis æquè deflueret in arterias Intercoftales, Mediastinas &c; aliòqui angusti osculi vasa ac numeri non infrequentis. Iam verò talis obliquitas in causa erat, cur OEfophagus Aortæ non vbique incumberet; sed ad quintam Thoracis vertebram, vbi hæc à læuo in dextrum latus procurrebat, eandem transfuersaliter commensuraret: mox verò angulum in eodem dextro latere effingentem, (nempe illum, quem adnotauimus) partiatim duntaxat subigeret; ac postremò ab isto in sinistrum latus denuò subtentam obliquè comprimeret vsque ad nonam vertebram, vbi denique leuorsum inclinatam penitus repudiabat.

Igitur vsque ad hunc locum perducta succisione illa, idest longitudinali eiusdem OEfophagi à parte posteriori sursum sectione, me iterum contuli ad Ventrículum: cuius deindè membranis ab inuicem ad Cardiam vsque diuisis, vt propterea tubos OEfophagi supradictos seorsum distrahere incipio, en! video extemplò quendā fibro-

fibrosum, veluti funiculum, obycere se medium inter vtrumque illum tubum, eorumque alterum alteri connectere tam firmo corpore, vt & vltiorem ipforum diuisionem respuere, & manibus, ceu moram, imperare videretur. Iussus itaque hoc nutu abstineo ab opere, iamque scire cupidus an noui quidpiam fortasse id genus fidium caneret, seu portenderet stylo ipsum concutio. Trepidat sane funiculus ad istius diductiones, obsequitur, paret, hoc est vicissim producit ac decurtatur: hoc tamen non obstante haud vincitur, atque vtcunque, licet in diuersa, abstractus integer nihilominus semper remanet. Ad hæc profecto statim credidi ipsum esse aliquem è numero ramorum neruorum, qui, terebrato exteriori tubulo, interiori, qui ferè totus nerueus est, compaginatam iret; quamobrè animo gestiens inuenire saltim vnde is suum exordium ostentaret, in hoc negotio totum studium impendi. Verum ademit opinionem hanc denique sæpius iterata ocularis inspectio, vt qua demum certior factus sum funiculum illum esse merè membranofum ac penè flaccidum fibris longiusculis, nec non insigni cauitate prædi-

præditum : quibus planè argumentis eò paritèr impulsus sum, vt existimarem talem fideculam potiùs vasis sanguiferis accensendam esse . Quamuis ex alia parte iudicium hocce meum rursùs quòque falsum deprehensum est; quandoquidem vltteriùs pro rogato examine comperi ad extremum eiusmodi funiculum comite carere contrà arteriarum ac venarum morem , neque itém sanguine referri, neque demùm quicquam cum arterys commune habere, quicquam cum venis.

XII.
n. ipsorū
par a glā
dulis Ga-
stricis Co-
nglome-
ratis

Increbuit ergò amor idcirco plenius agnoscendi quid id rei esset; inque hunc finem porrò introducta in pridem animaduersam cavitatem , à qua liberalissimè excipiebatur, seta , hanc leui appulsu adegì in interiorem OEsophagi tubum, re protinùs exteriora versùs minùs succedente . Quamobrem suspicatus vas esse illud quoddam ad eundem OEsophagum ducens , tentamina renouaui , hisque mediantibus perspectum mihi factum fuit denique tale vas ad Cardiam, siuè ad Stomachum, terminare in ea OEsophagi parte , quæ Ventriculo affinis est. Et quod hunc terminum, obseruaui postea setam illam , vbi ad primorem interioris

terioris tubuli præfati tabulam [quæ *Verheyen* tunica *Vasculosa* est] deuenerat, vltra ampliùs non posse excurrere, vasculo nempe, seù funiculo totiès repetito, in comp-lura minora distributo. Horum igitur progressum postea sciscitatus inueni eadem primò ingerere se se rectâ in medioxumam laudati tubuli contignationem, membranam *Glandulosam* ab eodem Authore indigetatam; mòx verò obliquè omninò, idest postquàm in alias adhuc minores propagines subdiuisa prædictam *Vasculosam* laminam exararant atque aliquatenùs præcinxerant. Hoc enim facto vniuersim dehiscabant in cauam antè indicatam OEfophagi superficiem per minimulos quosdam poros in *Nervæa* eademque vltimâ [penès totiès citatum Authorem] eiusdem interioris tubuli lamella existentes, ac *Vuilloso crusta* demùm obductos. Lætus ergò ipse noui vasis iàm saltim terminum aduertisse ad istius quòque originem præstolandam remis, vt prouerbiali figura vtar, velisque contendì. Concusseram autèm ob id ipsū fortassis stylo argenteo; cùmque vidissem postindè idem vas amplitèr, prolixè ac liberè moueri per exteriorem tubum infrà existen-

tem [interiore interim manu sursum elato] in eam incidi sententiam, istud vas longè à *Musculosa* membrana procedere: ac propterea, ne & in indagine fortassis deperiret idem, aut elaberetur, secui prædictum exteriorem OEsophagi tubum, verbo *Musculosam* tunicam, lateralitèr iuxtà eum locum, per quem funiculus eiusmodi pertransibat; quo factum, vt eodem hoc postea è sede sua disturbato aduertere potuerim, quatenùs locus ille foramen erat, instar trochleæ, rotundum ac perpolitum: per quod adeò haud mirabar, quamobrèm totiès nominatum vas liberè illinc mouere se se, hoc est adduci, reduci, accedere, recedere, verbo reciprocare valuisset: deindè quòque obseruauì propendere ab altera, quæ nempè à foris erat, eiusdem vasculi extremitate quoddam Corpus membranofum in diffito, longè ab OEsophago, collocatum suprà collum Ventriculi non nihil versùs posteriora; in quo scilicèt demùm latere comperi exordium prædicti vasis.

XIIJ.
Structur.
eiu modi
glandula-
rum.

Porro itaque ad istius, nempè *membranosi corporis*, enucleationem digressus reperi idem primò duplex, triplex, interdùm etiàm quadruplex, hoc est totidem alijs

cor-

corporibus minutioribus seriatim digestis concretum, & quæ tandem vnâ eâdemque exteriori tunica obuoluebantur. Quod singula; detracta hâc pellicula communi, examinare cepi illud, quod propinquissimè omnium annectebatur dicto vasi; atque hinc planè adspexi fuisse istud omnium maximû, videlicet crassitie fabæ æmulum, figura, infernè planum, coeterà quasi sphericum., aut potius ad hemisphærij figuram accedens: nisi quòd in conuexa superficie sua, duobus, tribusue anfractibus notabatur, ceû in totidem lobulos esset distinctum, colore denique subrubrum, aut ex rubro variegatum. Ex hac igitur figure asperitate, argumentatus sum protinùs tale corpus glandulam esse aliquam è numero Conglomeratarum. Sic enim appellantur *quotquot ex varijs, quasi minoribus, glandulis exurgunt cum aliquali superficiei suæ inæqualitate*. Et fanè, si structuram attendas: amiciebatur vndique istud corpus membrana propria tenui quidem, ast aliôqui firma; à qua sustentabantur plurimæ arteriæ *Celiacæ* ramificationes, vt & aliæ sanguinem reportantes, quæ in *Gastricas* venas exonerabantur: è quarum iccirco flexu ac plexu mutuo ea

Dissert.
Anat. 2.

tandem pictura resultabat, quæ in *Pia* meningē alijsque membranis conglomeratas glandulas occingentibus obseruatur. Insupèr delapsa ab hoc velamine arteriarum capillaria (venosa namque non peruadunt ob rationem *alibi* allegandam) altè se se in dicti corporis parenchyma condebant; vbi post in minimas propagines subdiuisa terminabantur ad extremū in exiguos calices, siuè cupulas quasdam membranofas figurâ ijs, quæ glandes quercinas continent, haut absimiles, & carnofis cellulis demùm insertas: quo propterea fiebat, vt capitula illa, siuè potiùs arteriarum extremitates, folliculos quosdam repræsentarent, aut acinos altero medio carneos, altero membranofos; quicquid reuerà carneæ huiusmodi cellulæ nil aliud esse viderentur, quàm pororum arterioforum constrictoriæ, eademque & suspensoriæ fibræ. Ultimò verò inter has fibras, quæ scilicèt tales acinos clauderant, seù quasi concamerabant, conspicui cernebantur parui quidam meatus, aut gurgustiola plerumque oualia, & quæ immediatè ducebant in proximos rivulos per quandam lanuginem sparsam, quæ in hos expandebatur. Rivuli autem, siuè sulci
huius-

huiusmodi membranosi hinc inde à prædictis glandulis prostabant instar paruorum canaliculorum, qui tandem in alios maiores dehiscebant, de quibus impressens. Ettenim ex incisuris illis, siue vallibus externè in conuexa glandulæ superficie adnotatis, descendebant intrinsecè totidem euripi membranosi, qui aut perpendicularitèr omninò, aut obliquè parùm descendebant denique in vnum alium maiorem horizontalitèr ad basin eiusdem glandulæ collocatum; ex cuius postea extremo, illo scilicet, quod OEsophagum respiciebat, foràs erumpebat illud vas, quod noueram è corpore istiusmodi glanduloso in interiorem infernamque eiusdem OEsophagi substantiam, irrepere.

At verò parùm ab exortu suo deflexerat tale emunctorium, cùm se se statim luminibus obiecit aliud magis exile, quod sub eiusdem matrice rependo breuè ducebat ad aliud corpus illi ipsi simile, si molem, duntaxat excipias & figuram. Erat nanque istud priori tenuius magisque rotundum, instar pisi: coeterà, hoc est secundum interiorem habitum, nihil, vt modò innui, ab eadem superiori glandula discrepans.

Antè tamen , quàm hoc svum principium repeteret siphus iste recentissimus alium iterùm excipiebat à tertia glandula proficiscentem, quique rursús magis exilis obseruabatur quàm alter adeò, quòd dixisses istiusmodi vascula æmulari quasi petiola ceraforum, quorum scilicet tria aut quatuor in communem quendam ramusculum abeant, aut potius rivulos aliquot minimos, quorum aly in alios definendo ad extremum flumen quoddam magnificum conficiant, illud inquam flumen, quod ad OEsofagum indè concurrere denunciauimus. Sic ergò etiam quartum vas in tertiũ confluebat &c. Nam quod numerum corporum, eiusmodi glandosorum; nouimus suprà interdùm quatuor dinumerata fuisse: Nunc quod ordinem; haut semper feriatim, vt ibidem paritèr indicauimus, quandòque potiùs aceruatim digesta visa sunt: quod magnitudinem autem; quo plus ab OEso-phago disteminabantur, eò semper minora erant, eorundemque vascula, seu radices membranosæ, magis gracilescebant. Vltteriùs, quod situm earundem glandularum; compertè sunt hæ non rarò seorsùm à Ventriculo procubuisse, nempè sub Dia-phra-

phragmate è regione Lienis : ac tandèm quod ſtructuram ; erant omnes vbique analogæ , ideſt *Vaſculo-ueſſiculofæ* , qualis nimirum fuit illa , quam priori loco deſcripſimus . *Vaſculo-ueſſiculofas* ettenim nominare libet glandulas *quotquot ex multis , quaſi minimulis glandulis componuntur , ceu acinis membranosis ſimul congeſtis , per intercedentia vaſa plurimasque fibrillas coherentibus & communi membrana incluſis* . Sed quidquid de his ſit , quidquid , iterùm , ſitus , numerus ac figura talium glandularum in vnoquolibet ſubiecto multùm varient ; illud certè fallere me nunquàm potuit , vaſculum ſcilicèt ſuprà delineatum , quodque ad Cardiam , ſiue inferiorem OEſophagi regionem , vltimò penetrare nouimus , à conglomeratis yſdemque *Vaſculo-ueſſiculosis* Ventriculi glandulis (quas iccirco *Gaſtricas* appellauimus) denique non propagari ; neque porrò quicquam eſſe aliud , quàm eiufmodi elaboratoriorum excretorium , tubum .

His planè velut illecebris ad noua ſtudia inuitatus antè inchoatam tubulorum OEſophagi diuiſionem vlteriùs exequi perrexì . Seiunxerã autẽ iam vtrumque alterũ ab alte-

ro ,

XIV.

2. par à
Glandu-
lis Dorſa-
libus.

ro, per totum illum tractum, qui à Ventriculo ad quintam Dorſi vertebram eſt, ſeu uſquequò partem eiufdem OEſophagi poſtiorẽ in longum me pridem ſecuiſſe retuli: neque porro intrà eoſdem quidquam prætereà ſpeculatus, quod ſaltim conuenientiam aliquam haberet cum priori inuento, in eam opinionem deueni, vt exiſtimarim Naturam iàm in arcanis ſuis mihi reuelandis fuiſſe delatam. Quamuis tamen coniectatus poſteà ibidem noui aliquid contingere non potuiſſe, fortè quòd OEſophagus per totum illud interuallum cuiuſuis organi(vnum ſi demas Septum) conſortium & conſuetudinem reſpuat, bono animo iterum eſſe cæpi: inque ſpem meam priſtinam reſtitutus, inueniendi nimirum rurfus aliquid, præfatam OEſophagi à tergo fuſum ſectionem paulisper prolongaui, quòad ſcilicet Pulmonalis fiſtulæ terminum me aſſecutum fuiſſe incomperto habui; hoc factò nedum poſteà inter ſeparandum ab inuicem dictos tubos prætergreſſus eram locum quintę ſuperadiçtæ Dorſi vertebræ correfpondentem, cum obuiam venere denuò gemina alia vaſcula membranofa, in alterutro tubulorum prædi-

prædictorum, per medium dissectorum latere vnum, & quæ rursus media inter vnum & alterum se obyciebant, in reliquum vniformia, sibi inuicem parallela, ac tandem longitudine paria illi, quod nuperri-
mè dictum est è Ventriculi collo ad Cardiam ascendisse, quamvis crassitie aliquantò minora. Horum igitur capita noscere desiderans, concussi eadem more antè à me recepto (nempè quùm de *Cardiaci* modò nominati ductûs exordio decernendum fuit) blanditèr stylo argenteo; qua motione mediante perspectum habui demùm quatinûs tales canaliculi expeditè accurrerent recurrerentque per exteriorem OEso-phagi tubum, hoc est per tunicam istius *Musculo-*
sam: in qua aderant iccirco totidem binæ trochleæ parallelæ, id est sub eadem recta linea positæ, vnaquæque inter quatuor fibras eiusdem tunicæ *carneas*, duas nempè longitudinales, ac totidem annulares, quæque ab in simul parùm recedere videbantur; itèr rursùm quatinûs ydem ductus traherent post se singuli svum nodulum peculiarem vtrobique simplicem, membranofum, inæqualem, oblongum ac neque demùm ita compactum, atque ille, quem narrauimus

proximè sinistro Ventriculi orificio adstetisse. Quibus ponderatis, in promptu fuit iudicare, quòd inuolucra, quorum modò à Nobis facta fuit mentio, nihil aliud in se, quàm glandulas *Dorsales*, absconderent. Dicuntur enim hæ adiacere hinc indè à parte anteriori quintæ Dorfi vertebræ. quì igitur alibi eademqueri debuissent? Sed scrupulus nihilominus adhuc restabat, an videlicet, cum tales glandulæ sat superque Anatomicis pateant, mihi tamen licuisset rursùm parumpèr in ipsarum descriptione commorari? id sanè, quod statim amplexatum est ex eâ consideratione, quòd *Dorsalium* glandularum historia à nemine, quod sciam, hætenùs compilata fuit, præcipuè quoad ipsarum emunctoria, vt quæ vel vsque-nùm fuerunt ignorata: mea itaque interesse, vt, cum ista demonstrata sint, illarum etiàm saltem rudem effigiem adumbrarem, aliòqui munere meo me haut ritè defuncturum.

XV.
Glandulæ
Dorsales Con-
glomer:

Quo titulo multatus, excerpto illo, tanquàm cortice membranoso, qui vtrumque inuolucrum præfatum contegebat, intuitus sum porrò tales glandulas numero binas, in alterutro nodulo vnâ, magnitudine ferè

ferè ad amygdalæ fructum accedere, quemadmodum & figurâ : nisi, quòd vnaquævis earum quatuor, ad summum, sex, prominentys, seu tuberculis glandulosis notata erat hinc indè è regione positis, & quæ tubercula ad basin crassiora, quàm ad apicem inter se paritèr incisuras quasdam relinquebant illic profundiores, quàm hîc, ut & ibidè etiam magis versús glandulæ centrum protensas. His itaque consideratis, minimè conctatus sum deliberaturus nùm tales glandulæ Conglomeratis accensendæ forent, nec nè? multo minús quòque, an istas Conglomeratas *Vasculo-vefficulosarum* cathalogo adscripsissem? Quippè tales primis oculis visæ; integumentum nempè quoddam proprium ac satis exile earum quamlibet amiciebat fylciebatque desupèr innumeros sanguiferorum vasorum pampinos è *Bronchialibus*, & *Coronarys*, ceu palmittibus, traductos, quique ad extremum submittebant sese in subiectam glandulosam carnem fere sub ea norma, quâ & *Celiacos Gastricosque* ramos in posterioris nominis glandulis caput suum deflectere suprà iam significauimus. Deindè hæc glandulosa caro cystidibus farta erat, siuè ves-

ficulis innumeris membranosis racematim digestis; quarum vnaquævis proprio fruebatur excretorio poro immediatè dehiscente in quosdam furculos itidem membranosos mediè inter binas quaslibet vesiculas existentes: à quibus proindè exceptus latex recrementitius ducebatur postea in alios magis capaces, vndique è circumferentia glandulæ emergentes excurrentesque sub yis, quasi vallibus, exterius inter eiusmodi glandularum prominentias obseruatis, & qui furculi denique terminabantur in alium omnium maximum mediè ab apice ad basin cuiuscunque glandulæ protensum, perindè scilicet, atque in Pancreate *Virsungianus* tubus. Tandem verò ad alterū nouissimi istius elicis extremū, nempe quod à foris erat, continuus cernebatur ille nilus, quem vidimus ab vnoquoque nodulo superius prorupisse ad *Nerveam* OEsophagi membranam, *Musculosa* prius in trochlearum loco perforatā. Sed quod attinet huiusmodi insertionem: quatinus hæc parū differre visa est ab illa, quam de *Cardiaco* vase publicauimus, consultò venit ommittenda; monebo duntaxat circa numerum istiusmodi glandularum, eas haut semper binas,

re-

reperiri interdum plures, nonnunquam etiam pauciores, ut quum ab altero Dorfi latere absunt: de qua varietate propterea ita *Verheyen*: *Circà quintam Thoracis vertebram*, inquit, ipsi OEso-phago à parte posteriore adnascuntur quadam glandula sæpius *bi-na*, magnitudine & figura phaseolum referentes; aliquandò plures, sed minores & in unum corpus glandulosum concretæ; quo nempe rursum videas quantoperè in glandularum OEso-phagi conglomeratarum censu, figura, situ &c. Natura ludat.

Ventum erat interea tandem ad eum locum, vbi arteriarum venarumque maiorum bifurcationes (quæ ponè OEso-phagum sunt, quasque adeò ibidem, cèu in situ suo proprio, ipse, prout innuì, antè reliqueram.) nunc aut explorari exigebant, aut exturbari: secus vltiorem ipsius Gulæ, separationem in duos tubos molienti, cèu repagula postì obdita, omnem prorsus aditum præclusuræ. Proptèr quod ipse Aorta & Caua diligenter examinatis, cum comperissem postea nihil ab his directè ad OEso-phagum tendere, tantum aliquot Inter-costales ramulos, qui extremis osculis *Membranosa* eiusdem OEso-phagi tunicam lambere pergebant, posteriorem senten-

loc. cit.

XVII.
3. par à
Glandu-
lis Bron-
chialibus
Congl.

tiam amplexendam censui, dictosque obices potiùs amouendos, quàm vt in vestibulo, vt aiunt, subsisterem. Dictum igitur factum; sustuli postes, arterias ac venas exemi, moxque posteriore OEsophagi parte in totum, seù ad Pharyngem vsque diffusa, tubulorum ipsius ab inuicem dilacerationi iterum incubui. At vix planè in hoc opere tantum progressus eram, quanta vnus transversus digiti mensura est, cum protinus.

Pincier

—*Emergere foras quasi carcere fracto.*

Et patuere oculis & se noscenda dedere rursùm duo alia vascula parem cum precedentibus ordinem dispositionemque seruantia, vt vt tamen multo breuiora ys longèque teretiora: quæ posterior ratio fuit, cùm eadem stylo tentare, prout antea consueueram, nequaquàm ausus fuero, veritus ne dirimerentur: ex alia parte quoque ne euentu suo insuper motatio illa frustraretur. Stabant quippè tales fideculæ vasculosæ in loco, vbi OEsophagus tam arctè connectebatur Pulmonum substantiæ, vt & ne stylum quidèm pateretur inter se & istam interponi. Quis igitur mihi illarum primordia fuissent pernoscenda? Nihil.

hilōinūs tāen res euiēta dēum eſt hoc pacto.

Appoſito indice manūs ſuprà eam partem, à qua nouiſſimi illi canaliculi ſupernè aſurgebant, periculum comprimentdo feci, an quidquam ſubtùs correfpondere ſentirem, quod me ducere poſſet in cognitionem eius originis, quam quærebam. Nec fruſtrà; quandoquidē viſuſum mihi attigiſſe ſtatim globulum quendam durum, à reliquà OEſophagi ſubſtantia diſcretum inque dextro Pulmonum lobo altè quaſi latitantem: quo factum, vt in hoc velari tandē duxerim, obiectum conatuum meorum. Abſcidi itaque iccirco propè vniuerſam eiufdem lobi ſubſtantiam, eā duntaxat ſeruata, cui duritas illa perpendicularitèr inſiſtebat; vtque ſarciſta eiufmodi ablata eſt, euexi ſurſum exteriorē OEſophagi tubulum à quo poſtindē comperi propendere portiunculam maioris *Aſperæ* arteriæ rami vnà cum accumbente illo corpore, quod ſenſeram infra prædicta vaſcula collocatum. Nihil autem erat aliud iſtud corpus, quàm glandula quædam oblonga, conglomerata, ſita extrinſecùs atque in poſtica parte dextri, vt dictū eſt, *Aſperæ* arteriæ rami nonnihil verſus finem

XVIJ.
Glandul:
Bronchia-
les Con-
glomera.

finem, idest ubi is nundum in alios minores apparet subdivisus. Et quod contextum; tametsi hunc propter informes fibrarum ductus, confusos nempe ac varios, colorem item fuscum, aut potius atrum plenè assequi nunquam valuerim, nihilominus ex antè perlustratis funiculis vasculosis planum fuit conycere talem glandulam inter *Vasculo-uefficulosas* enumerandam esse, aut, ad minimum, inter eas *Vefficulosas*, quæ cum *Vasculo-uefficulosis* conueniunt. Neque enim inficiabor, adesse potuisse insuper aliquot lymphæ ductus, qui ab illa glandula in præfatum Trachææ ramum influerent; sed cum hoc hucusque nundum obseruauerim, atque insuper autopticas rationes habeam, quæ me prohibent, quominus arbitrer lympham ab ea glandula gliscere in bronchium præcitatum, inducor impresens ad opinandum, eandem glandulam *Vasculo-uefficulosa* nomen promereri potius quàm *Vefficulosa*. At quicquid de his sit [& quorū acta ventilabuntur *infra*] vascula certè, de quibus nupèr, non aliundè fata, quàm à descripta glandula, conspecta sunt, plerumque bina, quamuis nonnunquam etiàm vnica eademque obscuri inity, propter nimirum

mirum ipsius glandulae cum OEsophago arctissimam quasi conglutinationem: coetero autem specialibus trochleis in *Musculosa* eiusdem OEsophagi tunica ditati erant y ductus, & per quas tandem ad *Nervae* euadebant

His agnitis, secutus sum meum, ut in adagijs est, asellum agere, siue, quod planius, iamdiu decantatam abs me illam tubulorum OEsophagi ab inuicem separationem ulterius vrgere, prohibente hoc utcunque licet intimo eorundemque mutuo contactu, quem vel pridem nihilominus perspectum habueram, cum primum scilicet ipsum OEsophagum arcte admodum Tracheae alligatum inueni. Ut autem tanta eorundem portio altrinsecus diuisa est, quantam & ante seiunxeram, ubi a *Dorsalium* glandularum excretorys vasculis ad *Bronchialia* ascendendum fuit, incidi denuo in alia, seu potius in aliud emunctoriorum par anteriori breuius perpetuoque gracilius, & quod denique adhuc per binas trochleas ab exteriori ad interiorum tubum se se eleuabat eadem prope modum symetria, quam in praecedentibus animaduenteram. Quapropter & istorum fontes de more indagaturus facta cum stylo pericula renouaui; quae tamen cum am-

XVIIJ.
4. par a
glandulis
conglom.
prime di-
uisionis A-
spera ar-
teria.

plius ex voto non cederent, ad extremum palpando iterum, coecorum more, facinus inchoatum est.

XIX.
Glandu-
lae primae
divisionis
Asperae ar-
teria Co-
glomer.

Applicito scilicet digiti fastigio supra exteriorem tubum, cum compressissem postea infra eum locum, unde ij ductus veluti pullulabant, quandam quasi exostosem, aut potius corpus reliquis vicinis partibus magis durum, arbitratus sum protinus fortunam coecorum esse, siue, uti dictitant incolae nostrates, habitare in manibus. Neque enim videbatur talia excernicula aliunde, quam ab istiusmodi corpore esse posse. Et de facto semotis ys, nempe partibus, intuitus sum inde glandulam quandam bifidam, conglomeratam, *binis prioribus Trachea divisionibus* adnatam, utrinque vnam, coloris ad ianthinum vergentis, seu potius liuidi, magnitudinis sat conspicuae (quicquid nondum obseruatae) figurae denique semilunaris, aut quasi circularis ita nimirum, ut ceu totidem annuli ambos praedictos *Asperae* arteriae ramos statim ab ipforum exortu constringerent atque obfirmarent. Hinc itaque eruta eiusmodi excerniculorum genesi reliquum erat ut examinarem quemadmodum ista, nempe corpora glandulosa, recremen-

mentum suum transfunderent in illa, siue, quod idem est, qualiter, quoue ritu interior huiusmodi glandularum materia esset disposita. Verum hoc propter minimam earum crassitiem lineas vix quinque, præter propter, superantem, additis idoneorum perspiciliorum hinc Rure, ubi dego, inopiâ, & charitate, ægrè consecutus; cumque palam duntaxat constitisset ad extremum talem substantiam congeriem esse acinorum innumerorum, haut ita tamen laxè aggregatorum, quemadmodum in *Bronchialibus* glandulis supradictis folliculi vesiculosi, hac saltim notitia contentus esse debui glandulas nimirum illas (*primæ Asperæ arteriæ divisionis*) merè *Vasculo-vesiculosas* existere, earumque emunctoria (sinè quibus eæ tales non essent) ad cauam OEsophagi superficiem distribui, conuexâ, siue exteriori eiusdem tubulo, antè, prout nouimus, terebrata: licet ex alia parte istorum, nempe emunctoriorum scaturigo, quia eadem glandulæ altè in eiusdè OEsophagi substantiâ sepultæ erant, oculorum aciem plurimum falleret, atque ex arctâ communium membranarum uni-one visa essent ea vascula quasi mæandri innumeri ac minimi in duos manifestos canali-

naliculos reollecti.

XX.
5., 6., nō-
nuquā
etiā 7.
par à G-
land. Tra-
chealibus
tergemi-
nis Con-
glom.

Rursus verò post illam [de qua & nupér & dudum] transuersi digiti mensuram in duos alios offendi siphunculos membranofos figuræ, ordinis, siuè dispositionis præcedentibus æqualis: nisi quòd & ipso iām recensitorum vltimo binario [quod exillimum denunciauimus] adhuc graciliores itèmq; breuiores spectabantur, quique iterum (ne & istud vnquā deferam] ab extrà intus gradiebantur per peculiaria foraminula, Trochleas appellatas, hinc indè in *Tendinoso* tunicæ *Musculosæ* per medium atque à tergo (vti quondam & passim publicatum est] discissæ strato conspicua. Nec satis; paulo altiùs progressus geminos alios nouitèr inueni prioribus conformes ac parallelos, quamuis adhuc, imò continuò, teretiores: ex quorum proindè frequentia, adiecta paritèr quotidie maiore ipforum breuitate illam tandem ratus sum procedere posse resistantiam, quæ OEsophagi tubos altrinsecus diuidenti offerrebatur eò maior, quò propiùs ad angulum incidentiæ, siuè ad Pharyngem, accedebam. Quin imò! & in aliud denuò quandòque impegi vasculorum par eiusdem cum reliquis naturæ, sed perpetuò [quem-

(quemadmodum mox monuimus] breuius ac tenuius, quodque vna cum suo aditu ad OEso-phagum aliquandò minimè obseruari potuit.

Trium itaque omninò parium huiusmodi natalia si quis à me percuntetur, fateri candidè non pudebit me processus ipsorum integros conspiciendi copiam nunquam habuisse. Vidi equidè in plurimis recens denatorum cadaueribus talia vascula ab altero tuborum OEso-phagi ad alterum extenta, quæque alicui aly veriùs non assimilabantur, quàm trunculis quorundam emunctoriorum ab aliquibus conglomeratis glandulis prouenientium, qui in yspartibus relictæ essent: prætereà quòque aduerti adstare ipsi OEso-phago, & circà Tracheam complures glandulas, præcipuè *Vasculo-vesiculosas*, quæ proprio excretorio ductu, tanquàm caudice, fruebantur; vndè adeò vehemens subibat coniectura, talia vascula, quæ veluti detruncata vtroque suas appendiculas offerebant, si quando iccirco inuicem commissa fuissent, illic in OEso-phago suum terminum, hîc verò, idest in glandulis, suam originem vtcùnque ostensura esse: at minimè tamen ità, vt affir-

XXJ.
Glandu-
læ Trach-
eales tri-
formes.

mare audeam feriem, siuè coniunctionem
 appendicularum præfatarum mihi penitus
 fuisse perspectâ. Vetabant enim hoc partim
 illorum minimorum, vt ità dicam, stipitum
 vasculorum exiguitas, partim etiâ mem-
 branarum dictas glandulas irretientium in-
 extricabiles complicationes; quibus si adiun-
 gas iterum microscopiorum defectum, dices
 vtcunque me in hac parte venia dignum,
 extitisse. Quòd si tamen coniecturis illis,
 & quæ tùm solæ mihi relictæ fuerant, stan-
 dum est, vix dubitauerim asserere tria di-
 cta siphunculorum membranosorum paria
 è glandulis memoratis ortum traxisse. Erant
 quippè hæc partim ab imo ad summum OE-
 sophago circumfusa, & saltim per illud spa-
 tium, quod eiusmodi paria æquo interuallo
 ab inuicem distantia occupabant, siuè qu-
 antus ferè *Asperæ* arteriæ processus est à *pri-
 mis diuisionibus* suprâ memoratis vsque ad
 carthilaginem eiusdem *Annularem*. Deindè
 vtrinque à Tracheæ lateribus propendebant
 ipsi OEsophago, ac veluti assisteabant præ coe-
 teris quædâ glandulæ Conglomeratæ eadem-
 que *Vasculo-vefficulosa* tot ferè numero, quot
 erant vascula præfata, quorum insupèr po-
 sitioni ac loco directè, è regione, ac proxi-
 mè

mè collocatæ erant. Huiusmodi ergò glandulas speciali suo pollere excretorio ductu in superioribus iam patèfactum est : quî igitur ijalibi, quàm in OEsophago querendi fuissent ? & cum insupèr salinum humorem effundere consuescant tales glandulæ, prout etiàm alibi fuit promulgatum ! & quidèm, quòd *Vasculo-vesiculosæ* essent illæ, nempè glandulæ, liquebat ex eo quòd superficiem habebant *inequalem* paucis tuberibus, idest eminentys lacunisq; vicissim notatam, colore ex rubro pallidam, ac tantùm non roseam, amplitudine pupilla oculi paulo maiorem, vt & crassitie quòque, figure lenticularis. Obtegebantur prætereá singulæ tunica quädam tenuissima vbique sustentante *Mediastinorum*, ac *Bronchialium* ramorum diuisiones, quæ glandulosum parenchyma postea ingressæ minimulas, quibus hoc constabat, glandulas sic, vt de alijs iam dictum fuit, concinnatum ibant. Ac denique quia minime hæ glandulæ intus vasculis interstrictæ cernebantur, quæ in vnam peluim desinebant, quemadmodùm in Renibus elices vrinarij; peluis autèm hæc in maximè decliui parte collocabatur sic, vt ex ea postea descenderent dicti excretorij tubi.

His

His igitur obseruatis non alienum fuit opinari radices huiusmodi emunctoriorum inter vtrumque OEsophagi tubulum reperi-
tas ab ys glandulis fuisse propagatas. Sed quod primordia huiusmodi radicum: vix à pelui, siue é glandula digresse singillatim aut disperibant omninò, aut in alias glandulas impingebant, de quibus impresens.

Namque suprà Mediastinum, Tracheam, Pericardium aliasque his vicinas partes videre erat complura, imò propè dixerim infinita, tubercula partim rubra, partim atra, partim atro-lutea &c. Quorum quidè rubra omnium minima apparebant, figurà semen orobi referentia, nunc maiora, nunc minora pro ætatum nec non sexuum differentys, substantià rubellorum sanguinis globulorum subtilissimis nerueis fibris adherentium, aut, si mauis, muscutorum materiam æmulantia, nullis aliòqui ductibus excretorys, saltem conspicuis, prædita: nisi fortè capsula quädam, seu appendice veluti adiposa gauderent, quorum nimirum etiàm complura conspiciebantur. In hoc enim casu, ab apice talis capsulæ, quæ genuinum fibrarum adiposarum contextum imitabatur, perexiguus quidam
orie-

oriebatur tubulus oculorum aciem abhinc statim effugiens. Tandem quoad situm; obtinuerant hæ plerumque locum OEsophago propinquiorem adeò, vt *Vasculo-vesiculosi* intermixtę cummuni etiàm cum his contubernio, hoc est eòdem inuolucro, gauderent.

Atræ verò glandulæ remotiores partes incolebant numero longè plures, quàm rubræ, vtpotè quas ego non in Thorace tantum; adspexi insuper in Abdomine in ipsis quoque membranosis musculorum interstitiis &c. cum è contrà rubræ, siuè carneę, non alibi, quàm heïc ad OEsophagum fuerint obseruatae. Cæterá autèm, idest secundum magnitudinem ac figuram, cum ysdem rubris penè congruebant atque ex substantiã videbantur potiùs quàm grumi sanguinis arefacti ac tenui quãdam pellicula inclusi.

Denique atro-luteæ glandulę non alibi paritèr in toto corpore affulgere visæ sunt, quàm circa Tracheam & OEsophagum. Apparebant autèm hæ præcedentibus molliores ità, quòd dixisses coagulato sanguine concretas: quamvis nihilominus alteri ipsarum extremo rursùm veluti appositus spectabatur quidam globulus pusillus, colore dilutè flavus, substantiã non absimilis illi,

K

quem

quem narrauimus etiã carneis, siuẽ rubicundis tuberculis quandõque succreuisse, figurã denique coni in modum fastigiatus, exiguoque, imò ne spectabili quidem, excretorio vase in culmo, tanquã plumã in casside, ornatus.

Quatuor itaque istiusmodi glandularum classes si demas *nigras* (quas nempẽ ratus sũ vni ac soli lymphæ studere) omnes omninò visẽ sunt *Vasculo-vesiculosarum* gratiã fuisse confictas. Ettenim *Carneæ* (quarum etiã priore loco memini) siuẽ simplices extarent, siuẽ compositæ, idest adiposa capsula ditatę, semper hinc sua vascula ab ipsius capsule apice egredientia in illarum furculos ablegabant, indẽ verò interponebant sese medię istis excerniculis adeò, vt humor per hæc excurrens per ipsas filtrari cogeretur. Reliquæ autẽm nimirũ *sanguineo-adiposæ*, aut atro-luteę dictę omnes prioris fasciæ erant, hoc est suos nilos *Vasculo-vesiculosarũ* emunctorys inferbant. Quę cùm ita sint, vix dixerim quanta fuerit tot vasculorum confusio, nedũ vt ipsorum ductũ atque terminum designare valeam: & cùm insupẽr illarum glandularum color, figura, magnitudo, numerus &c. vix determinari queant proptẽr magnam in diuersis,

sis, & in ysdem diuerso tempore variationē. Sufficiat igitur asseuerare me non alibi, quàm ad OEsopgagum, talium canaliculorum vestigia obseruasse, & quo saltim in suspicionem venerim tria prædicta istorum paria ē glandulis *Trachealibus* trium omninò ordinum promanasse.

Deuenerā autem iām denique inter diuellendum ab inuicem totiēs nominatos tubos ad *Constrictorium Pharyngis muscolum*: cuius substantiā mox rursus dimidiatim dilacerata videre fuit primò infrà hunc *muscolum* adhuc vnum, quandòque verò etiām alterum vasculorum par figurā quidem ac dispositione hucusque recensitis non abfimile; ast magnitudine tamen itā pusillum, vt etiamnum, hæream an ambo vera vascula extiterint, aut quid analogum? carere insupèr ipsū peculiaribus trochleis, siue foraminulis, per quæ, perindè atque alia, liberè excurreret trans exteriorem tubum. Prætereā intrà dictum *muscolum*, siue potius intrà orbiculares eiusdem fibras animaduerti alias, sed crassiores, velut nerueas & fistulosas transfuersaliter à Laryngis inferiori parte ad *Nerueam* vsque OEsophagi membranam, idest interiorem istius tubum, ex-

XXIJ.
Postrem.
par à gl-
andula T
hyroidæ
Conglo-
mer.

tentas, & quarum aliquæ laterales cum *Thyroidæis* glandulis communicabant.

XXIIJ.
Glandu-
la *Thyroi-*
dæa Con-
glomer-
ata.

Quo igitur meliùs istiusmodi cum vasculorum, tum fibrillarum cauernosarum series atque origo mihi innotescerent, *Thyroidæarum* mox nominatarum glandularum examen auspicandum duxi. At vix quidem primo ipsarum aspectu satiatus fueram, cum me poenituit erroris, in quo hætenus eram versatus, tales nempe glandulas semper geminas abs me cum vulgo Anatomicorum putatas fuisse, atque interim tamen simplex esset earum corpus velut ex duplici simul vnito coalescens. Erat itaque vnica glandula supernè plana, infernè angulosa ac bifida, hoc est ad semilunarem figuram accedens, cuiusq; trianguli Pharyngem atque Oesophagum vtrinque contingebant, diuidebanturque ab inuicem per quendam isthmum ab imo ad summum per medium ipsius glandulæ percurrentem; ex cuius proinde obtutù deceptos fuisse arbitror illos Anatomicos, qui eandem omninò duplicem prædicauerunt. Sed quod essentiam, seu corporeitatem; erat eadem intrinsecè tam informis, vt cuius libet vel curiosissimi perscrutatoris elusisset audaciam: vis-

cus inquam erat nonnullibi laxum, alibi compactum, incisuris, anfractibus, promontorys, lacunis vbique ac passim reffer-
tum, quodque demùm diuidentis cultro resistebat, ac nonnunquàm etiàm, dùm diuideretur, crissus edebat in morem materiæ fabulosæ. Quo stante, quomodò quis factum iri posse dixisset, vt caput, quod aiunt, aut pedes illius glandulæ adinuenirem? ne dùm vt vasculorum, nec non fibrarum fistulosarum prædictarum initium atque extensionem: nihilominus tamèn perlustratis fortè fortuna quibusdam veluti spiraculis vtrumque glandulæ latus perforantibus, quæque eò maiora cernebantur, quò plus ad externos eiusdem angulos (qui scilicèt Pharingi atque OEsophago vtrunque, vt dictum est, implantabantur) proximè accedebant, in eam opinionem deueni, vt crediderim dictam glandulam, idest *Thyroideam*, per memoratos mæandros expurgari, vasaque fibrasque præcitatas esse eiusdem glandulæ excretorios tubos. Dicere namque aliàs, quòd ea talia esse non poterant, quatinus magnitudine non corresponsdebant glandulæ, à qua proficiscebantur, vanum est. Noueram quip-
pè crebrò (quod & *Malpighius* testatur) ad-

*Epist. de
Glandulis
Conglom.*

esse in Afino, Boue &c. complures glandulas, quę per eiusmodi cauernosos funiculos exhantlantur. Et prætereá dubium an, quemadmodum diuersa sunt conglomeratarum glandularum munia, itá ob adhuc ignotos fines Natura fortè voluerit talem *Tyroidæam* glandulam per eiusmodi, quasi nerueas, fistulas humorem suum excernere, vt nimirum, si latex iste, velut aura quędam v.g. exindè debuerit inspirari. Verum de his *alibi*. Denique quod has fibras; germanum illius glandule recrementum per tales cuniculos sequestrari suadebatur ex eo, quod eadem interdum abscessu tentata viderim post mortem pus ab indè in Oesophagum, siue ad Pharyngem, expressum leui etiám appulsu in Fauces atque in Os regurgitasse. Mitto, quod à tali glandula nullus patebat, ad Laryngem, aut ad aliam quamlibet partem aditus; quod neque illinc aliquis lymphæ-ductus emanabat, & postremò quod idem viscus Oesophago vtrunque, vt dictum est, innitebatur. Coeterò *Tyroidæam* glandulam in *Vasculo-vefficulosarum* censum esse reponendam color ipsius atque substantia paulo durior vltrò indicabant, quodsi adeò eiusdem excernicula alibi, quàm

in

Sec. 3.

in maximè humili parte quæsiuissem, diceres extrà callem me, vt aiunt, incessisse, parte nempè illa OEsophago [vt hoc rursum repetam] hinc indè accumbere conspecta.

Auctarij ergò loco monendum restat hucusque recensita, quæque ad OEsophagum definere comperta sunt, tot glandularum, conglomeratarum excretoria vasa croceo vt plurimum, idest saturé flauo, colore imbuta oculis se se obtulisse: quam tincturam arbitror hactenùs imponere potuisse ingenuis Prosectoribus sanguinis specie, adeoque ipsam venarum his veluti fucum fecisse, aut arteriarum, nobis tamen interea eiusmodi phænomeni rationem in *sequenti Sectione* reddituris. Si quis autem eâ serie, ac multitudine emunctoriorum offendatur & quòd non omnia omninò, neque vbique ac semper ea in comperto habere possit, consistat parumpè indignationemque coerceat saltim vsquedùm singulorum in singulis cadaveribus venationem instituerit. Contingit quippè non rarò, vt dùm aliquod illorum inuestigatur, aliud suffugiat nonnumquam, pereatue, aut defetiscat, sicque modò hoc, modò illud solùm reperiatur, prout nempè aliud alio aut prius in disquisitione

XXIV.
Admonitio circa
apparentiam ductum
eununtiatorum

ne fuerit, aut posterius. Quicquid ex alia parte *Dorsales* tubi præ-coëteris vbique, in omnibus ac perpetuò extitisse comperti sunt, tum *Gastrici*, ac tertio loco *Brunchiales*, quos denique sequebantur cum *Tracheales*, tum & *Tyroidæ*, qui tamen segnissimè iidemque rarissimè omnium sub conspectum ceciderāt

Iam verò absoluta Tubulorum OEsophagi alterius ab altero separatione, exemptaque iccirco atque aliorum sequestrata *Musculosa* membrana, vnde exterior, ut insinuatum fuit, eiusdem OEsophagi tubulus conflatur, supererat *Nervæa*, quæ itidem interior est, quamque ut ut à plerisque pro simplici ac prò indistincta habitam *Verheyenius* tamen rursus triplicem agnoscit. Sic enim is: inter *Musculosam*, inquit, & *tunicam Nervosam*, quæ passim dicitur ultima, duas alias offendi tunicas; quarum illa, quæ *Musculosa* proxima est, ex fibris irregularibus atque innumeris *Vasculis* laxè contextitur: altera, quæ *tunica Nervosa* immediatè firmiterque adheret, constat fibris rectis secundum OEsophagi longitudinem excurrentibus, atque aliquatenus carnosus, prout in homine valde musculofo clarè conspicitur. Huic tunica [pergit idem *Anatomicus*] *varys in locis glandula*

XXV.

3. Tunica Nervæa.

coco sapé
citatur.

la inserta sunt : unde tunicam hanc Glandulosam, alteram Vasculosam nominare placuit. *Tunica intima* (sunt vltima illius verba) valde subtilis est, ac prorsus Neruea fibrisque tenuissimis ac ordine vario locatis constat. Et Contrà quam tamen & contrà alios, quotquot ex *Vuillisio*, ni fallor, pelliculatim diuidere membranofas corporis particulas didicerunt, infurgit *Craanen* his verbis: *Quæ Anatomici nobis vulgo dant de distinctionibus membranarum, cum grano salis sunt intelligenda. Nàm nostri visus acies nullo modo eó peruenire potest, vt has omnes queat ad numerum perfectum deducere. Hoc ipsum probatur argumento exceptione omni maiore; si scilicet oculus muniatur microscopio, tùm facile in qualibet tunica poterimus alias plures distinguere, quod tamen non poteramus antea effectum dare. Quamobrèm* (concludit indè sic denique idem sanioris Anatomie, vt & reliquæ Modernæ Physices Assertor strenuus) meritò numerus membranarum & tunicarum nostri corporis pro incerto haberi debet : cùm componatur ex infinita fibrillarum serie inter se diuersimodè contextarum, Et contenti solummodò erimus illa distinctione, quæ cuilibet intuenti ad oculum patet ; ac proindè malumus & nos in vnaquâuis tunica,

*l. de Hom.
cap. 7. de
OEsoph.*

quæ plurifariam diuifa integra amplius non habeatur, diuerfas representationes, siuè facies, agnoscere, quàm ex varys eiusdem aspectibus plures, & minimè tamen perfectas affingere membranas: id videlicet, quod & in *Musculosa* prædicta supra iam exemplificatum est.

Nunc ergò quod *Nervæam*: obseruauì hanc in ea facie, quâ *Tendinosam* imprimis laminam deosculabatur, vasculis circum undique exarata; quorum tamen non omnia sanguifera, complura etiàm conspiciantur à ductibus recéns à nobis compertis propagata, & quæ nonnunquàm ob colorem liquidi abs se deuecti sanguiferam speciem præ se ferebant. Sed quod priora: credideram prima fronte sobolem esse illam articularum venarumque, quarum nempe aliæ sanguinem inducerent in dictam tunicam, aliæ reducerent, aut reportarent; verùm post didici mihi à præconcepta hâc opinione, egregiè fuisse impositum - Quandoquidè persectata eiusmodi vasculorum origine, comperi equidè adfuisse aliquot arteriosos ramulos, qui ab internis Carotidibus exorti paruis ac minimis initijs ingrediebantur postea superiorem Gule partem propè musculum

culum OEfophageum; at venarum tamen, quod in totum dixerim, ne vestigium quidem alicubi inueni. Solæ itaque arteriæ è sanguiferis vasculis exteriorem tunicæ *Nervosæ* superficiem irrigabant vnà cum propaginibus illorum ductuum, quos nominamus per externum OEfophagi tubulum ad internum irrepsisse: è quarum deindè ingressû & egressû mutuo infrà extrà primores eiusdem membranę fibras [perindè ac si inuicem se decussarent] contexebatur denique extrinseca illa lamella, quam *Vasculosam* dixit celeberrimus *Verheyenius* præfatus.

Jam verò post aliquot diuaricationes ac reciprocas, ceù tramæ & staminis, cum exterioribus *Nervæ* membranę fibris superquitationes terminabantur ad extremum dicta vascula in interiorem eiusdem tunicę substantiam, vbi post fibrillatim expansa scrobiculos ibidem, seù cicatriculas quasdā compingebant ab eodem Authore *Glandulas* vocitatas. Erant autem diuersigenæ istæ foveæ nimirum triplices; grandiusculæ, minùs late, ac minime; quarum postremę ex finitionibus arteriarum resultabant, mediæ ampliores ex terminis nouorum excerniculorum

rá descriptorum , supremæ verò ab alijs mihi nundùm ritè perspectis .

XXVI.
Noui lymphæ du-
ctus ad
hanc tu-
nicam.

Uisum enim quidèm fuerat , præter ambas illas , debere dari adhuc tertiam canaliculorum speciem , vndè demùm eiusmodi cauernulæ scaterent ; at quales tamen forent hi , penitus ignorabam . Verùm ad extremum mecum ratiocinatus OEsophagum egêre rursus viscido quôdam atque vinctuoso humore , cuius proindè vi prismaticorum corporum illac fortè dilabentium iniuriæ aduersus fibras eluderentur , in suspicionem veni , quòd sicuti ea facultas in vna lymphæ consistebat , ita præfati canaliculi non alij esse possent , quàm eiusdem lymphæ delatores tubi . Dicere namque quòd viscosus humor prædictus ab arterijs esset emanaturus , credat apella Judæus , vt fertur . Mihi quippè iamdiu fatis liquidò constiterat [quod & in superioribus notificatum fuit] Carotidum internarum ramulos *Nerveam* [vt ibi paritèr dictum est] OEsophagi membranam irrigatum contendentes in minori tùm quantitate , tùm & qualitate existere , quàm vt eam liquoris copiam suffecturi essent , quæ requiritur ad eiusdem Gulæ defensionem . Deindè etiàm noueram

arte-

arteriarum extremitates [quas medię illi, *Nervæ* vocatæ, tunice inniti itidẽm significauimus] tenuem serosamque saliuam, duntaxat expuere, idest fluorem fibris nonnisi in elasticitate sua naturali conseruandis accomodum ; minimẽ verò oleosum, viscidumque mucum, illum scilicet, cuius pręsidio opus esse constat ad angulorum corporum deglutitorum figuram protelandã. Quamobrẽm in ea sententia confirmatus maiores illas in medioxuma *Nervæ* membranę parte obseruatas cicatrices stigmata, velut esse à lymphæ-ductibus ibidẽm desinentibus relicta, in ipsã vtique acquieuissem: nisi ex alia parte scrupulus iniectus fuisset, quòd audiueram (est enim hoc ab Anatomicis vulgarissimum) vasa lymphatica è membranosis partibus in sanguifera immediatè refundi vt plurimùm, aut mediatè, per glandulas conglomeratas ; non autem vice versa: vndè adeo patebat dictas foueas initia potius esse posse, quàm terminos ductuum eiusmodi lymphaticorum. Hoc igitur motiuo excitatus rem non alitèr, quàm experientiã ipsa declarandam censui. Et verò, quandiũ ista in viuentibus tantummodò celebrari deposcebat (hominemque vivum pro-

scindere impium est] tandiù indago eiusmodi ad bestias translata. Secui ergò Vitulum, quem edacem, animal quòque noueram aridis vesci solitum: vtque ipsius Iugulum omninò apertum est, en! video binas glandulas sinè potiùs duas glandularum conglomeratarum series, vtrinque ab OEsophago vnâ, colore Thymum referentes, vt & substantiâ, quæ itidè *Vesficulosa* cernebatur; descendere prætereâ hinc indè ab vtròque Pharingis latere, seque demùm vltra medioximam eiusdem OEsophagi regionem extendere crassitie nunc maiori, nunc minori, & quæ interdum pollicem superbat. Quibus spectatis abstuli vnâ cum his glandulis totum etiâ OEsophagum, hisque post ad Solem obuersis (pulchrum visu!) obseruavi binas rectas lineas innumeras parallelas procedere hinc indè ab illa catena glandularum conglomeratarum præfata, atque obliquè tendere in OEsophagum adeò, vt postremæ omnium se se plus mediâ spithama infra eiusdem Gulæ medietatem exporrigerent, antequàm ipsius substantiam ingrederentur: continere itè in se singulas illas binas lineas humorem quendam limpidum, idest diaphanum, aut pellucidum, quique

ligatis

ligatis aliquot eiusmodi viarum supernè turgescebat, internè verò vacuas easdem derelinquebat. Hunc ergò succum quis negasset esse lympham, dictaque linearum, paria esse totidem vascula lymphatica? Quis, inquam, dixisset, posita istorum obliquitate, lympham illam deorsum non tendere, aut, stante mox indicatâ ligatura, ad OEfophagum non properare? Sed dices utique in Vitulo hoc ità contingere proptèr specialem partium dispositionem: secùs autèm in homine.

Ad quod resp. inesse etiàm in homine tales glandulas. *Ettenim inter musculos capitis (inquit Petrus Dionis) Cervicisque spinam versus Thoracem descendendo plurimæ occurrunt glandula à latere Colli sitæ, quas adeò Iugulares appellamus, vel quoniàm eiusdem nominis vasa comitantur. Variarum sunt figurarum, aliaque maiores, alia minores sibi que mutuò connectuntur membranis & vasis. Et sanè hæ glandulæ similiter Vessiculosa colore etiàm cum Vitulinis præfatis ità consentiunt, ut amborum animalium, quoad hanc partem, sit quasi indiscreta similitudo. Sic etiàm in homine superiores Iuguli glandulæ molliores magisque pallidæ, inferiores magis rubræ*

XXVIJ.
à Glandulis Jugularibus
Conglomerat.

Demonstrat. An. 9.

bre conspiciuntur, perindè nimirum atque in Vitulis obseruaueram Iugulares illas existisse. Quæ cum ita sint; cum videlicet *Iugulares* hominis glandulæ substantia, colore, numero &c. cum glandulis Vituli itidem *Jugularibus* penè conueniant, cùr non reputauerim istas eòdem atque illas (*Vitulinas*) officio fungi? cùr, inquam, non reputauerim maiusculos illos scrobiculos in tunice *Nervæ* meditullio obseruatos, ceu latiora puncta alijs angustioribus intermixta, vestigia fuisse vasorum lymphaticorum ibidem sic, vt de alijs dictum fuit, conterminantium &c.?

Tandem verò his punctis siue cicatriculis maioribus, quemadmodum & alijs minoribus, quocunque scilicet ex arteriarum, nec non excretoriorum ductuum recens à nobis compertorum finitionibus fibrillatim (vt sæpius etiàm repetitum est) expansis resultabant, supersternabatur instar operculi ea lamella, quam solam *Nervæam* nuncupat *Verheyen*, ac nihil erat aliud quàm fibrarum nervosarum simul coalescentium firmior contextus à Faucibus ad Ventriculum vsque continuus, & in quo passim, præcipuè verò in rugosis vallibus, oscil-

labant

labant quidam parui meatus, siuè pori subiectis vefsiculis, ys nimirum, quas descripsimus, ex diametro correspondentes, & sic demum glandulas constituentes illas, quas hinc Doctissimus mihi que medullitus charus *Laurentius Terraneus* Noster *Disgregatas*, inde famosus *Litrius Sebaceas*, plerique verò *Conglobatas* vocant: & sunt, quæ ex una quasi substantia conflata perhibentur, ac superficiem habent æqualem. Huiusmodi autem glandulæ vniuersim eructabant in OEsophagum recrementa illa, quotquot diximus è Conglomeratis cum *Vasculo-vefficulosis*, tum omninò *Uefficulosis* defluxisse; vnde adeò & interior eiusdem OEsophagi facies non mucore duntaxat, sepè etiam flauo vdore tincta comperta est.

*l. de Gland
ad Uretbr-
am Virile.*

Quod superest de *Neruea* membrana: hanc in superiori parte subtiliorem, in inferiori ac versùs Ventrículum paulo crassiorē inueni; quod postea & ab *Amato Bourdon* ad notatum inuentum hìc pariformitèr innuere volui.

Denique perforatæ illi *Neruei* velaminis lamellæ intus obducebatur quedam *Crusta Vuillosa*, quæ totam OEsophagi cauitatem veluti lanugine quadam inuestiebat. Hæc

XXVIIJ
*Crusta V-
uullosa*

Crusta [ait demùm totiès laudatus, at nunquàm tamen fatis, Eruditissimus ille *Philippus Verheyen* Vir, meherclè dignus, quem reliqui Profectores imitentur, quemque ipse horum licèt minimus sequi rependo conatus sim tùm in vniuersa Anatome, tùm verò imprimis in OEsophagi structura perdiscenda, vtpotè quam is, meo quidem iudicio, clarissimè omnium exposuit, ac felicissimè perfecit] *Hac*, inquam, *Crusta illà Ventriculi, & Intestinorum* longè quidem tenuior est, attamen firmior, atque etiàm pro distincta tunica haberi potest: interim hac *Crusta ex albo tunicarum deleta*. Cætera, vt Neruorum adhuc usque recensitas OEsophagi tam partes, quàm appendices, influentium diramationes, tanquàm ab alys fusè tradita consultò duxi prætermittenda.



SECTIO SECVNDA

DE HVMORE VERO DIGESTIVO



LXpeditus ab Anatome supèr officia partiū eo, quem retulimus, modo dissectarum meditari, quidque hæ, quidue illę valeant cū seorsim, tū coniunctim perscrutari, vtcūque sedulò, non sum grauatus. Is enim certè erat, quem ego fructum ab exercitatione illa speraueram vberissimum, & ex quò planè, cognito priùs *De-gluttionis* artificio, haud diffidendum erat quin *Chylificatiue* facultatis intellectio pariter ad me tandem esset peruentura. Quo propterea illicio tractus rem non alitèr augurandam duxi, quàm sub eo ritu, quem in superioribus seruaueram: et sic porrò membranę *Externę* [de qua nempè & ibidèmpriore loco verba fecimus] proprium munus esse existimaui, vt *Musculosam* immediatè sibi subditam, velut theca quæ-

J.
Vfus tu-
nicæ Mc-
mbranose

dam includeret in se atque absconderet, ne ab extraneis effluvijs perculsa ista hæc in abnormes motûs aliquandò ageretur: siuè, quod libentiùs dixerim, idem propemodùm præstare censui in OEsophago *Membranosa* tunicam, quod & in alys Musculis eorundem membrana propria.

IJ.
Vt & Mus-
culosæ

Hinc quod *Musculosa*, totalem istius actionem receperam in eo consistere, quòd OEsophagum constringat, quotiescunque aliquid ab eòdem venit protrudendum in Ventriculum, *idque potissimum præstare* (verba sunt perpetuò illius Professoris Louanensis) ope fibrarum annularium seu ordinis interioris, in quas spiritus successivè influentes materiam deglutiendam ad Ventriculum diducunt; fibras autem exterioris ordinis, seu longitudinales, videri sua contractione OEsophagum dilatare fortassis, ut transitus prò materia deglutienda sit liberior. Verùm ipse (quod & pridem fassus sum) haud diù huiusmodi dicto audiens esse potui; quòd nimirùm aliud suadere viderentur hinc negatiuæ rationes itém aliás [idest initio sectionis præcedentis] adductæ, indè verò positiuæ, inter quas vel illa est i., quòd Mechanicè, quâ cibos in Ventriculū protrudi fertur, noueram penitùs in-

inuersam esse. Quandoquidem fanè non sunt annulares fibre, quæ OEsophagum constringunt; sed longitudinales, vt quæ illarum à tergo positæ Antagonistarum vices supplent. Et de facto: quomodò annulares semel dilatatæ dimensionem vel naturali minorem occupaturæ essent eam, inquam, dimensionem, quæ requiritur pro OEsophagi constrictione? nisi ex alia parte rectæ, idest longitudinales, quæ prioribus superpositæ easdem comprimere ac veluti diuerberare videntur, ipsas cogerent ad fugam, siuè ad repentinam introrsum, vnde discesserant, reditionem. Prætereá neque longitudinales dicendæ sunt operari OEsophagi dilatationem; sed materia ipsa deuoranda. Hæc enim eiusdem parietibus interiecta, sicuti reliqua, quidni annulares *Musculosa* tunice fibras ampliet atque extendat? Cum igitur ipsos in describenda genuina ciborum protrusionis mechanice, sibi-met contradicere compererim Anatomicos, meritò etiàm in suspicionem venire debui, an officium membranæ *Musculosæ* secundùm omnes suas partes perspectum fuerit?

Nàm 2. monebat idem complurium canaliculo-

M 3

liculo-

III.

Officium
nouorū
ductum

liculorum (eorum videlicet, quos in *Anatomicis* delineauimus) transitus per *Musculosam* tunicam præfatam. Hic enim aliquid ab eâdem exposcere videbatur, ; vel aliquid in eandem importare; vtrōuis tamen minimè sub eo dicto, ac ne per somnium quidém adumbrato.

IV.
nec non
trochlearum;

Ac 3. denique ingens illa trochlearum in eâdem *Musculosa* membrana itidém reperiatarum multitudo, quæ exactè respondebat numero ductum supradictorum. Siquidém videbatur has nequaquam in dictæ ciborum protrusionis gratiam fuisse effectas. Quibus sic stantibus, credidi potiùs vsum præfatæ tunicæ completum consistere in eo, quòd non tam alimenta conducat in Ventrículum; verùm etiàm quòd, inter diducendum eadem, humorem quendam é recentis siphunculis depromat atque in OEsophagum emulgeat id, quod indicant primò robur, siuè complicatio fibrarum carnearum talis membranæ.

V.
Cúr OE-
sophagus
diuisibilis
in duos
tubos?

Tùm verò illa seiungibilitas, hoc est reciproca tubulorum OEsophagi alterius ab altero separabilitas, adeòque & realis *Musculosa* prædictæ à *Nervæa* membrana discretio, vt quæ aliàs frustranea, imò ciborum pro-

protrusioni contraria existeret: cum verò eadem *Musculosa* membrana se habeat instar manus, quæ designata vascula emungat, aliquatenus libera esse debuit à *Nervæa* subiecta, ut nimirum dictum mulctrationis opus absque impedimento perficiat.

Ut igitur receptui canam, & singulas laudatæ tunicæ actiones ordine digeram, dicā
1. Nutrimentum (aut quidquid aliud sit, quod in Ventrículum adsportari petat) ubi è Pharyngis constrictorio musculo in Gulam coniectum est, annulares eiusdem membrane fibras natura sua elasticas, idest idoneas vicissim contrahi ac dilatari [vtpotè nimirum tendinosas] in solito ampliorem peripheriam extendere. quamobrém longitudinalibus etiàm extrorsum compulsis, ut proinde hæ, quæ prioribus minus sensiles, quatinus carnosiores, in statu illo violento contineri nequeunt, ad pristinam rectitudinem redire nituntur, fit, ut subiectę orbiculares (quas, vtpotè contractiles, ad nutum veluti obtemperare diximus) introrsum pariter cogantur ac flagellentur. Deinde quòd ampliatis in ea expansione trochleis præfatis ac versùs Conglomeratas glandulas à nobis descriptas magis adactis, lon-

longior excretoriorum, quæ ab his sunt, quæque per illas transeunt, vasculorum mensura ab yisdem trochleis excipitur, dimittaturque inuicem in ea contractione, quæ in *Musculosa* tunica fit, compresso, ut dictum est, ab exteriori, fibrarum carnosarum ordine interiore. Ac postremò, quòd simul concidentibus eiusdem membranæ parietibus, sicuti alimenta deorsum gliscere debent, inuitante ea insuper interna Gulæ lubricitate, ut liquet, ita etiam exurgeatur ille humor antea in siphunchulos memoratos per trochlearum expansionem illectus. Ut autem descendens cibus passim atque ubique nouas eiusdem *Musculosa* tunicæ tum dilatationes excitat, tum contractiones, sic ubique etiam liquorem prædictum allicit in Oesophagum ampliterque haurit, imbibitue. Cœterá, tanto citius descendunt alimenta, quo velocius fibrarum memoratarum regressus fit ad suam lineam, item quoque quò fortius. Longitudinales quippè (ut ab his exordiar) non antea ad perpendiculum consistunt, quam, velut in compensationem illatæ violentiæ, introrsum penetrauerint, ut fideculæ in Lyrâ distentæ, quæ aliquorsum distractæ, subindeque

déque dimissæ angulos ad oppositum latus constitvunt eò intimiores, quò eas longiùs à libella sua semoueris; sic igitur illæ, hoc est longitudinales fibræ, si á crassiore bolo vim perpressæ fuerint. Annulares verò, vt vt in sitâ contractilitate sua maximèque ob instantiam suè pressuram, quam á longitudinalibus sibi velut incubis aliquandò receperint, se se in gyrum contorquere valeant minorem eo, quem aliàs describere consueuerunt; nihilominùs sicubi ob vehementiorem causam plùs iusto exorbitauerint, vt vimina, vel ferreæ laminæ quædam in circulum ductæ magis in arctum cogentur, & quarum nempè extrema antè se se mutuò tangentia, post ab inuicem longè secluseris. Hinc igitur etiam, quod respicit expressionem fluidi supradicti in OEsophagum: palam est, prout contractio annularium fibrarum mox nominatarum, maior, aut minor, velocior, aut segnior fuerit, hanc etiàm vberiore, aut sicciorem fore. Quippè cùm non detur contractio absque quòd præcedat dilatatio, vt nouimus; quemadmodum proindè in insolentì dilata-tione eiusmodi vuillorum insignitèr etiam àpliari debent trochleæ in eâdem *Musculosa* membrana existentes, & per consequens con-

N

suetò

fuetò maiorem excretoriorum ductum, qui præfatum succum deferunt, portionem inuaginare: sic & in pressiori contractione talium foraminulorum diameter magis angustetur necessum est, ac minimula emunctoriorum memoratorum pars ab ysdem retineatur; hoc facto quidnì grandis paritèr succi redundantia succedat ex illis excerniculis, hoc est ingens istorum pressura? è contrà verò si talis contractio languida extiterit, aut lentè sollicitata.

Quæ cum ità sint: cum, inquam, stante fibrarum eiusmodi dilatatione ac constrictione mutua respectu ciborum in OEsophagum intrusorum, non tàm hi propellantur in Ventriculum, quàm prætereà exprimatur in eandem Gulam ille succus, qui per canaliculos à nobis recensitos, ceù per totidem epistomia, depromitur, in eam denique sententiam descendendi, vt existimauerim officium tunicæ *Musculosæ* prædictæ, nedùm in sola protrusione alimentorum, vt hætenus putauerunt Anatomici; consistere vel potissimùm in eo, quòd qua ratione ista diducit per OEsophagum, eà simul emulgeat in hunc illud liquidum, quod à glandulis Conglomeratis per nos suprà designatis excernitur.

His

His sic consideratis, haut immeritò sanè suspicatus essem protinùs tale recrementum, quòd nonnisi *Deglutitionis* tempore in Gulum alliceretur, quòdque adeò meram ciborum videretur affectare commistionem, intendere propterea infimul istorum *Digestionem*. Verùm, quandoquidem propositio hec noua, paradoxa etiam prima fronte visa est, non alienum iccirco duxi suspendendã saltèm quoãd certior de eã factus ab alys deindè minùs temerarius putarer. In quem finem primò in memoriam reuocaui quatinus dictus liquor è Conglomeratis glandulis proficiscebatur non qualibuscunque; sed tantummodò *Vasculo-vefficulosis*. Hoc enim me multùm in opinione illa confirmabat. Quippè si tales sunt dictæ glandulæ, non lympham (quemadmodùm aliàs item significatum est) generare potiùs debent aliquod fermentum, quod speciali quodam Corpori auxilio sit, vt Hepar, Pancreas, Testes, quæ inter *Vasculo-uefficulosas* glandulas principem locum tenent. Insupèr *Vefficulosa* omnes, aut quotquot lympham vndequaque affluentem recolligunt, instaurant, aut distribvunt, internè furculis non exarantur, vt neque externè elices habent,

VI.
Munus i-
tém Gl-
andular-
um Con-
glomerat-
arum.

qui ab illis furculis viginem deriuent; sed loco istorum innumera vascula hinc illinc irradiantia, & quæ demùm in actu frigidis cadaueribus amplius non obseruantur: *Vasculo-vesiculosæ* verò utrobique colliquias suas habent duras, membranofas, & vel post diutina fata superstites. Demùm, quia istarum textura compacta, illarum tam flaccida spectatur, ut de mollitie quasi cum pinguedine certet. Ob quam rem porrò, si dixissem Conglomeratarum utriusque generis idem munus existere, nempe ut lympham suppeditent, haud parùm conscientie mee fuisset reluctatus. Cautè igitur distinguendum inter has, & illas, & quo saltem ambarum officia non confundantur. Ceterò nomina hæc (*Vesiculosarum* & *Vasculo-vesiculosarum*) ne tibi fortassè novum quid audiant, aut commentitium, accepi ab amantissimo Magistro meo, D. D. *Petro Chirac* Archiatro ac Professore Regio *Monspeliense* [cui adeò gratam ipsius meritis memoriam, donec latiora & quæ nominis indicinam non defflugient, monumenta mihi succrescant, seruabo deuotus] iisdemque, ut & alys plurimis ipsius inuentis vsus est alter eiusdem Discipulus *D. Bedeuole Geneuensis*: quicquid nihilominus ipse

ipse vocum eiusmodi significationem ad alias glandulas traxerim, ad quas illi non trahunt. At quicquid de his sit, liquet manifestò glandularum Conglomeratarum ut substantiam, sic & diuersum esse vsum, glandulasque à nobis recensitas multum differre ab ys, quæ lympham suppetunt: liquebit tamen hoc amplius, si vniuscuiusque indolē ac proprietates quisquis rimari, ac tanquam sui iuris facere non dedignabitur.

Nàm quod *Gastricas*: nihil in Authorum Cōmentarys vspiam assequi potui, quod mihi ipsarum habitudinem inuestiganti facem potuerit præferre, fortè quòd ex receptissima illa, & tamen impostoria regula, tales glandulæ putatæ sint habere se instar receptaculorū, quæ lympham è vicinis partibus absorptā in venas transfundant, aut in alias cauitates. Verum hoc quantum à Veritate distet, in superioribus patefactum est. Superest ergò mihi, ut iuxta ibidem enuntiata demum concludam dictas glandulas *Vasculo-uessiculosas* existere adeoque tales, ut non nisi peculiaris cuiusdam fermenti segregationi incumbant: at quale autem sit huiusmodi fermentum non ita facile fuit determinare, cum resultet ex particulis ab arteria iniectis,

VII.
Gastrica-
rum.

ac per iteratas filtrationes in glandulis subtilifatis; tantum ex gustu conycere fas fuit esse ipsum subtiliter falsum adeo, ut à lympha longè latèque, ut aiunt, distet.

VIIIJ.
Dorsalium.

Demonst-
rat. Ana-
tom. 6.

De *Dorsalibus* autem redit cantio: si glandule (verba sunt hæc clarissimi *Petri Dionis*) quæ sunt in *OEsophagi* parte posteriori, quasi pulvinaris vicem ipsi tantummodò præstarent, ut antiquitus dicebatur, ut scilicet obstarent, ne vertebrarum duritie læderetur; natura glandulis in totam eius longitudinem ei prospexisset: verum longè alius est eorum usus, quandoquidem humori cuidam viscoso segregando inserviunt, quo oblinitur & humectatur illius cavitas, ut facilius descendant alimenta, quatinus lubriciorem illum ductum efficiunt. Sic etiam, vel ante illum, opinati sunt *Bartholinus*, *Bourdon*, *Vvarthonus*, atque è Recentioribus *Philippus Verheyen* & alij passim. Contra quos tamen non defuerunt, qui dimicare ausi sint, posterioremque sententiam velut parum ad rem facere compertam refellere non dubitauerint ut *Diemorbroe Kius*, qui sequentia effutit. Nonnulli has glandulas non tantum *OEsophagum* exterius irrigare: verum etiàm eundem ad faciliorem *Deglutitionem* interiùs humectare credunt. Verum cum neque extrinseca ista irriga-

Anat. l. 2.
c. 16.

tio

tio necessaria sit, neque ullus transitus versús interiorē OEsophagi cavitatem protendatur; satis patet illum non esse earum usum; sed illas potius lymphaticum liquorem colligere, vel ex vicinis partibus exsorbere, eumque per lymphaticos ductūs chylo affundere. Atque hinc porrò Viri primores, quos opinio de lymphę collectione in glandulis parum, quin effascinauit, dūm variè intèr se disputant, neglecta interim Veritatis indagine, in absurda rapiuntur. Nos igitur, quibus, Deo sit laus, talis Cynosura illuxit, cū nouerimus *Dorsales* glandulas præfatas reuerà *Vasculo-vesticulosas* sua proindè emunctoria OEsophago concedere, quī decertabimus admissuri, quod eadēm fermento aliquo proptereā scateant, quod & *Deglutitionis* tempore in Gulam illectum, ciborum consortium affectet? Declarabat enim hoc ipsius-met humoris in sua scaturigine obseruati sapor. Quippè degustatus visus est quandam falsuginem post se relinquere ei similem, quam vrina sapit: similiter & color. Is enim oculis plerūque album se se statuit; & quę duo tamen nec lymphæ, neque fero conueniunt.

Succedunt intereā istis *Bronchiales* glandulæ; de quibus obstupueram ab Anatomicis,

IX.
Bronchialium,

Edit. Lou-
uan. 1706

cis, præsertim Pneumographis, inter quos emicant præclara illa duo Medicinæ lumina (*Malpighius & Willis*) nihil hætenus feræ posteritatis memorię mandatum: quamvis non diù post compos factus libelli cuiusdam *Verheyani*, idest Appendicis ab ipso Authore calci Operis sui Anatomici annexæ, inueni ad extremum non tam superiorum, quas descripsimus; sed & inferiorum complurium, imò innumerarum mentionem factam fuisse. Sic enim is: *In Anatomia*, inquit, *Pulmonum & Asperę arteriæ* passim offendi, ac spectatoribus demonstraui quasdam glandulas primæ *Asperę arteriæ* diuisioni, primisque eius ramulis adiacentes: at nupèr, cùm substantiam *Pulmonum* ab *Asperâ arteriâ* eiusque ramis, seu bronchys separarem, magnum reperi eiusmodi glandularum numerum sese deindè in omnibus, quæ secui cadaueribus constantè offerentium &c. Et paulo post; adiacent, subdit, glandulæ illę potissimum diuisionibus *Asperę arterię & bronchiorum*; alibi tamen etiã incumbunt illorum lateribus, quod maxime obseruaui circa ramos maiores &c. Ob quam rem non mediocritè lætatus sum porro, & cum viderim indè ostentum iri aliquandò posse Lectori meo candido quatinus quicquid in superioribus abs me propositum

fitum est, id non in folle omninò, partim etiam tanquàm ab alys Annatomicis me ipso sagacioribus antea olfactum oblatum fuerit: licet ex alia parte nec minor deindè tristitia in me defluxit, vt mox legi munus *Bronchialium* eiusmodi glandularum, prout ab eodè *Authore* traditur, nihil differre à munere aliarum haftenùs recensitarum. Ecce enim quemadmodum de illo loquitur *Verheyen*: *Cum glandularum officium sit, inquit, separare certum aliquem liquorem à reliqua massa. hoc etiam glandulis modò descriptis concedi debet. Verùm qualis sit liquor ille, quorsumque tendat, non ita clarum est. Interim vix dubito, quin per hasce glandulas separetur humor ille unctuosus, quo oblinitur interna bronchiorum superficies, ne ab aere sicciori reddatur nimis arida & aspera &c.* At verò quantoperè inter se discrepent *Bronchiales Superiores* à reliquis satis superque demunstrat autopsia. Nos itaque attento quòd eadem plurimùm de *Vasculo-uefficulosarum* natura participant: quòd itèm nullum vasculum inspectum est ab ipsis concedere in Bronchiorum cauitatem, obstruentibus nimirum, viam qualemunque annulis eorundem Bronchiorum carthilaginosis, qui simul arctè admodum commissi sunt; imò è conuerso quòd

complures conspecti sint, qui ductûs vnâ coalefciendo distribuebantur ad extremum bifariâ ad OEsophagum, vt antè fuit memoratum, maluimus propterea eas tueri partes, quæ suadere videbantur vnctuosum illum taliû glandularum humorem in Gulam potius, quam in Pulmonem instillare; licet ex alia parte, de alio, scilicet è reliquis in Bronchiorû extremitatibus inuentis glandulis, transfundante, facilè contrarium opinaturus essem libentèrque *Verheyenij* sententiæ subscripsissem. Coeterò talis liquor, aut quiuis è prædictis siuè posteriorèm superioris, atque imprimis dextri Bronchy partem occupantibus glandulis scaturiebat, congener erat illi, qui à Parotidibus expuitur atque à Tonsilis: idèst [vt benè adnotauit toties citatus Author] indolem redolebat vnctuosam, siuè oleosam, fortè & quòd Natura exigeret huius etiâ farine succos alimentis in *Deglutitione* cõmisceri.

X.
Prima di-
uisionis
Asperæ ar-
teriæ

Dispar nonnihil ab hoc visus est deindè qui humor è glandulis ad finem trunci, siuè in principio *primæ diuisionis Asperæ* arteriæ existentibus exprimebatur, nempè aliquanto olidior, ac magis falsus; id profectò quod ex eo procedere posse censui, quòd huiusmodi glandulæ magis compactæ erant

alijs

alys postremo loco recensitis, & quòd nimirum plùs ad *Vasculo-vesiculosarum* constitutionem accedebant. Quocircà, & quia vel ex hoc facile fuit augurari quemadmodum illud vasculorum par iuxtà easdem atque intrà vtrumque OEsophagi tubulum repertum, ductus erant ipsarum glandularum excretory, coniectatus sum proindè harum officium idem esse atque aliarum hætenùs enunciatarum, siuè quòd & istę fermento quodam armoniacali, aut vrinoso depluerent in OEsophgum.

Nunc quòd *Tracheales* abs me vocatas; has in eadem naui esse noui, in quâ & aliæ præcedentes: nempè in obliuione hominum sepultæ eatenùs fortassè hanc sortem obire debuerunt, quòd prò lymphæ receptaculis habitæ in reliquum negligendæ fuerint: quamuis apud me, qui illarum fabricam indagare non omninò perfunctoriè conatus sum, longè maiorem considerationem promereri uisæ. Quippè, quatinùs aut *Vasculo-vesiculosæ* compertæ sunt; aut *atro-luteæ, carneæ, sanguineo-adiposæ* &c., palam est nulla pollère facultate, quæ requiritur ad lympham excipiendam, generandam, aut alio quouis modo reficiendam &c; verùm potiùs

XJ.
Trachea-
lium.

quòd alio munere fungantur, siuè quòd fermentum exhibeant, quod ciborum concernat affectionem. Et de facto *Vasculo-vesiculosæ*, aut *Parenchymatosæ* glandulæ tali menstruo humefcebant albido, quod interdum degustatū inuentum est vrinam sapere, aut quempiam alium succum è genere armoniacorum: licèt planè [vt fatear quod res est] his ego saporibus haud multum fido, cum non fallat ipsos post hominis mortem, nedum post quamlibet istius ægritudinem, plurimum variare posse. Sed quicquid de his sit: innotuit certè mihi menstrvū illud muriaticū longè aliud, quàm lympham redolère, ipsumque porrò guttatim fluere in OEsophagum per illos canaliculos, quorum vestigia in eòdem OEsophago-sumus assecuti.

Carneæ autèm glandulæ, ne & ipsæ lymphæ præfici, seù præesse dicantur, facit, præter colorem earundem, etiàm substantia. Neque enim quis facile autumabit à Carne lympham gigni, aut renouari? Cum verò in comperto habuerim emunctoria glandularū præcedentium, nempè *Parenchymatosarum* in has inferi, perindè quasi illarum liquor per istarum substantiam filtrari consuesceret, arbitratus sum porrò ab his glandulis conciliari

liari aliquam vim vrinoso priorum recre-
mento, qua mediante istud dissoluatur acu-
etur, aut alio quopiam modo alteretur. At-
que ut noscerem, nùm iudicium hoc temerè
abs me elicited fuisse, nec né; exploravi
aliquandò in Vitulo *Iugulares* glandulas,
de quibus *suprà*; cumque in dextro ad
Oesophagum latere aliam sub *Iugulari* per-
lustrassem glandularum Conglomeratarum
catenam, mouebam desiderio sciendi quid
hæc præstaret glandula tam oblonga,
quidque elaboraret. Secui ergò ipsam ic-
circò mediam, inspectòque, quòd ab eius-
dem apice exoriebatur internè quidam du-
ctus membranofus, qui medioxumam ru-
rum talis glandulæ regionem in longum
mensurando aliosque hinc indè ramusculos
minores excipiendo sensim augebatur instar
Pancreatici canalis, perrexi inuestigare ubi-
nàm tandem eiusmodi tubus occideret?
Quamobrem introductâ in istum seta, huius
progressum curiosè contemplabar. At vix
fanè è glandula egressa erat seta hæc, cùm
protinùs allisit ad tuberculum quendam
rubrum toti eiusdem tubuli cavitati obiec-
tum: quem postea ipse attentè sciscitatus,
inueni tandem tuberculum esse carneum,

*Sect. I.
Artic. 26.*

intensè rubrum, & per quem humor á prælibato ductu delatus totus omninò filtrabatur: inditio existente hoc omnimodè filtrationis, quòd nimirum latex ille antea albescentis instar lactis, post efluxum ab eo tuberculo colore velut flammeo rutilabat. Hoc itaque perlustrato cùr de munere *Carnearum* glandularum supradictò ulterius ambegissem? Jàm verò, ut istarum officium tale creditum est, nempe ut priorum, idest *Vasculo-vesiculosarum*, succum sale aliquo imbuant, atque imprægnent, cuius deinde ratione hic maiorem energiam nanciscatur; sic & de *Sanguineo-adiposis*, *Atro-luteis* consimilibusque glandulis deliberatum: impertire nimirum has eidem succo aliud sal, cuius ope is in illa canalium, quæ á *Vasculo-vesiculosis* præfatis ad Oesophagum tendunt, longitudine ac stricture in debita crassi, aut dissolutione sua contineatur, utque ritè præparatus idoneus euadat se se intimè coniungere alimentis per eandem Gulam percurrentibus, easque partes implere, ad quas idem á Naturâ fuit destinatus. Hinc etiâ Succenturiatæ glandulæ, Lien & similia alia tale quid præstant respectu sanguinis; prout mihi à consummatissimo Viro ac Magistro meo D. *Petro Chirac* Professore

fessore *Monspeliense* iam alibi laudato exemplis ac demonstrationibus sepius inculcatum fuit : sic itidem *Atræ* glandulæ respectu lymphæ, de qua tamen, ut ut observatione mea peculiari, non est aptus hic differendi locus.

Superfunt glandulæ *Thyroidææ* ; quarum officium iterum, ex consuetudine iam recepta, esse perhibetur, ut pingui quâdam & viscosa humiditate perpetuò stillent pro externa Pulmonalis fistulæ humectatione : verum cum hic usus [subintrat hic statim *Diemerbroek*) parum ad rem facere, & *Larynx* extrinsecus tali indigere irrigatione [uti plures somniarunt) non videatur, potius animadvertendum censeo (nota ipsa eiusdem verba) an-non aliqua vasa salivalia ab *ys* exeant ? id videlicet, quod nos in præcedentibus præstitimus. Quandoquidem exploratum habuimus complures parvas ac fistulosas fibras procedere hinc inde ab utrôque latere eiusdem glandulæ (Simplicem enim novimus, quam aly duplicem stabilire solent, glandulam *Thyroidæam*, ut de hoc pluribus etiam aliàs disputatum fuit) præsertim verò ab utrôque ipsiusmet glandulæ angulo exteriori ; & quæ demum caput ingerebant in *Oesophagum*

XIJ.
Thyroidææ

l. 2. Anat.
c. 16.

XIJ.
c. 16.

gum circa musculum Pharyngis constrictivum. Quo posito, qui neget munus talis glandulæ in eo consistere, quod suum recrementum Gule ministret? Talem quôque sententiam protulisse visus est *Morgagnus*, dum in hæc abit: *Ea cum ita se habeant, si porro ad notum respiciamus Diurni Opificis institutum in salivalibus, in mucosis Vrethrae alyscque glandulis propè aut subter musculos ipsis humectandis partibus subservientes, opportunissime collocandis, nonne, Sodales, sic videtur facile à Thyroidæa ductum aliquem promitti aut in Pharyngem atque Oesophagum, quos nempe ab lateribus illa attingit &c.* At quale demùm sit illud recrementum, quod nempe à præfata glandula sequestratum post illabitur in eiusdem Oesophagi cavitatem, nondùm equidem audeo dicere: *inferius*, ubi de eiusmodi qualitatibus sermo necessario instituendus erit, vltro importunus existam.

Namque hîc interim pluribus satisfaciendum est, ut si quæras vnde interiorem Laryngis, ut & reliquæ Tracheæ humectationem earundemque aduersus aerea spicula tutamentum auspicaturus sim, si *Thyroidæa* glandula & coeteræ hucusque memoratæ suos

OE-

Aduers. Anatom. prim. pag. 30.

Sect. 3.

XIIJ. Vfus Thy mi,

OEsophago impertiuntur riuos. Ad quod propterea resp: esse alias glandulas easdemque *Vesiculosas*, quibus hæc prouincia demandata est: imprimis verò esse quandam Carunculam, ceú glandulam pinguedine tectam, quæ Epiglottidis parti gibbosæ, siue dorso, inferiùs incumbit; rursùmque plures alias minores glandulas partem ipsius Epiglottidis concavam obsidentes, *quæ dictam cartilaginem (Verbeyenium audis)* & verosimiliter *Trachea cavitatem irrigant*. In reliquum autem *Thymus* est qui, maximè in pueris, eiusmodi negocium expedit. Quippè, cum eâ etate sanguis naturâ serofus Cordis thalamos aptè satis dilatare nequeat, vt per successiuâ deindè constrictionem ad extrema paruarum arteriarum, præcipuè *Bronchialium*, quæ minimè sunt, capillaria adhuc tenella, ac nundùm debitè actuata pertranseat, fit vt *Thymus* è vicinis Carotidibus latè imbibens illius serum, hoc postea per proprios canales lymphaticos erroget in *Tracheam* atque in *Pulmones*: at non sic verò in *Adolescentibus* & *Senioribus*. Siquidem sanguis, qui in his, salibus ac sulphureis particulis turgens Cordis motum alacritè cicerare valet, vt proindè *Bronchiales* ramos tùm

iàm probè distentos omnimodè metiri potest, dicto diuersorio [velut spongiâ] opus ampliùs non habet, à quo quantulacunque ipsius portio excipiatur; Verùm rectâ vnâ cum omnibus suis elementis migrat in arterias: vbi mōx lymphâ & fero in longinquum (vtpotè idonea gliscere) seorsim tamen ablegatis, vtrumque tandem pellit in Tracheam per *Sebaceas* glandulas in finibus arterioforum capillarium, nec non lymphæductum existentes, atque in dictam fistulam apertas: in quo quidém casu *Thymus* munere suo defunctus reuertitur in se, idest decrescere incipit atque emaciatur. Et sanè rem ità se habere respectu *Thymi* docet imprimis ipsa *Bronchialis* arteria, vt quæ in Prætextatis cōperitur non, nisi delineata: deindè illa vocis mutatio, quæ eandem prætextam exuentibus contingit ex lymphæ veteres cuniculos deferente, ac nouos fodicante. Sunt igitur *Thymus* medys lymphæductibus, atque in Adultis etiam *Sebaceæ* glandulæ medys *Rhuy-schianis* rivulis, quæ Trachææ vlteriùs prouident, ne ficescat: Pulmoni verò denique succurrunt tum eæ *Conglobatæ*, quæ in extremitatibus Bronchiorum suas colonias habent, tum aliæ *Disgregatæ* è finitionibus arteriarum eiusdem

dem *Ruyfchij* nec non lymphæ-ductvū resultant: quas nec ipse rursū Conglobatas vocare dubito ad imitationem præsertim Magni illius Adenographi *Marcelli Malpighij*, saltem eò vt nomen eiusmodi conseruetur. Quippe secūs *Conglobatum*, cū vix aliud, meo videri, sonet, quàm *Conglomeratum*, si proindè de alys glandulis prædicetur à *Conglomeratis* specie distinctis, non hanc, potiùs genus significare videtur, atque amborum conceptum in Mente confundere. Quapropter malui *Conglomeratas* generis locum tenere; quobisariam diuiso *Vasculo-vefficulosarum* nomine insignirentur, quæ ab alys Conglomeratæ hactenùs nuncupatæ sunt; *Vesiculosarum* autèm, quæ Conglobatæ; hoc nempè pacto glandularum natura ac substantia magis elucescente: & quod demùm superest de *Sebaeis*, siuè disgregatis; has, inquam, vè etiam *Conglobatas* appellare nequaquàm abnuerem cum prædicto Authore eiusdemque Sectatoribus, ad minimum, ne vulgata illa diuisio glandularum in Conglobatas & Conglomeratas videatur abs me, homine semisse, penitùs de medio tolli. Uerùm iam satis & vltra, quàm modestia sustinet, cantata hæc cantio est; ad seria igitur: vtque reuertamur eò,

*Epist. de
Glandul..
Conglob.*

vndè digressi sumus, iunge tandèm glandulis omnibus suprascriptis, quod respectu Bronchiorum Superiorum fieri potest, vt eidem fontes & Pulmonem & OEso-phagum inficiant, fortè quod in *Deglutitione* etiàm viscidus atque oleosus humor requiritur ad ciborum commistionem.

Sed perscrutanti quamobrèm vniuersæ glandulæ supradictæ etsi intima cum OEso-phago commercia exerceant, intrà ipsum tamen non consistunt? resp: hoc imputandum esse loco minús commodo, vtpotè nimirum quòd ibidèm vel compressæ fuissent eæ glandulæ, vel motum tunicæ *Musculosa* impediuisent (sicuti ob consimilem rationē etiam quædam glandulæ salivales positæ sunt ab Ore longiùs remotæ) vel demùm quia, cum humorem suum hauriant à *Cæliacis, Coronarys, Bronchialibus*, alyisque arterijs Cordi propinquioribus, si proindè altè OEso-phago affixæ fuissent, illum exigere ab his aliquandò fortè non potuissent. Quamvis nihilominus Canes suis non destitvuntur Conglomeratis glandulis in eandem Gulam impactis, sicuti initio præsentis Tractatûs insinuauimus, & qui tamen Canes ob id fortassè magis, quàm quòd consueuerunt, inter deglu-

XIU.
Ratio Si-
tuation.
Glandu-
larum e-
iusmodi
Conglo-
meratar-
um.

deglutiendum laborarent, nisi ex alia parte validissimo OEsophago eo musculo donarentur cuius vehementi conatu assumpta quæque vorant potius, quàm deglutiunt.

Quandoquidè autem partium OEsophagi munia indagare pergimus, locus poscere videtur, ut exploremus etiàm quale sit, quod ad *Nervæam* membranam pertinet. Patet verò istud facilè ex dictis, cum scilicèt nouerimus eandem tunicā externè vasculis exarata, in medio cicatricibus notatam, atque internè demùm foraminulis vbique peruiam. Undè adeó coniectandum fuit illam in extrinsecâ, & quâ *Musculosæ* contermina est, facie sua canaliculos tam excretorios sæpè memoratos, quàm alios arteriosos excipere, fulcire, distribuere: in meditullio autèm cum eorundem, tum insupèr lymphæ-ductuum finitionibus locū præbere, quo hæc se se veluti in calices expansæ fibras suas quoquouersum didant; ac denique quòd in interiori lamella cupulas huiusmodi operculante poris scateat, per quos humor é talibus lacusculis depleatur.

De *Villosa* verò Crustâ hæc pariformitèr adiungam; quòd nimirum eadem alienigenorum corporum ingressum impedit in dictos poros; siuè, quod idem est, quòd obstru-

XV.
Officium
denique
Tunicæ
Nervosæ.

XVJ.
Crustæ
Villosæ.

ctiones ab illis arcet, quòdque perlabentiũ angulofarum rerum eludit offensiones.

Undè iterũ hãc occasione examinanda demũ venit virtus illorum fluidorum, quorum alterum à limphę-ductibus falit in OEſophagi cauitatem, alterum ab arteryſ. Et quod prius: iamdiũ quòque patuit veram eſſe lympham à *Jugularibus* glandulis erumpentem, prout in Vitulis [vt dictum eſt] conſtantèr vidẽre fuit: lymphæ verò ſiquidem ros eſt, imò ſanguineum glutinum hinc à partium nutritione reſſiduum, indè autem non rarò in ſuccum nutritium faceſſere aptũ, vel alyſ neceſſitatibus applicari iuxtà promptuariorum, in quæ à Natura inducitur, diuerſitatem [quemadmodũ nempè *alibi* oſtendemus] manifeſtum fit proindè eam illuc influentem ob hunc finem duntaxat influere, vt ſcilicèt dictum canalem lubricet, vngat, obliniat, ne prætereuntia corpora præ ſtipticitate ſua fortaliſs morentur in viã, aut præ figuræ aſperitate *Nervæo* integumento moleſtiam incutiant. Quod autem attinet poſterius nemo ambigit, quin ſolæ ſint particule ſeroſę tenuiores, quæ arteriarum extremitates ſuperare queunt: vndè itidem extrã dubium eſt, quòd humor ab iſtis delatus in OEſophagum

XVII.
Et ſuccorum ſtagnantiũ in OEſophagum.

Diſſer. A.
nat. 2.

hagum nihil aliud intendere potest, quàm vt lympham prædictam in debita diuisibilitate contineat, ne afficescat, aut picis consistentiam acquirat; vt rursus Nervosas fibras in suo tenore conseruet, sitim extinguat &c.

Quibus eâ, quâ decuit, sedulitate perpenſis, quid reliqui factum iri autumasses, nisi vt dixissem succum glandularum Conglomeratarum suprâ recensitarum respicere directe ciborum *Digestionem*. Ettenim si eo duntaxat tempore tendit in OEſophagum, quo hi per eundem excurrunt; si salinus est ac variè coloratus: verbo denique, si fermentum est, quo nec membranæ, nec fibræ eiusdem OEſophagi egent, imò à quo alterationem potius, quàm iuvamen essent recepturæ: ex aliâ parte verò, si deolvuntur ad illam ipsâ fistulam aly liquores, nempe y, à quibus lubricitas, tonus, humectatio vnicè habentur, ad quem, amabò, collimabit scopum prælibatus humor, nisi vt cum dilabentibus per Gulam alimentis commisceatur, admixtus verò aliquem in his effectum producat, qui alius esse non potest, quàm ipſorum siue alterationis, siue *Digestio*, aut fermentatio &c.

Nec tam Autopsia, suaſerat hoc mihi etiâ Ratio, imprimis verò quòd aspexeram Au-

XVIIJ.
Humor
Glandularum OEſophagi
Vasculorum verum est fermentum Digestivum.

XJX.
Probatur
i. ex mul-

tho-

titudine
ac diuer-
sitate opi-
nionum
de hoc fe-
rmento

thorum sententias circá fermentum ad cibo-
rum *Digestionem* requisitum vndequaque in-
firmas, nutantes, neque alitèr, quàm longa
pervicacium hominum credulitate suffultas.
Quod vt clariùs constet, intuère imprimis
multitudinem, intuère diuersitatem! dices
nihil in *Academys* vnquàm tàm acritèr,
tàm luculentèr, tàmque indefinitè disputa-
tum. Nam post *Petrum Castellum*, qui primus
omnium illius fermenti necessitatem subo-
dorauit pro Chylificatione obtinenda,
mirùm quot habita de eiusdem tum quid-
ditate, tùm qualitate litigia!

Opinio
P.Castel.

Ep. 5. Med.
ad M. Au-
rel. Seuer

Idem *Castellus* [ex quo postea *Helmontius*
fermentationis in Uentriculo se se Authorẽ
fecit] scribit fermentum supradictum esse
portionem acidæ bilis è Liene transmissam panis
fermenti ritu omnia aptam miscère, commouère &
ebullire facere, atque in rarefactione ista, spon-
giositate cibariorum, quæ à spiritibus proprijs
concitatis fit, ob acidos spiritus mouentes & inqui-
etos, adiuvante calore, ciborum coctionem &
digestionem primam confici.

Helmon-
tij.

Splenem quòque fermentum in Venticu-
lum inspirare [cum nullas alias vias inue-
nire posset, per quas idem ad Ventriculum
commearet] statuit *Helmontius*: *Splen*, inquit

in Stomachum per vas amplum sui fermentum in-
spirat, neque enim Splen cibos immediatè attingit.
Itèm alibi: ità nimirum Splenis odore in Stoma-
chum spirato, cibi fermentati fiunt cremor acidus;
qui deinceps vertitur in salem urinaceum & in
vitalem. Pluribus hoc explicat in lib. de Calor.
non efficienter Digerent. & alibi.

De Sext.
Digg. S. 31.

S. 59.

Riolanus vt agnoscit hoc fermentum, ità ac-
cerfit quòque è Liene. Sic enim is: fermentum
illud nempè acidus humor ab Arabibus & Græcis
animaduersus fuit; illi ad acuendum appetitum,
hi ad constringendum Ventericulum, vt fiat fer-
mentatio & unio; sed si deesset Lien, vt qui-
busdam accidit, vel adeò exiguus esset, vt vix
unciam ponderaret, undè manabit ille acidus hu-
mor ab arteria Splenica, quæ defficiente Liene ha-
bet suam insertionem in Ventericulũ: sed præter istũ
succum acidum fermentativum, spiritum vita-
lem huic operi accedere non difficeor, qui auget ca-
lorem insitum Ventericulo; mutatio verò alimen-
torum in succum candidum, qui chylus dicitur,
non aliundè procedit, quàm ab albedine mem-
branarum Ventericuli. Porro tres huiusmodi
sententiæ ferè eiusdem fasciæ sunt, non ità
posteriores;

Riolani,

l. de Circ.
Sang.

Quamvis nec multum ab his dissentit
illa Gabrielis Fontani Medici Massiliensis,

G. Font.
in Apol.
Galen.

Q

cum

cùm afferit fermentum illud esse *Humorem Melancholicum*: quæ (si quibusdam credimus) quorundam quôque Arabum fuit sententia.

Petri Borelli.
l. 2, Obs.
Med, c. I.

Borellus autem loco succi melancholici substituit *Bilem* instar quasi aquæ fortis acerrimam & perinde quòque feruescentem.

Sennerti.

l. 3, Med.
Pract, p. I.

Quibus omnibus iterum lites mouet *Daniel Sennertus*. Idem vult esse in *Ventriculo* humorẽ acidum ingenitum & connatum, quem relicta cibi portio benè elaborata augeat & foveat: qui non sit crassus, sed tenuis & spiritibus corrosivis pregnans; qui grato quodã acore *Ventriculi* corpus nervosum afficiat & sua mobili virtute permeet omne ingestum, illudque soluat in liquorem, seu chylum, & omninò se habeat ut fermentum quò cerevisia feruescit fermentaturque, ut crassæ partes à tenuibus, & utiles ab inutilibus separentur: atque hunc humorem, si abundet, causam esse famis nimiae docet.

Craanen

Haud dissimilis ab hac est etiã opinio eorũ qui affirmant fermentum digestivum esse reliquias fermentatorum alimentorum in plicis *Ventriculi* haerentes, quæ diutina mora accescant & fermenti naturam induant, inter quos primum sibi locum vindicarunt Naturalis Philosophiæ Choriphœi spectabilissimi, *Craanenius* & *Vvillis*.

de Hom,
c. 7,

Præ-

Prætereà non defuerunt, qui *succum Pancreaticum* ad eas partes traxerunt. La *Chambre* apud *Clariss. Bartholinum* aduocauit *spiritus* (miror cur non alij etiam *Semen*, aut aliquod aliud, ex excrementis: *Sola, námque hæc superfuerunt*) alij demúm alia, de quibus verba habere pudet.

Maximè tamen omnium plausibiles hodierno sæculo visæ sunt denique binæ opiniones, altera *Hogelandi*, altera *Baky*, vel si mauis *Ioannis Maiouu*; quarum posterior, vtvt priori similis, nihilominus isti palmam præripuisse videtur ex eo saltim, quòd in ea omnes tanquám in fidissima statione quiescant, nihilque iàm magis Medicorum auribus, quám *Lympha Ventriculi acida* concrepet. Sic ergò *Hogelandus*: O *Economiam animalis inspicienti*, inquit, præter cibum alterandum et potum tum dicto cibo diluendo inservientem, tum cibi vicem suppletem, occurrit liquor quidam subtilis & attenuans, salua dictus, ex arterys per Palatum dispersis prodiens; cui cibo masticato & deglutito accedit in Stomacho ex arterys liquor alius priori non admodum dissimilis, præterquamquòd manifestè acrior, cibo in eiusdem faciliorem concoctionem digerendo, fermentando & quantum satis soluendo, eiusdemque essentia (parti nempe

pè puriori & magis oleosatum in corporis nutritionem abitura) extrahenda instar menstrui, ut Chymici similes liquores vocare solent, ex aqua forti & spiritu vini compositi, magis appropriatas. Postea quod dixerat probat in notis; quod, ait? siccissimus cibus E. g. panis biscoctus & similia nullo adhibito potu & digerantur & concoquantur? quod alij liquores E. g. in vomitu liquor non nunquam acidus, plerumque verò tenax ac viscosus, & 3. impedito menstruo fluxu menses per Stomachum & Os reijciantur. 4. quod appetitus videatur ab acredine similis humoris vellicando Venter fieri. 5. quod oculi cancri, cortices ouorum & similia ingesta sine fructu assumerentur. 6. quod volatilia, imprimis gallina tàm nostrates, quàm calicota in Stomachis suis scilicet vitrum, ipsumque aurum (ut partim ex fide dignis audiuit, partim propria experientia compertus est) soluant & consumant. Undè tandem concludit bonam vel malam cibi in Stomacho digestionem fermentationem, vel concoctionem magis huius liquoris acrimoniæ vel aciditati, aut Subtilitati, siue cruditati, aut viscositati, quàm ipsi Stomacho deberi.

Quòd Bakium autem; en quemadmodum loquitur! Assumptum alimentum Oris saliva aliquantulum imbutum (ut tantò facilius Ventrìculi

tricoli humorem admittat) Linguae partiumque Oris adiumento in Oesophagum atque eius musculorum fibrarumque ope in Ventriculum relegatur: ibi humore, quem interior tunica continuo exsudat perfunditur, contrahendique Ventriculi vimiscetur, quantumque potest subigitur. Videtur quod distenditur magis, eò varior fieri dicta tunica, eiusque pori patentiores, & vice versa: quare cum aliquid in capacitate ad diluendum continet, humoris huius maior affunditur copia, quam cum conciderit, tum enim & densatur & diluendi necessitas tantum non urget. A solo contactu colorem consistentiamue mutari, sine substantia additione vel detractione ulla naturali operatione visum fuisse non existimo: speculo alius ab obiecti specie color induci videtur, & à calore aqua dilatatur, imò seculum liquatur: sed, recedente obiecto & ablato calore, speculum colorem, & quod dilatatum liquatumue est, ad naturalem consistentiam reuertitur. Calorem, quatinus homogenea colligit, & heterogenea disiungit, ad coctionem facere confido; quamvis pisces, quorum interanea & ipse sanguis frigent, escam integrè deglutitam cum ossibus perfectè digerunt, & sunt præter modum rapaces. Huius sententiæ veritatem si quis ipsis oculis videre desiderat, iustæ magnitudinis piscis stomachum introspiciat, quando

L. de Cor
Cap. 2.

alium integrum pro pastu ingurgitauerit, cuius, quoniam non totum corpus simul, sed partes exteriores & fundo Ventriculi proxima prius digestionem consumuntur, piscis deglutiti reliquias aliquo elapso tempore videbit circum eas portionem digestam & propè Stomachi parietes succum (mucosum quidem, sed esca minús permistum) nouiter è tunica interioris poris sudoris instar egressum; ut eò magis dilutum, quod iam ferè digestum conspicitur, in intestina per pylorum contrahendi vi Ventriculi protruderetur.

Maionu,

*Tract. de
Mot. Mus-
cul, c. 5.
pag. mihi
55,*

Quibus denique nihil adiud addit Joannes Maionu quàm quòd humor ille (de quo Bakius) per tunicam Ventriculi intimam glandulosam pedetentim transudans lymphæ quædam sit certa acore grauida, siue acidis particulis turgida.

Tot igitur, tàmque discordes opiniones si quis animaduertat, nonnè facilè iudicabit singulos illarum Authores eius ingeny extitisse, ut quidquid, nedum in mentem, potiùs in buccam venerat, eructare voluisse?

Quid dicemus uerò (subiungit postea his recensitis Franciscus Piens) aut quam ex his sententijs amplectemur? Ego quanquàm hanc de Fermentatione sententiam (eò namque è debilitate argumentorum, quibus fermenta sua velut ad prælium instrunt dicti Authores, adduc-

tus

*Probat. 2.
à falsitate earundem opinionum.*

tus est Vir Eruditissimus, vt Fermentatio-
nis causam deferere aliamque Veteri Coctioni
tantum non consimilem tueri, quàm tam in-
firmas partes defendere maluerit) *aliquan-*
dò tuitus sum, pluribus quòque de illa habitis ra-
tionibus, non possum non tamen me continere,
quin expensis varijs his sententijs, dicam cum
Demiphone Terentiano Phorm. 2.4:

de Febris.
c. 5.

Incertior sum multò, quàm dudum.

Ego verò, qui *Chylificationem* media Fer-
mentatione fieri ipsis interdum oculis per-
lustraui (& de qua tamen re *alio* loco seruata
est Tractatio) quique adeò necessitatem
eiusmodi fermenti omnibus modis comper-
tam habui; vt *humorem* glandularum Con-
glomeratarum OEsophagi ceu talem admit-
tere coactus sum: sic coetera ab alys asser-
ta nunquàm arridère potuerunt.

Nàm i. quòd *Castellum, Helmontium, Rio-*
lanum ceterosque, qui in eadem acie mi-
litant: eorundem sic antiquata iam opinio est
vt spes nulla spondeat illam aliquandò sur-
recturam.

Ostendit;
falsitas i.
2. 3.

Explosa itèm est apud Juniores cum Medi-
cos tum Anatomicos sententia illorum, qui
succum melancolicum in campum reducere
non dubitarunt. Neque enim is discrepat à

Quarta,

succo

succo Splenetico priorum, qui porrò nupèr hodièque, cuius penſi exiſtat apud Philologos, nemo fanè non nouit.

Quinræ.

Sequitur *Borellus*, cuius *bilis* non paucis bilē concitauit. Non poſſum autem ego non tacitè ſtomachari, cùm audio aliquos eò inſcipientiæ deuectos, vt cogitarint eandem bilē, in Ventericulum regurgitare *Digeſtionis* tempore; quo nimirum plafma ſvum de fermento chilificatiuo verum finxiſſe viderentur. Obſtant ſiquidem tali regreſſui tùm alia plura, tùm verò motus liquidi ipſius-met bilis: ſitus Inteſtini *Duodeni* perpendicularis, Pylori anguſtiæ, ac motus periltalticus Inteſtinorum. Horum igitur actio niſi inuertatur, vt contingit in Jleo, nulli in yſdem contento potestas retrocedendi ſit. Quid? quòd vtcūque daretur licèt; bilis tamen nunquàm reuenteretur: quòd videlicèt *Vuiloſe* Inteſtinorum Cruſtæ intimè heſcens ab eòdem ferè continuo implicetur. Vlteriùs, ſi bilis reflueret ad Ventericulum, chymi defœcatio, ſiue præcipitatio, atque ad rubedinem diſpoſitio &c. vndè-nàm obtinerentur? Nec tam Cholidocus iſte, quàm Pancreaticus quòque ſuccus in illa regurgitatione ſuperiùs aſcenderet; ex quo innumera ſequerentur abſurda. Iunge
de-

demum, quod Digestionis tempore uti Ventriculus semper constringitur contentaque deorsum pellit; sic Intestina, ut quæ eidem obsequuntur fursum moveri nequeunt ad bilis regurgitationem.

Quod respicit *Sennertum*: supplantat ipsum hæc mea ratio. Nempè, si fermentum aliquod ipsi Ventriculo *insitum* esset à Natura ad alimentorum digestionem, Infantes equè ac Adulti digererent, atque eodem modo; in quo tamen contrarium observatur: cum videamus illos Digestioni sensim initiandos esse, primò quidem lacte, tùm pulticulâ, præmanforum in Os ingestione &c.; secus nunquam probè concocturos, imò & de vita periclitaturos, ut quotidie novimus. Quid: quod & melius istis concoquere deberent priores, nempè Infantes, eoque magis quò plus tenelli, ut bimestres, vel alterius similis ætatis: inquantum videlicet, quod fermentum illud nativum magis robustum foret in ijs, hoc est nondum ab extrarum sordibus seductum à primitiua sua indole descivisset; cum è contrà in adultis huiusmodi fermentum iam multum de Vigore, aut essentia sua remiserit. Quamobrè ego tale menstruum primigenium nec ab ipso *Calore Galenicorum na-*

Sextæ.

turali discernerem; & cùm insupèr visum id nunquàm fuerit, neque tactum, aut alio quopiam sensû inuestigatum

Septimè.

Similitèr igitùr & quod concernit *Chyli reliquias in Ventriculo* post peractam Digestionem, falsum est. *Tales enim reliquiae* (*Ettmullerum* audis) aut à se ipsis, aut ab alio aciditatem illam fermentatiuam contrahunt: si ab alio, de hoc redit quæstio, quid & quale hoc sit, & sic ad peculiare fermentum tandèm deuenitur; si verò à se ipsis, queritur, undè & quomodò acor hic emergat. Undè enim est, quod in febribus appetitu deficiente, & Digestione cessante alimenta ingesta non acescant, quin in his nidorem acori contrarium concipiant &c. Non est itàque in his undè *Senner-tus* menstrui sui *ingeniti* instaurationem inculcet, aut generationem &c. Et quod mea [vt nimirùm saltem circà, existentiam eiusmodi reliquiarum sententiam feram] has certè rarò, imò nunquàm deprehendi in Ventriculis tùm brutorum ieiunio priùs maceratorum, tùm hominum siuè fame ex morbo, siuè alio quopiam casu enectorum: aduerti autèm ibidèm quandòque superfluitates quasdam subflauas, quasi biliosas, & quæ cum chylo nullam omninò dicebant affinitatem.

Inst. Med.
c. 7.

tem. Quocircà potiùs opinari decuit easdem congeriem fuisse quandam tam mucci è Ventriculi parietibus exfudantis, quàm alterius è *Vasculo-vefficulosi* OEsophagi glandulis ad fundum eiusdem Ventriculi delapsi, ibique simul aceruati, vt nimirum ex colore ac sapore ipsarum in promptu fuit iudicare.

Mittola *Chambre de Spiritibus* aliorumque de *Succo Pancreatico* commenta, &c. Quippè, quoniam ipsa hæc ridicula ac Mimo digniora, quam schola sunt, nec refelli quidè debent. *Quod qui facit (ait Vvilkius) videtur vereri, ne quis credat. Prætereunda igitur ea, quæ pro falso contra falsum differuntur: satis est ea refutare, quæ contrà verum disputantur.*

*Comment
in Orat.
I. Mureti*

Præstat enim rectà irruere in *Hogelandum*, *Bakium*, *Maiouu*, cèu quos, missis coëteris, solos nunc admiratur Posteritas: et quorum adeò opiniones si falsas interdum spectare contingat, actum de fermentis hætenus ad ciborum fermentationem adhibitis; sique aliud non detur, nescio quomodò hæc absolutum iri possit? Iàm verò cùm simul penè concordent dicti Authores, aut saltèm finis sententię vnus, gradus sit alterius, incipiam

Ostendat.

propterea ab illa *Hogelandi*, aduertamque an succus, qui ab arterijs deferitur in Ventrículum, verus esse possit *humor digestivus*. At verò & ne hoc crederem fecerat iamdudum Observatio illa, quâ nempè in comperto habueram liquorem, qui ad arteriarum extremitates propellitur, esse ipsum purum putū sanguinis serum, vel ad summum, idem serum salis alicuius fragmento permixtum, quale inquam fragmentum obseruare est in Sudore, in succo humectante Peritonæum, Pleuram, aliasque partes, ad quas arteriæ terminantur, &c. de quibus latius in *sequenti Dissertatione*: vbi etiam fusiùs declarabimus quæ *suprà* attulimus de Oesophagi humectatione. Quo stante neminem arbitror asserturum id, quod ab arterijs deferitur in Ventrículum, idest sanguinis serositatem tanti fore, vt alimenta ibidem congesta fermentet. Sed demus nihilominus, non solum serum, accurrere eodem etiã alias sanguinis particulas tum integrantes, tum & essentielles; vndè est tamen, quòd hæ illic acidæ euasurę sint, aut tales, quales requiruntur ad ciborum fermentationem? *Diemerbroe Kij* sanè hoc est iudicium: *Hanc*, nempè *Hogelandi* assertionem

Diss. An.
2.
Secti. 1.
Art. 27.

Anat. l. 1.
q. 6.

nem (inquit) illud euincit, quòd sanguis arteriosus, propter sulfurearum partium prædominium non sit ullo modo acer, sed omninò mollis, mitis, dulcis, ità ut neque in Ventriculi, neque in aliarum partium quantumvis acutissimè sentientium (quales sunt tunica Adnata in Oculo, Glans Penis &c.) tunicis ullam corrosionem, aut molestam punctiōnem faciat, vel facere possit. Præterea hinc sequeretur, quò plus huiusmodi arteriosi sanguinis ad Ventriculum inanitum pelleretur, eò maiorem futuram famem; atquè contrarium liquet in febris ardentibus &c. Frustra igitur (subdit paulò post) ex arterijs viam huic liquori fermentaceo ad Ventriculum commiscitur Ludouicus de la Forge in Annotat. ad Carthes. l. de Hom., ubi sic inquit. Posset rogari, quare ille liquor [fermentaceus] per arterias potiùs ad Stomachum, seù Ventriculum, quam aliò feratur? Ad quod resp. arterias, illum æqualiter ad omnes partes deferre, sed poros omnium membranarum non esse adeò conniuentes ad transitum ei concedendum, atque sunt pori Ventriculi. Quòd hoc fictum diuerticulum sit nullius momenti, patet in membranis Cerebri alysq̃ue multis quarum pori sunt adeò conniuentes, ut per eas sanguis arteriosus multo copiosior deferatur, quàm

ad Ventriculum, & tamen nulla ab eo erosio, aut vellicatio in ys peragatur. Nonnulli, ut dictam corrosionem melius defendant, dicunt acriorem sanguinem ad Ventriculum demandari, vel fluere quam ad alias partes. Sed hoc cum nulla veritate coheret: quoniam unus idemque qualitate sanguis equaliter à Corde propellitur ad omnes totius corporis partes, nec quidquam est, quod acriores ab alijs mitioribus separet, & ad has potius, quam ad illas protrudat partes.

Nonæ.

Has itaque difficultates quasi olfecisset *de Bak*, non quòd filtretur humor acidus prædictus, aut alio quopiam modo in Ventriculū separetur, maluit asserere quòd transfudet in eundem, censuitque ipsum Ventriculum instar vulgaris telæ fabrefactum ita scilicet, ut quò plus extenditur, magis etiam rarefcat. Quo non obstante, tenetur semper assignare. Nervosus Author unde nam liquor eiusmodi transfudet? & si ab arterijs, redeunt argumenta *Diemerbroeki*; si verò aliunde, cur locum non indicat? Noui equidem & ipse in Piscium quorundam, præsertim verò Luciorū Ventriculis [suprà quos arteriæ non repunt] alios minores pridem ingestos sensim deliquisse; sed patuit etiam in his, quatinus externè ab eodem Stomacho, & circà Abdomi-
nis

nis capacitatem hærebat vndique membra-
na quædam nigridula, ferè vt Vnea in Ocu-
lo, quæ tali sacco propterea incumbens in-
spirabat in ipsum, aliòqui subtilissimum vas,
moleculas quasdam tenues, acres atque
amaricantes, quæ in escam postea infixæ ea-
ndem pedetentim eliquabant initio sumpto
ab ipsa piscis deuorati peripheria; at minimè
tamen arguendum est hinc, quòd idem acci-
dat & in homine. Alia quippè in hoc est Ven-
triculi structura: tunicæ nimirum tres aliæ
alys superpositæ, densitate etiam ita inter se
certant, vt vnaquæuis earum simplicem
illam, undè Lucy Ventriculus est, mem-
branam decuplo crassitie superet. Quo posito,
videtur quòd in stomacho humano minús
admittenda est illa perspirabilitas, quæ requi-
ritur pro fermentatiui humoris admissione:
quidquid ex alia parte talem quòque reputat
Hen. Regius, imprimis verò eiusdè Scholias-
tes ac Discipulus *Ioannes Broen*, vt qui in eam
flatuum causam refundere non veretur. Nám,
quod attinet dictum fermentum; ductibus
opus est vel patentissimis, præcipuè in Visce-
re complicato ac firmissimis crassissimisque
membranis constante. Prætereà verò vnde-
nam idem *Iacobus de BaK* tale hauriat fuda-
men

Pra. Med
3. Medi-
cat. 6.

men? nùm ex Hepate, aut Liene? an ex Omento, Peritoneo &c.? Dicam potius cum *Plauto*; *Nugæ Theatri*.

Decimæ.

Accessit ergò demùm *Ioannes Maior*, qui prædictis difficultatibus obuiam satis iri posse ratus, si diceretur fermentum illud acidum è glandulis in tunica Ventriculi intima existentibus scaturire, tantum abest, quin hoc nouo commento eisdem suffragatus sit, vt potius nouas excitauerit: i. nempè, quòd tales glandulæ meri sint folliculi membranosi è finibus arteriarum, aut lymphæ-ductuum emergentes ad eum modum, vnde pleraque *Disgregatas*, ac præcipuè quæ ad Oesophagum sunt, resultare diximus, præter Autopsiam, monet etiám Authoritas. *Thomas Villis* Vir, si qui alius, in Anatomia Ventriculi exercitatus, vbi de ijs glandulis sermonem habet, sic effatur: *Crusta Vuilosa in postica, siue conuexa eius superficie, qua tunice Nerueæ coheret, glandulis annulatis numerosissimis ubique consita est, quæ proculdubio vasorum in tunica neruea debiscentium ora contegunt*. Et rursùm de osculis siuè extremitatibus huiusmodi vasorum: *Hac annota* (subdit paulo post) nempè tunica glandulosa, aut potius inferiori Nerueæ membranæ lamina, occurrit ipsa tunica Neruea, siuè istius la-

us lamella, fibris vary generis & diuersimodè contextis constans, per cuius telam raram vasa sanguifera innumera & ramificatione densissima producuntur, inque superficie eius interiori, ubi tunica glandulosa choarent, terminantur. Tandem verò qualia sint hæc vasa edixerat iám paulo antè his verbis *Hæc lanugo* (loquitur de Crusta Vilosa) *Vasorum*, quæ tunica Nerue & densissimè inferuntur, ora ubique obtegit, ac tutatur, nec nō humores ab arterijs & nervis transudantes suscipit; dū interim Venæ chylum aliosque Succos in hac parte scatentes exsugunt. Hinc etiam Malpighius idem significare visus est cū hæc adnotauit: *Postremo hanc eandē structuram in humano Ventriculo deprehendi; A neruea namque membrana perpendicularitèr, fibrosa, seu fistulosa corpora assurgunt, ita ut exterior superficies rete delineet, & vasa sanguifera manifesto occurrant. Eæ autem fibræ concauæ & quasi nerueæ nihil aliud, meo videri, sunt, quàm arterioforū capillarium desinentiæ sero repletæ* [ettenim sanguinis rubicunda portio ob maiorem crassitiem eò non penetrat] & quæ demum fibræ in interiori tunicæ nerueæ lamella (*tunica glandulosa dicta*) digitatim, vt sic dicam, expansæ folliculos excitant illos, idest acinos membranofos cōmuni glandularum *Sebacearum* nomine

indigetatos. Hoc posito qui nam existimabit arterias, aut limphę-ductus menstruum acidũ Chylificativũ in Uentriculum regurgitatu-ros? Priores sanè tanti non constare contrà *Hogelandum* superiùs docuit *Diemerbroek*; posteriores autem tale quid aufuros Docti nequidẽm somniarunt. Dic igitur potiùs *Sebaceas* illas glandulas [si tamen sic appellari merentur, quæ meræ sunt aperture, aut oscula minorum vasculorum] eructare tantummodò illũ humorem, qui ab ysdem canaliculis aduehitur, quique nulli alij necessitati vacat præterquàm quòd ei, cui in cœteris corporis cavitatibus inferuire solet: hoc est, ad irrigandas tunicas antra eiusmodi conformantes, internâque istarum superficiem maximè à prætereuntiũ corporum iniurys protegendã perindè ac de Sero, ac Lympha in OEsophagum instillantibus aliàs fecimus manifestum. Et de facto, quis inficias eat huiusmodi cum humectationem, tũm & lubricitatem non esse præcipuas dictarum cauernarum egestates? Quod meum est; vix, ac ne vix quidem, intelligo quemadmodũ Intestina e. g. à flatulenta distentione, fæcũ intrà rotatarum asperitate, grauitate, erosione &c. immunia essent abitura: nisi ex vna parte serũ ab arterys prodiret, quo illorũ mem-

membranæ madescerent, vt funes, dùm ali-
quod pondus sustinent; ex alia verò lymphā
ē proprijs elicibus non ingemisceret in eadem
per *Peyeri* glandulas (vt abs me aliquandò fuit
adnotatum) quā nimirum interior Intesti-
norum membrana irruentia velut tela pro-
telare apta euaderet. Equidē ob consimilem
huic finem muniuit Natura Pulmonalem
fistulam *disgregatis* glandulis; prouidit &
Vesicæ, Vaginæ, Vrethræ &c. Cūr verò his-
ce visceribus tam propensa, soli tamen Ven-
triculo nouercaretur illa Parens, illa, inquam,
Parens, cuius prouidentia æquē sibi consta-
re dicitur in minimis rei momentis, atque in
Coelo ipso? an, quod Ventriculus minús
distendi egeat? vel est, quod nulli corporum
subiacet offensionī: quid, inquam, est, quòd
ei congruos liquores non esset elargitura?
Verum ex aduerso, hunc in maiorem, quā
vt sacculus quisque membranofus ferre possit,
molem excrefcere testatur Experiētia, notāte
Plempio illum nouem pintas vinarias inter-
dum conclusisse. Adde, quòd Ventriculus
eodem, vt paulo obscuriore, quo & Intesti-
na, gaudet peristaltico motu. Quī verò ipsius
tunicæ tūc huic, tūc imprimis eiusmodi ex-
pansioni suffecturę, essent? nisi humore imbue-
ren-

rentur, quo earum fibræ tenfiles ac contracti-
 les afferuentur? Quod autem lubricationem
 illam dubitatam; qui nescit locum esse hunc
 & harenam, in qua alimentorum particulæ
 irritantur, excandescunt, ac digladiantur,
 siuè, vt planius loquar, vbi hæ in fermenta-
 tionem erumpunt? Qui igitur facile ab ipsa-
 rum ictibus eluctatura esset imprimis Intima,
 idest *Nervæa* eiusdem Ventriculi membrana?
 nisi lymphâ, velut oleo, oblinita esset, quâ
 illarû prismata, velut Antagonistarû manus
 eludat. Concedere itaque tenetur siuè *Bakius*
 siuè *Maior*, aut, quisquis alius sit, qui se se
 eiusmodi sententiæ Authorem gloriatur,
 succum à *Sebaceis* Ventriculi glandulis (po-
 tius poris, aut vasorum osculis) effluentem,
 non ciborum fermentum, tantum humo-
 rem esse tunicis Ventriculi competentem,
 atque intrinsecum earundē linimentum, qua-
 lis nempè est ille, qui in OEsophagû, Intestina,
 atque in consimiles alias decidit cauitates.
 Insurget hic nihilominus aliquis, oggeretque
 posse idem numero serum eandemque lym-
 pham tum Uentriculum humectare, tum
 lubricare, atque etiâ cibos fermentare:
 neque insuetum esse Naturæ (quod nempè
 etiâ abs me alibi celebratum est) vt eadem, re
 atque

atque eòdem in corpore alias atque alias comparet affectiones. Ad quod resp. istud esse omnino impossibile.

1. Quia aliud est Serum, aut Lympha; aliud est fermentum. Serum sanguinis (mone-nte Zypæo) est humor massæ sanguineæ magis aquo-
sus; diciturque magis aquosus (pergit idem) quia sequestratus alias habet particulas com-
mixtas, U. g. salinas, acidas, & alias pro qua-
rum diuersitate, lympha, salua, aut aliter no-
minatur. Purum interim tunc serum prout hic
spectatur non est: sic etiã lympha nihil aliud
est, quàm Humor serosus totus limpidus vasis ly-
mphaticis conclusus. Fermentum autẽ quid sit,
docet Ettmullerus, cuius, adeò Textum inte-
grum libet hic apponere: Fermentorum nomen
& doctrinam ex Helmontio potissimum habemus
satis tamen obscuram ab eo relictam. Illustra-
runt eam deindẽ nonnihil Uvilisius & Kerge-
rus Trac. de Fermentatione, sed partim crasse
satis, partim insufficienter adhuc. Re tamen
longius penès me reuoluta nihil aliud tandem
ea esse deprehendo quàm particulas volatiles spi-
rituosas materia cuidam lenta seminali, salino-
oleosa, tenui tamen intimius immixtas, quam
ipsam dum in minima resolvunt, ac in similem
sibi substantiam conuertunt [quod suis finibus
S 3 clien-

Fundam.
Physico-
Anat. c.
Art. x.

Art. xv.

Dis. III.
S. 53.

clientem qualitatem cooptare vocat Helmontius Tr. de sextup. Digest. &c. §. 14] *in atmosphæram quandòque odoratam cum illis diffunduntur, perque hanc in obiecta vicina adequata agentes, parua sui quantitate magnam horum massam in eandem cum ipsis naturam transmutant.* Quantum igitur distent aquosæ, aut ferosæ à volatilibus, spirituosis, aut folino-oleosis particulis quisque facile nosse potest, adeòque inferre nùm serum aut lymphæ præfata, fermenti nomine dignari mereantur, necnè? Oppones tamen dari menstrua insipida & aquosa, vt benè Chymici obseruarunt. Esto; verùm hæc satis esse non posse pro alimentorum fermentatione inferiùs fiet palam. Addo nunc, quòd neque omninò volatilia. quippè quæ in fixum ægré agere valent; alimenta autèm magnam partem fixa sunt.

2. Quia ferosæ ac saline moleculæ simul cohærere nequeunt. Siquidem posteriores, si volatiles existant, à prioribus nullo labore liquantur: vndè spirituosæ omnia aquæ permixta defetiscunt protinùs atque eneruantur: si verò fixæ, per illarum canales nequaquam flvunt. Ettenim, cùm arteriosorum, nec non lymphaticorum capillarium diameter perexiguus sit, par iccirco hic esse nequit ex-

cipiendis particulis paulò crassioribus; tantum Serosis, vtpotè omnium in sanguine contentarum minimis, ac præ figura sua globulosa quacumque gliscere idoneis. Quæ cum ita sint, non credam serum eam præstiturum operam, quæ sali competit, duobusque inter se penè diuersis munys plenè satisfactorum.

3. Quia idem serum, quo instante Ventriculum humectaret; eodem & istum proritaret. Nam si salina spicula vnà secum adduceret, cur non ea impingeret in fibras tunicæ præsertim *Nervæ*, suprà quam id vltimò deuoluitur? Cum igitur istud perpetuò colet in illum Vtrem, neque tamen aliquam ei molestiam faceffat vnquam, dic potius abhorrere à tali salium conforito dictum liquidum, simplexque atque innocens ab horum cladibus in internum Ventriculi conspectum iugiter venire.

4. Demum, quia, si tale serum, aut lymphæ lenitiua simul essent & chylicatiua, fieri non posset, quin qua parte posteriorem effectum daret, eadem & Palatum afficeret: at quandoquidem illud Linguâ exploratum nihil sapit aliud, quàm aquam meram, adsummum etiàm vnctuosam, vtpotè quia posteriori

riori, idest lymphę coniunctum est, dicendū videtur abesse ab humore in Ventriculum transfudante conditiones, quę ad chylum conficiendum desiderantur, solis existentibus alyis feri ac lymphę proprijs, & quę ab utriusque configuratione dēpendent. His ergo sic examinatis iniuriam me in quenquam indē minimē collaturum censui, si dicerem lympham Ventriculi totiēs repetitam fermenti titulo haūd esse decorandam.

Ast 2. falsitas eiusmodi opinionis antē oculos obuerfabatur quotidie magis, ut aduerti postea lympham illam acidam nullo pacto fuisse compertam. Testis huiusce rei fidissimus extiterat eiusdem Sapor, quem ex Gustu, uti non ita pridem adnotatum est, cognoueram esse omninō aqueum, imō insipidū. Quod ergo superest de coniecturistā *Hogelandi*, quā aliorum, qui talem acorem tribvunt prælibatę lymphę: ex eo nempē, quod *is sepius in Ventriculis canum ieiunorum dissectorum* (ait *Zipæus*) *inuenitur & nobis manē etiā benē habentibus, & post debitam chylificationem subindē eruētatur: ab illo cibis commixto stupent nō rarō dentes in vomentibus: ab assumptis acidis roboratur chylificatio &c;* quod itēm Uentriculi agnini, suilli atque aly plures ritē infumati

mati ac preparati lactis inferuiant coagulationi &c.: hæ, inquam, coniecturæ tãni debiles existunt, vt nihil minùs, quàm aciditatem lymphæ Gastricę persuadeant. Nàm quod canes; dato licèt, quòd in eorundem Ventriculis acor eiusmodi inueniatur (id tamen, quod me hucusque latuit) quì nihilominùs ignorabit prædictum saporem è chyli superfluitatibus ibidèm accessentibus non posse prouenire? Iunge, quòd, iuxtà *Ettmullerum*, *chylus pro varietate animalium toto differt genere, licèt vno eodemque alantur nutrimento: & quadam ab vno animali digeruntur, quod non fit ab altero; v.g. dùm turtur belleborum optimè digerit, & canis vitrum antimonij sine vlla euomitione: iam verò alius chylus est in cane, alius in homine eodem pane licèt nutritis &c.* Quid igitur cani & balneo, iuxtà veterem paroemiam? *Secundò* ructus acidi, qui ex chylicatione fiunt, pro effectibus considerandi sunt, non tanquàm causæ: quantum autem hæ ab illis differant, non est, cùr hìc exagitem. Sic aliud sapit fermentum, aliud fermentatum. Sapor enim sequitur configurationem partium & texturam. Quamobrèm spiritus vitrioli acidus, & oleum tartari per deliq. vrinofum, coniunctione mutua abeunt

*Inst. Med.
c. 5. thes.*

in tartarum vitrolatum saporis lenitèr falsi vel ferè insipidi: acetum attactu minij in talem exit cum eodem texturam, quâ sapor dulcis, sacharum Saturni dictus, exindè emergit: spiritus sulphuris, vel vitrioli cum terra sigillata texturam & saporem instar aluminis acquirit; spiritus acidus in sulphure, insipidus in Marte, sub vitrioli martis præparatione saporem vitriolaceum dulcem contrahit &c. In tantum, nempe texturæ particularum mutatæ mutant sapores: sicuti & ob diuersitatem fermenti, mixtorum, quæ fermentantur, strues variatur. Dic itaque ructus acidus à cibis fermentatis resultare, potiùs quàm ex fermento, vt consideranti patefcit. Idem dic, *tertiò* de vomitibus acetosis & *quartò*, quod attinet auxilia chylicationis ab acetabulis; tantùm abest, quin hoc opinionem acoris in lymphæ Gastricæ confirmet, vt eandem potiùs eneruet. Nám si fermentatio emergit ex combinatione partiũ diuersæ naturæ [quemadmodum nempe & lippis & tonsoribus, vt aiunt, constat] si proindè homogeneas in id particulas continuò sufficias, frustra fermentationem quæres: vndè adeò liquet, quòd si additione acidi acuitur chylicatio, mēstrum chylica-

tivum

tivum non est acidum ; verum potius alkalicum, aut alterius indolis ab acida diuersæ. Atque hinc porro factum fuisse arbitror, cur *Mochius* Digestivum menstruum alkalicum stabilire primus omnium non dubitauerit : quem postea secutus *Daniel Taury* ipsius sensus transtulit in hæc verba. Il'ya peu de personnes qui croient présentement avec Vanhelmont, que le leuain de l'estomach soit acide : au contraire l'experience semble prouuer, qu'il tient d'auantage du salin, quoi qu'il contienne des parties acides & alkalines, volatiles & fixes, huileuses & aqueuses ; & les Autheurs meme, qui doutent, s'il se fait quelque fermentation dans l'estomach, ne laissent pas de dire, qu'il est certain, que l'humeur fermentatiue de l'estomach n'est point vn acide, mais vn acre salin-volatil ; parceque sans celà l'on ne pouroit pas concevoir comment les sels volatils, qui sont enuvelopes dans les aliments par des aigres, pouroient se deueloper dans le ventricule, si le leuain de l'estomach ne contenoit des parties propres à en diuiser, & detruire la force. Huiusmodi paritèr genio victi *Graaffius Dola-* *us* quid de essentia lymphæ illius Gastricæ non sunt commentati ? statuerunt nempé ip-

Notelle
Pratique
des Ma-
lad. Aig-
ues. 1, c. 2

sam hi acido-volatilem, aly salino-ammoniaca-lem, nonnulli acrem fixam, plurimi volatilem oleosam &c. adeò, quòd *Wvaldschmidt*, cùm tot Autorum sensa nedùm percipere, vix enumerare posset, ad extremum in hæc verba prorumpere coactus est: *Quid fermentum Ventriculi propriè sit & an illud in Ventriculo* (nota hæsitantiam Viri candidissimi, & quâ nostro inuento de humore digestivo ad OEsophagum procedente præcludere videtur) *reperiatur, nondum usque adeò evictum, aut in liquidum deduci potuit.* Et sanè quamobrèm humor ille acidus [viti nempe suprà contrà *Hogelandum* argumentatus est *Isbrandus de Diemberbroek*] potiùs ad Ventriculum appuleret, quàm ad OEsophagum, aut ad alias aliarum cavitatum membranifarum conglobatas glandulas? Respondebis fortassè, hoc intantum contingere, inquantum quòd specialis *disgregatarum*, siuè conglobatarum, quæ ad Stomachum sunt, glandularum structura id importare videtur. Sed dic, quæso, quidnam peculiare inest ys glandulis, cuius ratione acidum potiùs quàm alkalicum filtretur exindè, aut elaboretur? Profectò ipse structuram illam nullatenùs discriminare obseruo à structura glandularum conglobatarum

Inst. Med
Rat. I. c. 3.
 71.

rum OEsophagi, Intestinorum, Vessicę, Pericardiy &c. Vel igitur dicendum, quod acidum vniuersaliter depluit in id genus glandulis; & sic nullum esset acidum Ventriculi proprium: vel partes eiusmodi sunt deferendę. Replicabis iccirco esse fermentum quoddam innatum *sebaceis* illis Uentriculi glādu-
lis, cuius vi salia illuc adproperantia in acida conuertuntur. Ad isthęc tam absona, & rationi sensuique aduersa homines venisse? Ades Varro, tecum proclamo.

Postremo nemo argutus quidquam somniet

Tam infandum, quod non aliquis dicat

Philosophus.

Lips. 2.
Manud.
ad Stoic.
Phil. diss.
2.

Quid enim tale fermentum à Veterum tūm qualitate, tūm facultate differt? Ac prætereā, vt mechanico Iuniorum more loquamur, nonnē ingenitum illud sal à diutina labente pluvia, idest fero [quod perpetuò transit per dictas glandulas] dilueretur planē, ac forinsecus expelleretur? Equidē si de Conglomeratis tam *Vasculo-vefficulosis*, quā simpliciter aut *Vasculosis*, aut *Vefficulosis* sermo esset, non ambigerem, quin ob multiplicem fibrarum atque acinorum membranosorum contextum, prædictum sal retineri conseruari, quin imò & renouari ibidē posset; verūm

in Conglobatis, idest *Sebaceis*, aut *Disgrega-
tis*, quæ meræ sunt arteriolarum, aut mini-
morum lymphæductuum extremitates in
folliculos (vti pluriès significatum est) ex-
panfæ, id aliquandò contingat impossibile
omninò reor. Postremò quæ causa esset, cùr
fermentum illud innatum in *sebaceis* Ven-
triculi glandulis potius, quàm in alys eius-
dem generis ad Intestina, Uessicam, Pericar-
dium &c. existentibus collocaretur? Has
igitur fyrtes, cèu totidem Scyllas, cùm vi-
tare vellet *Maionu*, in Carybdim incidit, di-
xitque lympham Ventriculi acescere ob ad-
inuctos sibi spiritus animales ità nimirum, vt
fermentum digestivum primariò oriatur ex
spiritibus animalibus per neruorum ductus
in membranas Ventriculi depositis, & ibi-
dem speciali lymphæ membranę glandulosæ
sociatis, è quibus vtrisque per vasa excre-
toria glandularum in Ventriculi cauitatem
ingestis, inspiratis, liquor istius fermentativ-
us componatur. Quippè quòd spiritus ani-
males sacra velut anchora in huiusmodi casi-
bus existant, ac tutum ignorantie asylum,
quisquis nullo negotio iudicare potest. *Fig-
menta* (inquit D. Hertz) *sunt hæc, atque ad ani-
les fabulas proximè accedunt; quod & nos ali-*

bi, DEO dante, Ratione, atque autopfia ipsa comprobabimus. Atque ut palpabile aliquod argumentū etiamnū adducam contrā præfatū subterfugium D. *Maionu*, sufficiat advertere quòd ad *Sebaceas* illas Ventriculi, ut & ad alias confimiles glandulas, nullus pertransit nervus contrā illos, quotquot asserunt omnem glandulam nihil aliud esse quàm compositum ex minimis quatuor vasorum ramusculis: arteria nimirum, vena, nervo atque excretorio vase. *Hac enim qui lumine corporeo perspicere valet* (inquit *Verheyen*) *eum Argo oculatiorem esse oportet. Certò aliud indicare videtur glandularum moles, atque in pecudibus saporum diversitas. Ratio quoque dictat opus esse aliqua speciali substantia, quæ dictos ramusculos quodammodò colligat, & in situ convenienti detineat.* Quid? quòd qualis sit *Sebacearum* eiusmodi glandularum substantia, iam satis inculcatum est (ut ut nihilominus adhuc fusiùs de eadem acturi simus in sequenti *Dissertatione*) Ex quibus adeò abundè liquet nullum nervum influere in tales glandulas; tantum arterias, aut lymphaticos tubulos, aut aliorum quorumcunque vasculorum extremitates, ut in OEsophago e. g. accidere *suprà* ratum fecimus: ac propterea neque animales

Spiritus

Anat. Tr
ae. 1. c. 7

Sect. 1. Ar.
25.

Spiritus lymphæ, de qua totiès mentio facta est, a corem conciliaturos esse. Adde, quòd à quâvis demum causa profecturus esset sapor-istiusmodi, sempèr aut Linguae gustanti reuelaret se se, aut membranas Ventriculi mordêret &c. quod cum non faciat, hæreo an à spiritibus etiamsi animalibus inducatur? Sed vrgebit hic aliquis, acidum illud occasione duntaxat ingestorum alimentorum in Stomachum inspirari, adeòque non, nisi in ista actionem suam exerere. Ad quod resp. quòd qui hoc dicit, videtur velle quòd assumpta alimenta in Ventriculo, velut ad fores, pulsant, spiritusque auocent illos qui acidum edolare sciunt. Verùm, si hoc esset, cùr feces in Intestinis, vrina in Vessica &c. tales spiritus non impetrarent? cùr, inquam, fabri acidi potiùs, quàm oleary, alkalici &c. in Ventriculum descenderent? Si quis igitur id facile factu putat, picturis eiuscemodi pectus suum exfaturet. Ego nãque id ipsum difficilimum arbitror, pigetque, quòd minùs Poetico paulòque tardiore atque imbeciliore ingenio sum. *Postremò*, quod spectat lactis coagulum ex Suis, Agnorum, Vitulorum &c. ventriculis petitum; si hi fontes sunt chyli, siuè lactis, eòque imbuuntur, atque

atque impregnantur, quidni cum lacte symbolizent? quidni, inquam, gas illud lacteum exsiccatum situm contrahat, aut aco-rem? Iunge, quod coagulatrix illa virtus conciliari eisdem solet mediante immerfione ipsorum in acetum, aut additione veteris casei &c. ut & bubulci norunt. Hoc posito, nempè quod fictitia sit illa aciditas lymphæ gastricæ, vanum etià erit arbitrari, quod ista ob consimilem rationem in fermentum digestivum ellici debeat.

Sed concedamus tandè, ac demus utcū-que talem lympham non esse lympham è proprij nominis vasculis, atque ex arterijs salientem; sed recrementum quoddam velut à Conglomeratis glandulis ortum ducens, idque insupèr salinum atque acidum; quid est nihilominus, quod menstrui chylificatiui nomen promereatur, si pauca est, quanta nimirum neque ipsi interiori Ventriculi humectationi sufficere interdum potest? Ac propterea non ego illam existimo extitisse omnimodam bibendi necessitatem, ut videlicet ciborum compages magis laxetur, utque ipsorum viæ magis lubricentur; verum & ne dicta interior cavitas ex orundem fermentatione postea exsiccaretur.

Quod ut credam, facit hæc observatio. Expressi scilicet ego sæpius *Nerveam* Ventriculi tunicam; attamen ex huiusmodi expressione nihil plus unquam exurgere potui quam quod digiti fastigiū intingere valebat. Quid ergo in illam transcolet? imprimis eo tempore, quo Ventriculus alimentis grauidus, nedum ut sollicitet, potius humorum accursum in se inhibet, atque abarcet. Et si adeo dicta lymphæ vix supplere potest oneri, cui vacat, qui insuper alteri studebit, nempe ciborum fermentationi? Ut autem intelligerem aliquando, an eadem lymphæ solito copiosius exprimeretur in Ventriculum digestionis tempore cibavi multoties quosdam famelicos molossos agninis pellibus, nigris; quibus mox ab horæ spatio cultro subiectis, inveni statim pelles illas, qua parte Stomachi parietibus inhærebant, omnino intactas, pilis immutatis nulloque pituitoso, aut glareoso humore delibutis. Quid? quod y potius propter humidi absentiam quasi exarescebant: è contrà verò in centro, siue in medio eiusdem Stomachi observavi protinus bullas innumeras perpufillas è superiori orificio ad inferius usque continuas susurrum quendam edere, siue sibilum; dictasque pelles

les perindè liquefcentes, ac si in olla elixarentur, & quarum denique colliquiæ vnà cum præfatis bullis ad Ventriculi fundum deuoluebantur. Quo viso, patuit profectò mihi, quatinùs inter digerendum minor lymphæ ad Ventriculum prouentus fieret, istumque humorem non esse illum, qui præfatas bullas excitaret: esse autèm alium à superiori orificio defluentem, flavum, & de cuius origine adhuc plura *infra*. Missa quantitate [& quæ nihilominùs considerari debet, cùm requiratur proportio inter fermentum & fermentandum, cùmque defectu illius praua vel imminuta chylicatio contingat] tantùm quod fermentandi rationem; si fermentum, intimè permisceri debet cum re fermentabili, quo pacto, quæso, lymphæ gastrica, quæ iuxta internos eiusdem Ventriculi parietes defluere debet, plus decem interdùm panis deuorati libras [quod Rustico cuidam nostrati euenisse memini] penetratum ibit? Respondebis fortassè, fieri hoc mediante parte ipsius lymphæ volatili, magisque spiritosa ita nempe, vt aliquandò modicum fermenti ingentem farinæ massam peruertit. Sed regero ego; si partes pulmenti in Ventriculo existentis fixæ sunt, quomodò dissoluantur à

sect. 3.

volatilibus ? Axioma certè hoc est Chymicum *Fixa non nisi á fixis, nec volatilia nisi á volatilibus fermentantur*. quandoquidè nempè dari debet conuenientia quèdam, seù proportio pororum soluentis cum poris rei soluendæ : quæ tamen proportio inter fixum & volatile non inuenitur. Multo minùs quòque dissoluentur, si eædem particulæ fixæ homogeneæ sint, hoc est eiusdem figure cum lymphæ gastrica soluente. Quippè in tali casu nulla succedit fermentatio, vt liquet. Iàm verò præter acida fixa ingerimus etiàm pingua, oleosa, terrestria, acria &c. quæ tamen à volatilibus dissolui nequeunt. Frustrà itaque confugitur ad lymphæ gastricæ volatilitatem pro saluanda eiusdem actione indistans, & quò peruenire non potest. Paritas autém, quæ additur de paruo fermento pastæ acervum subuertente, incongrua est. Quippè si, vti pasta in mastra, itá cibi in Ventriculo spatula, aut digitis subigerentur, mixtio illa lymphæ cum alimentis fortassis obtineretur ; verùm, cùm *solidus cibus* [benè hoc adnotante Vallæo] *in viuis canibus sæpissimè conspicitur eum in Ventriculo ordinem, quo assumptus est, obseruare, nisi nimio potu distentus Ventriculus* [sunt eiusdem verba] *fluctuare*

tuare cibum, & eum ordinem permittat immutari, planum fit hunc non, ut pasta in macrâ, subigi, ac spatha, vel digitis depsi in Ventriculo, quo cum fermento digestivo incorporatur; verum heic longè aliter se habere. Ac prætereà pasta mixtum est vniforme ex moleculis homogeneis, nempe triticeis e. g. æqualitèr molitis constans: non sic alimentata, ut quæ vel ex pluribus simul iunctis, atque inter se diuersis mixtis comparantur. Quarè nec immeritò demùm contrà huiusmodi paritates sic inuehitur *Franciscus Picens*: *Hæc & similia argumenta si quis diligentèr perpenderit, nisi per pertinaciam contra Veritatem planè obfirmatus fuerit: non poterit non saltem suspectare vulgarem hoc sæculo sententiam de Fermentatione* | mallet dixisset de Fermento propter chylicationem quasi in Ventriculo admittenda; atque si voluerit rationes & experimenta inter se contendere, neutiquàm in Ventriculo (nota) tale fermentum quale in massa farinacea admitti posse, sed comparatiuè, volens nolens statuere debebit. At nos iam tantùm vociferauimus.

de Febrib.
c. 5.

— *Quantum nouies, deciesue*
Mille viri clamare solent, qui praelia miscent
ex Homero: vidererque ipse velle Battolo- *Iliad.*
gias

gias, vt aiunt, omnes consumptum ire, si cunctas paritèr afferrem rationes, quæ tam contrà vltimam, quàm quæ contrà præcedaneas de Humore digestiuo sententias animo suggerebantur. Dicam itàque tantummodò, quòd vel leuitèr attactis earum difficultatibus non potui non illas reprobare, assensumque præbère ei, quam pridèm de *succo glandularum OEsophagi conglomeratarum* conceperam opinionem, nempè istum *veri fermenti chylificatiui* prærogatiua gaudère eò saltem, quòd isthæc minus obuijs scatère salebris; quin imò & omni ex parte Rationi atque Experientiæ, idest cum Veritate quadrare visa est, vt in sequentibus obuiam veniet.

XXI.
Probatur
3. positi-
uè, & r.
ratione
falsedin-
is liquo-
ris sup-
radicti.

Ettenim; quòd verum illud sit fermentum, probat ipsius-met sapor. Nihil enim falsum quin sit & fermentativum: cùm nimirùm fermentatio quælibet á sale fiat. Quandoquidèm igitur humor glandularum OEsophagi conglomeratarum salinus existit, hoc est ammoniacalis, vrinosus, aut alkalinus &c [prout scilicèt in *Anatomicis* publicauimus] concludendum remanet eundem humorem verum adesse mēstrvum, cuiusmodi nemnè sunt etiám Bilis, Succus Pancreaticus,

Se-

Semen & similia salina. Sanè quippè illud ab eiusdē generis glandulis elaboratur, quibus & posteriora, videlicet à *Vasculo-vefficulosis*: cū verò istiusmodi colatoria hoc peculiare habeant præ cæteris Conglomeratis, vt sibi con-nata salia, seu quæ ysdem, veluti seminium quoddam, à Natura ingesta sunt, nunquàm dimittant, ac neque aliquid de ys deferant, donec alia in deperditorum locum suffecta fuerint, sequitur proin, vt OEsophagoe illæ eademque & *Vasculo-vefficulosa* glandule, quemadmodum ab ipso, vt aiunt ouo, hoc est à primordys generationis, sale prædicto ammoniacali imbutæ fuerunt, ità nihil aliud quàm istud redoleant; nempè vt

Quo semel est imbuta recens, seruabit odorem Horat.
Testa diu.

sicque eiusmodi salis propagationi perpetuò incumbant: vtque aliqualem ipsius portionem enixæ sunt, nouo aduentante sanguine, vt acetarij cadi, congenera excepta salia alys superstitibus inficiant, pristinamque iacturam noua illorum accessione, tanquàm emolumento, compensent. At quicquid de his sit, sufficit, inquam, sapor, vt eiusmodi menstruum contradistinguatur ab omni non ipso, hoc est à sero, lymphæ &c.
quæ

quæ OEſophagi tenorem ſervant, aut vigorem.

XXIJ.
2. Ratio-
ne fuſio-
nis.

Iàmque vel ex hoc ipſo, quòd tale menſtruum OEſophagum humectare, aut lubricare neſciat, inferri ſufficienter poſſet, quemadmodum id concernere debeat alimenta per eundem canalem decurrentia: niſi ex alia parte hoc abundè conſtituiſſet ex dictis circa Mechanicam, quâ nempè manifeſtatum fuit ſuccum glandularum OEſophagi præfatum in hanc ipſam fiſtulam emulgeri tempore *Deglutitionis*. Quorsùm enim is tunc ſolummodò tenderet in OEſophagum, niſi competeret alimentis tunc ſolum pariter per eandem Gulam deſcendentibus?

XXIIJ.
3. Ratio-
ne com-
mixtion-
is cum re
fermen-
tanda.

Sed neque ob hoc tantum *veri fermenti Digestivi* nomen promeretur laudatus liquor: ducit hoc ſuum etiàm ex eo, quòd in eàdem *Deglutitionis* actione cum cibis intimè commiſcetur. Cùm itaque vel de ſpeciali fermentationis conditione ſit, vt fermentum cum re fermentandâ exactè incorporetur, ceù nimirum in quo *tota, Roſinky dicto, eiufdem fermentationis actio conſiſtit*; hocque optimè ſuccedat in caſu noſtro, reſpectu ſcilicèt humoris glandularum OEſophagi conglomeratarum cum cibis per hunc ipſum OEſophagum

phagum deuolutis, superest concludendum, quòd idem humor respiciat directè istorum fermentationem, siuè, quòd *verum* sit *fermentum* ciborum *digestivum*, vt patet. Quòd autèm talis incorporatio ritè contingat in nostra hypothefi, suadetur ex eo, quòd ex vna parte Succus ille vbique depluit in OEsophagum per innumera vascula Nerueam istius tunicam passim perforantia, præcipuis nimirum ramis antè, vt adnotatum fuit, in complures minores subdiuisis: ex aliâ verò, quia alimenta prius masticata ac ferè spongiæ habitudinem naçta seriatim, veluti per syringam, intromittuntur in eandem Gulam á Musculo Pharingem constringente: quo fit propterea, vt hæc, quasi pulpa, subtilitèr admodum dictum intestinulum farciat; dùm verò propè singulæ illius glebæ istius parietes adstringunt, ac semouent, exundantem vndique præfatum Succum abstergunt, euerrunt, exsuugnt, sicque tandèm salinis, siuè fermentaceis particulis saturæ descendunt in Ventrículum. Atque hoc profectò quò efficacius obtineretur, arbitror concessam fuisse OEsophago illam longitudinem, quâ ipsum supèr Luras omnes atque Infundibula excellere diximus: nimirum

nutritiuæ glebæ suo congruo interdum non nupfissent sali, in longo illo dicti canalis tractu eodem denique impregnaretur. Vltimò ad præfatam incorporationem facit ipse peristalticus eiusdem OEsophagi motus, utpotè in quo annulares fibræ (ne fortè tales alimentitiæ glebæ simul iunctæ minùs de supra dicto fermento absorpturæ essent) inter angustandum Gulæ cavitatem illas separant ab invicem, dissociatasque humore, qui in tali constrictione allicitur, imbvunt ac suffundunt sic, ut manus pistoris imitando easdem depplant, cum digestivo menstruo subigant, tundant, misceant planè.

XXIV.
4. quia
est hom-
ogeneus
cum ali-
mentis

Excipis, rem utcunque sic se habituram, atque alimentitias glebas se se utique cum supposititio nostro fermento maritaturas, si, quemadmodum diuersi sunt illarum pori, sic salium huiusce fermenti figura variaret; verum cum vnicū hoc existat, & talis salium conformatio simplex, quid est, inquis, vnde eiusmodi coniugium expectetur? Ad hominem certè, ut vocant, hoc argumentum est, iustèque retorquetur in me quod aduersus *Bakium* suprà sum iaculatus. Inconcussum quippè est Chymicorum dogma, quòd *fermentum homogeneum esse debet cum*
reso-

resoluendis ; quam regulam itá exemplificat Etmullerus : Vegetabilia resinosa , qualia sunt imprimis purgantia . itém planta aromaticæ & suauevolentes requirunt menstruum homogenium , Spiritum vini , qui est falso-sulphureo volatilis . Alia mucilaginosa vegetabilia , aut viscosa requirunt menstruum aquosum , v.g. rorem maialem aquam tonitruallem , itém aquã simplicem destillatam . Alia requirunt menstruum acido-salinum , vii est aqua acida , aqua aceto imprægnata , & sic porro . Pluribus hoc quòque ostendit in Comment Ludouic. , Colleg , Practic. de Morb. in gen. & alibi . Et sané , ni daretur conuenientia illa , siuè proportio intèr particulas menstrui soluentis ad poros corporis soluendi , nescio quo pacto in hos impetum facturæ essent tales particulæ , quoue instrumento velut arietati interiores istorum parietes ad extremum essent collapsuri . A pari ergò , cùm insit & in nostro corpore (ipsius etiã Hippocratis testimonio) & amarum , & dulce , & salsum , & acidum , & acerbum , & fluidum , & alia infinita omnigenas facultates habentia , copiamque & robur ; neque porro hæc aliundè , quàm ex alimentis progignantur ; quatinús scilicèt præter panem , assumimus acida , amara , acria ,

de Comp.
Medic. c.
67.

de Ver.
Medic. ff.
24.

aromatica, pinguia, dulcia, insipida, acerba &c. qualia nimirum sunt olera, salgamata affature, iurulenta, bellaria, embammata, & sexcenta alia palati scitamenta non tantum à Vegetabili, quam & ab Animalì, ac Minerali regno petita, ut benè coqui atque obfonatores norunt: si proinde vnicum duntaxat daretur fermentum digestivum, quid est, quæso, cù hoc homogenium dici posset cum tot rebus fermentandis, idque ipsum singulare menstruum tot eduliorum solutionem, siue fermentationem tandem esset euicturum? Pace tamen ista opponentis, dicam, tantum abesse, quin eiusmodi argumento totum obruatur nostrum de *humore digestivo* systema, ut inde potius fulciatur magis roboreturque. Nouimus enim Succum, quem pro tali menstruo agnouimus, non esse simplicem, merum videlicet acidum aut merè alkalinum &c. sed multiplicem, in quantum quod à pluribus ysdemque inter se diuersis glandulis suppeditatur. Quandoquidem igitur multigeni menstrui variæ sunt particulae, quæ item diuersis rerum solvendarum poris quadrare possunt, manifestum fit illum, nempe humorem, hanc præ reliquis suprà enarratis prerogatiua gaudere

ut

vt nimirum melius omnibus cum poris alimentorum vt ut diuersimodè figuratis conueniat, proindèque uel ob hanc causam *veri fermenti digestiui* encomio ante alia esse multandum. Contendis nihilominus me liquorem supradictum, vt ut à varijs glandulis promanantem inuenisse tamen vnius, aut alterius speciei, idest vel armoniacalem duntaxat, aut falsum, vel vrinosum &c. quapropter hunc non esse tam vniuersalem, vt multiformibus ciborum poris correspondere valeat. Ad quòd resp. protulisse me hoc idcirco, quòd sepe degustatum illum talem compererim: non verò vt significarem ipsum esse semper, atque vbique similem. Quippè hàud institueram *Chimosiologiam* conficere humorum glandularum Oesophagi: tantum aduertere, quæ incidentèr ipsos concernissent, & præcipuè cum talem saporum descriptionem ex vna parte parum ad rem facere, ex alia uerò factu penè impossibilem existimasset. Non fugerat quippè quàm distarent viuentia à cadaveribus in quibus scilicèt Anatomica eiusmodi tentamina exsudanda erant: quàm itè sani à morbofis &c. (quemadmodum uel dudum etiàm insinuauì.) Quæ cum ita sint frustra redarguor dicacitatis. Et prætereà nonnè

alibi pariformitèr declaravi quamobrèm., præter eundem succum falso-muriaticum urinosum, stillabat etiàm alius sulphureo-volatilis, itèmque alius acido-spiritosus &c. à glandulis *Trachealibus* tergeminis hoc est *Parenchymatosis*, *Atro-luteis*, *Carneis*, *Sanguineo-adiposis* &c.? nonnè, inquam, alius indicatus fuerat à glandulis *Primæ divisionis Asperæ arteriæ* procedens, quasi lymphaticus & qui ab hætenus memoratis longè latèque dissentit? Mitto discrimen, quod intèr *Gastricas* & *Dorsales*, inter has & *Bronchiales* rursumque intèr istas atque alias *Primæ Asperæ arteriæ divisionis* præfatas, atque, ultimò intèr *Tracheales* & *Thyroidæam* intercedere denunciauimus: quod tamen discrimen cum nihil aliud quàm totidem diuersa munia hoc est diuersas filtrationes, aut recrementa importare videatur, superuacaneum proptereà duxi istorum sapores inquirere, deque salium in tot numero fluidis multiplicitate dubitare. His non obstantibus adhuc fortassè inculcabis, talia recrementa in tantà quantitate nō existere, quanta est copia diuersorum pororum, quibus assumpta, interdum innumera, alimenta scatent. Sed respondeo hæud opus esse, vt numerus fermentorum

ref-

respondeat numero soluendorum ; cum videamus sepe sepius , quod idem fermentum etiam diuersi generis mixta resoluit tum per se , tum vero maius , si precefferit aliqualis preparatio , ut in Vegetabilibus Contusio , Maceratio , Putrefactio &c Quippé sic istorum pori ad vnā quasi simplicem configurationem rediguntur iccirco aptam vel vnius menstrui moleculas admittere atque amplexari Quamobrem in casu nostro cum Deglutitioni præcedat Masticatio , facile est arguere , quod cibi sic attenuantur per dentium molituram , ut ferè simplicem porositatem nacti cum paucioribus deindè fermentis concordare possint quàm ut antè non concordassent . Vndè non immerito emanauit pro-
uerbium illud Prima digestio fit in Ore , fluxque tria illa obseruatio vel apud vulgum , quod *cibi quò plus masticati eò melius digeruntur* . Fluida verò alimenta cum integrantes particulas habeant ab inuicem satis diuisas , eiusmodi præparatione non egent , texturâ nimirum sua integratibus cuiusvis menstrui partibus vtrò nubere idonea.

Dixi partes integrantes ad differentiam essentialium , vtpotè quod secundum has omne fermentum etherogeneum esse debet cum

re

XXV.
 s. nec nō
 etherog-
 eneus.

re fermentanda. Sciendū enim [quod & primariū est Tyronibus præcipué Medicis rudimentum] componi vnumquodque corpus duplici illo genere molecularum; vt uerò istarum notitia velut ab ipso fonte, vt aiunt, hauriatur, libet hūc adducere Textum perspicacissimi Viri D. de Saint-André qui est huiusmodi: Les parties composées (*sive quæ ex elementis resultant*) sont Essentielles, ou Integrantes. Les Essentielles naissent du mélange des simples, qui se lient, s'accrochant d'une certaine maniere, & les Integrantes de l'union & de l'assemblage des essentielles. Les parties Essentielles sont dissimilaires entre elles, & de nature différente du tout, qu'elles composent, les Integrantes sont toutes semblables, & de moyenne nature entre elles, & avec le tout. Les premières sont de l'essence du tout. elles ne peuvent se desunir, qu'il ne perisse, où qu'il ne s'altère considérablement. Les dernières ne luy sont point essentielles: elles peuvent se desunir sans le detriure, & sans luy causer une alteration considerable. Nimirum particulæ Integrantes fiunt ex salibus persulphurea stamina cœu in fasciculos colligatis: essentielles autem sunt ipsa met salia siue simul

Refflex.
sur le M.
edic. cha.
1.

simul vnita, siue ab eodem nexu sulphureo vindicata. Quo fit proin, vt homogeneitas menstrui soluentis cum poris rei soluendæ de Integrantibus tantummodò censenda sit. Nàm quod Essentiales; à conuenientia illa frustrà expectaretur fermentatio. Quandoquidè Integrantibus tùm fermenti, tùm & rei fermentandæ particulis simul commissis, ac quasi confertis, ni aliquid iccirco huic foederi refragaretur seditio- nemque concitaret, omnia protinus in suo pristino, seu pacato statu continerentur. Requiritur propterea disproportion quedam inter salia fermenti & fermentandi ad hoc, vt euincatur fermentatio. Ex eâ namque æther, seu materia æthereæ, aut subtilis *Carthesiana* cum impediatur, quominus rectâ ex consueto ritu permeet vtrumque illud, idest fermentum ac fermentandum, turbat, miscet, confundit omnia: dùmque veteres quærit meandros, facit protinus, vt alterius partes in alias actę se se adorian- tur, findant destruant uicissim, donc tandē alys ceruice fracta, alys latere dempto, siue, quod planius, ambarum partium compage exsoluta, noua inter ipsas modificatio, crasis, vnio, aut concordia crescat. His ergo sic stan-
Y tibus

tibus; quoniam liquor glandularum OEsophagi *Vasculo-vefficulosarum* uarys constat particulis tum Integrantibus, quarum ratione cum alimentis utut item diuersi generis conuenire potest, tum & Essentialibus, quas multigenæ Officinæ suppeditant; quæque idè aptæ sunt cursum ætheri inhibere ac per consequens tumultuare, & cum quocunque extrario corpore dimicare, planum fit porro idoneum esse illum fermentandis alimentis cuiusuis generis, atque adeò *verum* esse *fermentum digestivum* quæsitum.

XXVJ.
Quomodo
soluat
alimen-
ta!

Locus hic modò postularet, ut ratio paritèr exponeretur, quâ talis fermentatio conficitur: Hæc enim postrema est, quæ conditio [aiunt Chymici] in unoquoque menstruo attendi debet, scilicet quemadmodum hoc mixta, cum quibus conuenerit, exsoluat. Verùm ea res, cum Ventrículum concernat, utpotè in quo lucta huiusmodi exercetur, alibi iccirco declarari petit, puta in *seq. Dissertatione*. Interim tamèn, & ne hæsites circa illum modum, utrùm nempè talis explicatio foelicitè sit successura in nostra hypothesis, nec-nè, sufficiat iterum mente excolere, quæ attulimus de multiplicitate humoris ab OEsophagi glandulis effluentis: quatinus ni-
mi-

mirum alius est aquosus (serum sanguinis ab arteriarum finibus profiliens) qui simpliciora corpora, excepto sulphure, dissolvit; alius oleosus fixus, siue sulphureus lymphaglandularum *Iugularium* qui sui generis mixta peruat. Hæc autem cum & in Ore magnam partem recolligantur fit, ut bolus panis e. g. masticati soli expositus chyle scat, & ramenta carniū dentibus inherētia, candescant &c. inquantum nempe quod ferose, atque oleosæ particule liquant ea, scilicet à quibus lux reflectebatur ad eum modum, quo panis cinereus, & carni sanguineus color antè conciliabatur: minimè vero ex eo, quod salina menstrua quasi universale sit, idest totale Chylificatium, [quemadmodum scilicet plures, inter quos recentissimus *Andriolus*, nuper hodièque existimarunt] Sed de his alibi. Præterea alius est humor volatilis oleosus (lymphaglandularum *primæ divisionis Asperæ arteriæ*) qui mucilagineas moleculas penetrat; alius salino-sulphureus, acido-volatilis, alkalinus | liquor glandularum *triplicis generis Trachealium*] qui paribus miasmatis nubere valet: alius denique falsus, armoniacalis, urinosus, acris fixus &c. à *Dorsalibus, Gastricis*

cis, consimilibusque *Vasculo vespiculosos* emanans, à quo acida omnia, austera terrestria acria, atque huiusmodi alia imbibiti, ac fermentari didicerunt. Quæ cum ita sint, nil deest quominus ratio constet, propter quam succus glandularum Oesophagi modò recensitus alimenta solvere dicatur; atque adeò patet non carere hunc vel minima prærogatiua ex *ys*, quæ *veri fermenti digestivi* titulum præse ferunt.

XXVIJ.
Questio,
An solutio alim-
entorum
sufficiat
ad Chyli-
ficationem.

His consideratis, credideram iam omne tulisse punctum, ut fertur, & colophonem imposuisse me *ys* meditationibus, quæ ad stabiliendum verum fermentum chylificativum præfatum exiguntur: cum protinus increbuit animo non levis suspicio, an videlicet fermentatio sufficiat ad Chylificationem? Ratio dubitandi fuit, quia effectus fermentationis vel est mixti alteratio, vel ultima eiusdem resolutio: utrum autem velis, id certè chylum dare nequit. Nam alteratio, quæ verè ordinarius est fermentationis effectus, contingit tum ob nouam salium, tam inter se, quam cum alijs particulis mistum componentibus, unionem, aut con-
temperationem, tum ob partium non miscibilium exclusionem quæ partes non sunt
misci-

miscibiles aut ratione ponderis, vnde leuiiores auolant, grauiiores ad fundum præcipitantur, aut, quod frequentius, ratione figuræ. Est ergò rerum quarundam *separatio*, & *accidens quoddam necessariò consequens fermentationem*, non verò essentialis eiusdem effectus. Vbiq̃ue enim salia ob id agunt in se inuicem, vt se vniant: quod nunc faciunt immediatè, si sunt sola, vt in efferuescentiâ, nunc mediatè, vt in fermentatione, si sunt alys nempè sociata. Ex qua noua vnione ingens misti sequitur alteratio in colore, sapore, consistentia, & alys proprietatibus, ità vt nulla ferè in rerum natura peragatur alteratio, neque generatio aut corruptio, vbi non intercedat fermentatio. Vltima autèm misti resolutio rarior & vltimus denique fermentationis effectus est, ad quam verò non nisi per iteratas fermentationes fit accessus. Quotiès nãmque contingit fermentatio, totiès fit noua salium vnio, partium volatilium auolatio, grauium, vel alio modo immiscibilium ad fundum exclusio: vnde sensim sensimque salia arctiùs se vniunt alys particulis relictis; donèc tandèm vel vno sale dominante, altero oppresso, vel ambobus intèr se arctè

Instit. Th.
es. 20., 21.

tantum unitis, aliarum consortium relinquatur: unde vinculum mixtionis à salibus oriundum tandem resoluitur, & mixtum in componentes se immediatè particulas tandem dirimitur, id, quod *putredo* appellatur. Hec ferè ex *Ettmullero*, cum ergò siuè illa partium translocatio, unde alteratio est, siuè earundem dissipatio, unde mixtum ultimò resolui dicitur, ad essenitam chyli non faciant meritò dubitatur an chylicatio absoluator per fermentationem?

XXVIIJ
Respon-
detur q-
uòd non

Hist Chym
c. 13. p. 76.
Experim.
Phil. p. 2.
p. 20.

Quid? quòd tutius mihi visum est deinde negatiuam sequi partem, & cum pretereà nouerim Chylicationem esse *cibi & potus in chylum conuersionem*, idest, hanc in essentie vtriusque transmutatione consistere; quã transformationem certè nulla fermentatio efficere valet etiàm à maximè solutiuo menstruo inducta, vt consideranti liquefcit. Nec vacat dicere, produxisse aliquandò *Tachenium, Boyleum* & alios chylum naturali simillimum ex quibusdam alimentis moderati caloris beneficio per menstrua subacida volatilia, quæ non erant, nisi soluentia. Namque ad hoc respondetur, chylum non fuisse illum; sed tincturam quandam colore ad chylum accedentem, qualem etiàm tincturam

ram ex lithargryo & aceto v. g. in facto Cos-
meticorum, seu lactis Virginei parat *Zapat-*
ta: cæterò, quod substantiam, hanc nun-
quàm chyli loco extituram, imò ab hoc mul-
tùm variaturam, prout à Viro Experient-
iissimo [& qui nihilominùs ob hoc ipsum
nominis sui silentio me obligavit] pluriès
compertum factum fuisse sciò. Et sanè chy-
lus communi voce est *liquor plerùmque can-*
dicans [siquidèm & variè coloratus à pluri-
mis conspectus est, vt & abs me in Vaccis
virescens verno tempore] *liquor*, inquam,
candicans, *subdulcis* & *quasi insipidus*, *ex es-*
culentis, & *potulentis confectus*, & *proprio vi-*
tali caractere donatus: quam nouissimam
qualitatem, missis cœteris, dic, quæso,
quodnam fermentum ipsi chylo concilia-
turum esset? quale, inquam, menstruum,
huic succo talem imprimet characterem?
Sed inhærendo ad hominem, respondebis
fortassè, inesse Salivæ, humori Oesopha-
gœo, Pancreatico, Biliario &c. eiusmodi
vitalitatem, quatinùs nempè hæc à vitali
principio, hoc est corpore animato, depen-
dent; à quibus iccirco chylus talem capef-
fit characterem. Verùm enim verò depen-
dentiam illam non sufficere ad vitam huic
imper-

impertiendam, & qua tamen vita insignitus est chylus, abundè liquet ex eo, quòd dicta recrementa, salua nimirum, bilis &c. præter motum fluidi, nihil aliud ab anima in se asciscunt: cùm è contrà chylus, præter talem motum idæas etiàm, [si *Marco-Marci* credinius] in se contineat illas, quæ vel ad ipsam animam valent informandam; vt reuerà videre est in pusionibus, qui cum lacte exfugunt Nutricum mores: id, quod & plusquàm millenis testimonijs comprobatum manet. Excipis nihilominus idæas has præstari sufficientèr à Spiritibus animalibus. Resp. & quidèmore meo barbarè: hoc verum non est. i. quia hi spiritus è Sanguine, atque ex chylo progignuntur. Quamobrèm vel circulus committendus est ità nempè, vt effectus producat suam causam, vel ad aliam materiam confugiendum, vndè illæ idææ hauriantur. Proptèr quod adeò instas, esse Spiritum, quem vocant *Plasticum*, qui in foecundatione oui alios in hoc contentos determinat ad mores imbuendos. Sed resp. huiusmodi Spiritum, aut genium Plasticum, potiùs fanaticum [neque enim me continere possum, quin identidèm talia vocabula irrideam] nihil, meo videri, esse aliud, quàm

quàm materiam motam, mouentem materiã oui quiescentem, & si quid prætereà est aliud assigna; at nil porrò te repositurum puto, nisi fortassè, quòd genius sit ille à parentibus suffectus instillatusue: in quo tamen multa committerentur absurda, & præcipuè dicendum esset quia Procerum animas in vnumquempiam Posterorum pariformitèr cumulari ac traduci debere: qualem scilicèt errorem excogitauit hoc æuo *Daniel Sennertus* velex hoc tamen facile sufflamabilem, quòd pusio Nutricem lactens, non Parentem, illius potiùs, quàm istius indolem fortiatur; ex eo verò, quod dictus *Plastes* sit ipsa materia oui in motu posita, non est certè, vndè inferas illum producturũ ideas, aut species vitales in chylo existentes, sed potiùs morbifica miasmata, vt quotidie vsuuenit. 2. quia Spiritus animalis tàm influxus, quàm infusus nihil habet commune cũ chylo: ille, quòd in Os, OEsophagum, Intestina, inque alias consimiles cauitates ruerè haudquaquàm consueuerit; hic, quia, cùm materia dicatur esse quæ materiam in carnem, in ossa coagulat, falsò ad lacteas venas deriuatur. 3. demùm, quia doctrina hæc de Spiritibus animalibus, vtpotè tautologica nimis,

Z

nimis, & multum Medicorum genio imponere comperta, circumspectè venit vsurpanda. Sed quicquid de his sit; chylus certè prærogatiuis pollet, quas in menstuis, etiamsi animatis non est inuestigare. Iunge igitur, & cum Chylificatio sit vera transmutatio [vt diximus, vtque Phyfici omnes fassentur] totalem ipsius actionem in solutiuis fermentis haud esse sistendam. Replica- bis iccirco, non opus esse menstuis, quæ ad OEsophagum emendicauimus. Resp. hoc falsò inferri. Quippè quòd rarò succedit transmutatio, nisi præcesserit fermentatio. Probatum hoc in Argyropoeia: in qua, ni Venus v. g. prius ritè purificata, tum cum vrina & sale rectificata, ac demum cum arsenico cohobata fuerit, frustra, accedente post menstruo transmutatiuo, Luna expectatur. Sic itaque & in *Chylificationis*, nisi alimenta idoneorum menstuiorum, veluti præparantium, phases antè pertulerint.



SECTIO TERTIA

DE VERMIBUS.

AST sciscitanti demùm quid insupèr conducturū esset ad Chyloseos perfectionem, subyt meminisse illius Textus *Ettmulleriani*, qui ità sonat : *Dicamus ergo inesse fermentum, quod cibum masticatum, & salivali menstruo probè subactum potùque plus minus dilutum incidit, penetrat, dissolvit, & talem in assumptis alimentis motum intestinum seu genuinam fermentationem excitat, mediante qua & volatilifantur eadem, & simul fermenti istius specifico appropriato, tali subiecto vitali textura & qualitate, seu, ut vocant specifico vitali caractere insigniuntur, qua mediante huic, & non alys subiectis chylus conveniens emergit, & qua deficiente, nec assimilatio cum sanguine, nec commoda nutritio fieri potest sed morborum ubique sparguntur semina. Ex quibus proindé verbis obuiam fuit argumentari, quatinús præter fermentum solutivum, de quo*

J:
Quid præterea requiratur ad Chylificationē?

*Instit. ff.
l. c. 7.*

in præcedenti *Sectio*ne, requiritur prætereà aliud distinctum, nempe *vitale principium*, cuius ratione alimenta per supradictum menstruum soluta hinc inspirentur, tanquàm infuscentur, hoc est viuificentur, aut tali modo moueantur, vt idonea euadant animato corpori nutriendo ac sustentando; indè verò, vt arrepto symbolo, idest sale quodam, quasi seminio chyloso, ad extremum in con- similem, nempe chylosam materiam trans- formantur: planè, sicut in Chrysopoeia [arrient iterùm circa hoc exempla Spar- gyricorum] videmus Mercurium, aut aliud quoduis metallum iam debito modo præpa- ratum, idest alkoolizatum, purificatum, cohobatũ &c. paruo Solis in propriam medul- lam constricti (quale secretum constringen- di aurum fuit impostoris cuiusdam *Mam- gná* apud *Cæs. Campanam*) auctario, aut al- terius, quicunque Pulvis *Proiectionis* appel- latur [qui tamen neque est aliud, quàm, idem aurum restrictum, idest essentificatum] in verum aurum tandèm degenerare: vel quemadmodum minima cuiusvis Spiritus mensura in infinitum vsque multiplicari po- test, docente hoc *D. de Moncõnys*. Quippè nimi- rû fermentũ quodlibet transmutativum *Ru- lando*,

Hist. del
Mondo
Año 1590

Itiner.
tom. 4.

lando, est materia firma, tanquàm fixa, quæ suæ naturæ materiam ad suam firmatam conditionem præparat, quæ etiàm antè præparationem non magis, quàm illa habebat, vt fermentum panis [explicat idipsum sic ulterius Bruno] est farina firmata in pastam, quæ farinam similem, raram & discontinuam in aliam pastam, fermentatam adducit *Hinc igitur* (concludit sic pro nobis etiàm idem *Rulandus*) *fermentum Chymicum transmutativum fermentandum, cui adiunctum est sibi assimilatur*: siuè in, nostro casu vitale principium suprà memoratum alimentorum solutionem, hoc est tincturam, in chylum, cum quo analogiam dicit, transformare debet.

*Theaur.
Curation.
Empur Ce
nt. 1. 26.*

*in Lex.
Castell.
Verb. Fe-
rment.*

Bellè, inquis, dixisti pulchrè; sed annè tale principium inuenire est in Viuentibus quæ chylo nutriuntur? Hanc instantiam cùm aduertissem aliquandò, de responsione, fateor, minus sollicitus esse coëpi. Non fugerat namque existere ferè in Viuentibus quibuscunque animalcula minutiora: quæ cum vitâ donata sint, hæc porrò vitalitatis primordia vtique vocari possunt. Dubium tantùm in eo obuersabatur, vtrùm animalcula hæc congruum vitæ pabulū suppeditare queant? siquidè patuerat, ex ipsorum contubernio,

*IJ.
R. Verm.
mes, aut
istorum
oua.*

destrui potiùs animalem OEconomiam, quàm
 vt consimilium hospitem beneficio regeretur:
 Verùm re meliùs penès me considerata: si-
 uè, vt aduerti postea complura animalia alyis
 in optimum nutrimentum cedere, vt Mu-
 res Felibus, Lacertæ, Buffones anguibus &c.
 imò ipsa vnius speciei alyis eiusdem classis,
 vt innocuè alites Rapacibus, pisciculi
 Aquatilibus voracioribus, muscæ Scarabœis
 Vespiis &c.; cum itèm ex alia parte in com-
 perto habuisssem nocumenta quæ corporibus
 imputantur ex illorum hospitalitate, pen-
 dère maximam partem ex eorundem hos-
 pitum aliqua crisi, vt postea fiet palam, in
 eam denique sententiam descendendi, vt censu-
 erim dicta animalcula potiùs Vitæ eorum,
 in quibus degunt, inferuire, quàm vt ysdem
 aliquod detrimentum faceffant: siuè chylum
 nupèr insinuato modo parare. Excipis adh-
 uc, Mures Pisces, Volucres, & coetera præ-
 dicta animalia comesta, vuiuque degluti-
 ta in chylum abire posse: minimè verò quæ
 voranti intus adnascuntur, vt Vermes, lum-
 brici, termites, & similia insecta. Quid?
 quòd vtut abeant licèt, alimenta tamen,
 sic, vti præsumitur, transmutare nequeunt.
 Resp. imò esse ista hæc, nempè Vermes, lum-
 bricos

bricos, nec non ipsorum semina, quæ Chylificationem perficiunt, vt in sequentibus inclarescet.

Primò námque eiusmodi insecta, in omnibus penè viuentibus obseruantur; & primò in omnibus herbis, teste *Kirkhero*, videntur minutissimi Vermiculi, qui iuxtà herbæ, plantæque conditionem generantur, qui mox in papilionem, mox in alterius insecti volatilis speciem degenerant: Secundò in omnibus Animalibus se se produnt dicti Vermes, in Ventriculo, OEsophago, Intestinis, coeterisque partibus, quemadmodum commentatus est *Redus* speciali libro, cui titulus *de Viuentibus, quæ in Viuentibus obseruantur*, ferè per totum: denique in ipsis Vermibus, seù in ipsis Insectis, prout vel in ys quæ brassicas pascunt, non ità dudum aduertit *Cestonius*, adeò planè, vt à nonnullis pro seminio vniuersali habita sint talia animalcula: aly etiam ex yis quintum clementum stabilire voluerint. Quo posito arguo sic: Improvida & plusquam inconsulta dicenda esset Natura, si, cum omnia ordinet in vitæ vitalis gratiam, tot nihilominus hostes præesse eidem atque imminere voluisset, vt ab ipsorum moribus vix elabamur: quare cum

IIJ.
Probatur
ex ipso-
existent-
iâ in vn-
oquoque
viuente

Scrutin.
Pest. l. 2.
Exp. 3.

Tom. 2.

Epif. Ital
ad D. Val
lisnier.

cùm illud falsum sit, hoc est, ex trito illo Physicorum veriuerbio, *Natura suorum operum semper intendat perfectionem*, venit concludendum non ob stare ad Vitam prædicta Insecta: imò vel ex hoc, quòd ceteris animantibus numerosiora sunt, eò maiorem illorū necessitatem spectandam esse. Nulla verò potior viuendi ratio, nisi vt nutriamur. Ecquid igitur vel in intimis Viuentium visceribus Natura tales Opifices, seù chyli fabricatores non condidisset?

IV.
In succo
nutritiu-
o Planta-
rum.

Atque vt hoc magis elucescat, considera singulas viuentium classes modò indicatas. Intuere imprimis Quercum, Ulmum aliasque huiusmodi Plantas; videbis verno tempore, præcipuè in Ulmo suprà & circa eiusdem folia innumeras bursulas inæqualitèr rotundas, primò virides, deindè rubentes procedere vbique ex productione fibrarum lignearum, quæ nutritium succum deferunt tum ad eadem folia tum & ad ramos continerèque in se atque incubare magnam granulorum nigricantium copiam, & quæ tandè in paruas muscas facessunt. Hæc ergò granula si ab extrà illuc hyberna tempestate, aut quùm arbores vigère incipiunt, deferri existimas, stultitia. Nam quæ foecunditas

ditas hyemis? quæ causa est, quamobrèm id genus ouorum illi soli plantæ adglutinetur? Prætereà nonné secùs tenella foret eiusmodi capsularum substantia? cùr autèm leui conatu dirimi nequàquam potest? cur, inquam suo quæque pedunculo donantur foliorum instar, aut demùm cùr tales cystides nullibi sunt perforaminatæ? Et si verò ab intrà emergit illud semen, quid ni aliquem in humore Ulmi nutritiuo causabit alterationē? Hanc ego proptereà, alterationem arbitror consistere, in eo, quòd, cum prædicto tempore turgescant ovula præfata, tendantque ad exclusionem, in tali porrò fermentatione, quasi agitatione, aut bullicatione, humor cui innatant, húc, atque illúc percitus, ac rarefactus conuenientem vegetabili mixtò temperiem nanciscatur, sicque vel vltrà ramorum ipsius arboris extensionem progredi idoneus euadat. Ettenim neque hìc simulare possum vidisse me sæpissimè in ys vesiculis, & circùm prælibata interdùm etiàm exclusa oua colliquamentum quoddam (illum nempè humorem, quem pro insigni Cosmetico habet *Bauhinus*) mobile instar argenti viui, albicans itidèm, & glareosum, quod fortè digitis friatum glutinis mores

*Pinac. l.
II. sect. 5.*

referebat, adeò planè, vt non alibi meliùs liquor Vlmi nutritivus sub conspectum cadat. Junge ad extremum (at per parenthesin tantùm, siuè animi gratia, vt dicitur) quòd iàm ab aliquot annis [ex quo scilicèt minutias huiuscemodi obseruare pergo] quotiès accidit insolentior, quàm, vt aliàs decuisset, tam dictarum capsularum quàm alterius cuiuscunque in arboribus excrecentiæ verminantis, farraginem adspexisse, ex hac postea annone fertilitatem auguratus, voto nusquàm fraudatus sim: id videlicèt, quòd, in plenior, Succum ritè digesti è terrâ prouentum refundendum erat. Præterea ex Vermibus, siuè ex istorum ovis parari, aut digeri, hoc est attenuari & certo modo motari talem Succum indicio est hæc altera Obseruatio: Hoc anno, DEO sit laus, satis feraci [in compensationem saltem duorum præcedentium, qui ob cœli inclementiam hyeme anticipata ferè nihil attulerunt] 1711. legebam fortè in agris maximam florum turgescientiam; ex quo subindè ad vicinam sepem digressus, dùm ibi paritèr intueor complura arbuta innumeris floribus, vt sic dicam, redimita, incido fortassis in Rosam siluestrem, *Cynosbaton*. Huius igitur

tùr rursùs insignem florum luxuriem admiratus, dùm postèa spongiarum, quæ eidem arbori succrescere solent, rudimenta auidè inquirò, en! uideo intèr hos flores tetragonas aliquot excrescentias, rursùmque alias etiàm pentagonas angulis obtusis atque inter se inæqualibus propendère hinc indè è totidem ramusculis rosarum genuinarum instar, vt quarum etiàm formam imitabantur, quicquid in reliquum ab eisdem toto, vt aiunt, cœlo differrênt. Proptèr quod porrò partvum huiuscemodi monstroforum causam in apricum diducturus excerpfi earum aliquot, hisque mòx cultro dissectis, comperi statim ligneam excrescentiarum prædictarum substantiam valdè crassam (ità nempè, vt neque ferro facilè aperiretur) fermè in meditullio suo scrobiculos continere nucleis ceraforum abscondendis facilè pares tresque aut quatuor numero in vnaqualibet excrescentia, prout etiam in singulis eiusmodi scrobiculis tres, aut quatuor vermiculi continebantur teretes, albi, diaphani, nigraque promiscide ad os vt & annulis per totum corpus instructi. His itaque exploratis cessauit ratio vltèriùs dubitandi, vtrùm hi vermiculi, aut ipsorum semen ab

extrà prorepfissent in præfatas tuberositates, nec nè. Neque enim istarum durities, & spissitudo id ferre poterat; & si adeó ab intrà superuenerunt, quorsúm hæc, nisi ad ipsius arboris incrementum? Testimonium huius rei amplissimum perhibebant noduli illi lignei, siuè tubercula in finem ramulorum eiusdem plantæ coaceruata. Vndè namque ista? nisi ex eo, quòd illuc prolixé succi alibilis flumen affluxerat: fluxit verò, quia á turgescente verminoso semine inflatum fuerat, ac deriuatum. Postremò fidem faciunt inter alias herbas, etiàm brassicæ omnes. Harum ego incrementum cùm aliquandò considerarem [at magis tamèn pediculorum, qui sub ipsarum folys vigent, prodigiosam quantitatem] sciscitatus fortè istius causam, à proximè obuersante olitore responsum tuli, fieri non posse, quin ab interiori brassicarum substantia procederent dicta animalia, cùm nimirum vnius generis essent, sub caulium folijs viuerent, cùmque omni industria non obstante egrè ab ys prohiberentur; quin imò & se vidente ad miraculum vsque interdum sint multiplicata. Quo audito, patuit statim mihi quamobrém tám lætè germinarent illæ plan-

plantæ, didicique ex his quod hanc Phycen & ipsi callent Hortulani.

Sed à Vegetabilibus ad Animalia transeundo, horum nutrimentum actuari, vt ità dicam, ac præparari à Vermibus, quorum determinata quædam species in singulis illorum speciebus existunt, mihi tam perspectum est, quàm quod perspectissimum. Et primò de Volatilibus, ne fortè quis hoc meum duntaxat putet esse inuentum, aut dicerium, vtque res aliena paritèr auctoritate roboretur, transferam huc fidelitèr [ne idiomate quidem mutato] singulare vnum ex Præstantissimo *Redo* exemplum, quo videlicet non tam humorem digestivum ab *OEsophago* percolare, quàm & *Vermes* in eodem educari vtcùnque ad *Chylosin* absoluendam facilè demonstrabitur. *Gl' uccelli*, *aquatici* [inquit Vir ille celeberrimus] *non*, *anno nel' loro Esophago quel gozzo, che vi anno*, *i Galli*, *tutto il genere gallinaceo*, *le Pernici*, *le Starne*, *ed altri simili*, *è nel genere de Rapa*, *ci lo Sparauiere*, *il Falcon pellegrino*, *è l' Al*, *banella*. *Ma se gli uccelli aquatici son priui*, *del gozzo*, *non son già priui di quelle tante e*, *tante glandulette*, *delle quali internamente è*, *corredato l' Esophago di tutti gli altri uccelli*

V.
In OE-
sophago
Auicula-
rum.

la doue esso Esofago si auicina ad vnirsi al-
 lo stomaco, è spremute esse glandule versano,
 un fluido molto necessario al lauoro della ma-
 cerazione, è digestione del cibo inghiotito. Que-
 ste glandule in alcune razze di uccelli son
 più folte, in altre razze son più rade, in al-
 cune son minutissime, e quasi non rileuate dal
 piano, e in altre razze son più grosse, e con le
 loro bochette, e canaletti si vegono molto dalla
 superficie del Esofago rileuate. Tra gli Esofagi
 più douiziosi di tali glandule douiziosissimo
 s'è l' Esofago di quell' uccello aquatico,
 che dà Cacciatori di Toscana, per essere egli
 bianchissimo con qualche fregio di penne nere,
 e col chiuffo in testa parte bianco, e parte nero,
 vien chiamato col nome di Monachetto, di
 cui si può veder la figura pulitamente deli-
 neata appresso Francesco Uvilughbeio &c.
 Dissi che l' Esofago ne è douiziosissimo: impe-
 rochè auvicinandosi allo stomaco ingrossa gran-
 demente le sue parieti per la lunghezza di
 tre buone dita trauerse, è tale ingrossamento
 vien cagionato dalle sopramentionate inume-
 rabili foltissime glandulette. Nelle parieti ester-
 ne glandulose dell' Esofago di questi uccelli,
 appellati Monachetti ho veduto alcune volte
 rileuarsi nello spazio, che è di mezzo trà'l mus-
 colo

Offervaz-
 ioni intor-
 no agl'an-
 imali vi-
 uenti &c.
 pag. 135.

colo, e la membrana glandulosa certi tubercoli, letti biancheggianti, che da me gentilmente, separati, e tratti fuora, sono stati trouati auer la figura simile ad vn fiaschetto col collo, la di cui bocca fosse diuisa in due ritonde aperture, per una delle quali pareua che vn vermicciuolo euaasse fuora souentemente la sua sottilissima testa. E veramente sdrusciti per lo lungo quei tubercoletti, vi ho trouato sempre in ciascuno d'essi vn verme sottilissimo nel capo, e nella coda, ma molto tronfio, e grosso nel ventre; e sta colà dentro radoppiato in modo, che per una apertura della bocca del fiaschetto puo canar fuora la testa, e per l'altra apertura puo canar fuora la coda &c. Ex quibus verbis patet ideò tales lumbricos incolere dictas glandulas, quòd humor ciborum solutivus indiget prætereà aliquo alio principio, pro ysdem in chylum conuertendis: atque hoc quidè principium, cùm vitale esse debeat, in ipsis porrò Vermibus, aut in ipforum ouulis quærendum esse.

Liquet nihilominus istud adhuc magis in Quadrupedibus, præsertim Iumentis, atque intèr hæc demùm maximè in Cane. Videre est namque in hoc animali, idèst in ipsius glandulis, quæ OEsophago insunt, & ferment-

VJ.
In OEsophago
Canino.

Art. 22.

Ibid.

mentum digestivum ministrant [prout nimirum latius ostendetur *infra*] innatare huic humori quosdam Vermes teretes, oblongos, rufos, capite crassiusculo, & qui tandem alibi solitarij, nonnullibi complicati, aut ex parte tantum implexi conspiciuntur. Cætera narrabuntur *postea*. Quod impræsentiarum; Lumbricos item ad OEsophagum, atque ad istius glandulas in Lupo Leone, Taxo, Hystrice aduertit idem Nature Perscrutator indeffessus *Franciscus Redus*. Cum verò eiusmodi glandulis intersit succum illum elargiri, qui exigitur ad ciborum solutionem [perindè scilicèt, ac de modò memoratis in Volucris passus est Vir nunquam satis laudatus] quid est, amabo, cur Vermes pariter non concurrant ad illorum fermentationem? Argumentum certè huiusmodi concursus, imò & quòd inferuiant Chylificationi, idest ciborum iam à digestiuo menstruo fusorum in chylum conuersioni, non contemnendum porrigit idem *Redus* animaduersione in Hinnulum præpinguem, in Damam lactantem &c. ut qui nempè intus Vermibus etiàm innumeris referebantur, aliòqui fani ac viscerum optimè conformatorum. Quæ cum ita sint, qui porro

porrò neget tales bestiolas non aliquid conferre ad Chylosin præfatam? Sed utcūque res habeat, inquis, Vermes tamen non vbiq̃ue ad OEſophagum proſtant. Reſp. nihil intereſſe hìc ne, an illìc habitent eę beluę; dummodò indè illam exerere valeant actionem, quę alimenta liquefacta in ſuccum vertit nutritivum, mobilem, & in vitalem. Quę res eſt iccirco, vt in OEſophago, Ventriculo, aut in Intestiſtis vtplurimùm conſpiciantur, fortè quòd exhinc tale quid audeant luculentius, quàm ex alia quacunque parte. Sic Uermes in Afino ad Ventriculum conſiſtere refert *Malpighius*; in Tigride ad Intestina *Redus* &c. vt qui in his recensendis nimius eſſem. Sufficiat, igitur obſeruafſe, non aliam exiſtere Vermibus, in brutis omnibus hoſpitandi cauſam, niſi vt alimenta inſtruan ad congruam ipſorum nutritionem.

His animaduerſis, fortis me coniectura deprehendit, eſſe lumbricos, qui & in homine chylum perficiunt. Neque enim præterierat qualis & ipſe ſim, *putredo* & *vermis*: memor etiàm talia infecta vbiq̃ue in humano corpore ſpectata fuiſſe; ſic eadem in febricitantium ſanguine obſeruarunt *Kircherus*, *Petrus à Caſtro* & aly quamplurimi.

VII.
In OE-
ſophago
humano.

Certo refertur, inquit Borellus, in sanguine febricitantium vermes reperiri, & non semel legi historias de vermibus per vulnera venarum elapsis. In venis pariter hos lustravit Riolanus, & cum eo Zacutus: item Prenotius, Spigelius, & alij plures: Præterea in hominis Vesica fellea eosdem inuenit Vviers; in Hepate Bartholinus, Kerkringius &c. Denique in Vrina à non paucis deprehensi fuere lumbrici ac vermes, vti nempè à Christoph. Tinctorio, referente nupèr citato Bartholino, à Ronsséo, Rhodio &c. Nec satis: noueram adhuc ipsos non procùl ab OEsophago suas colonias habere: quandoquidem in phasibus verminosis semper aut viuos eosdem conspexeram per Os exire, vel vomitus inducere, aut strangulationes.

VIIJ.
Glandu-
la Thyro-
idæa me-
rum est
Quarium
vermino-
sum.

Quibus indicatijs permotus curauì nosse ubi-nam ad OEsophagum stabularentur talia infecta; & quidè an (quemadmodum in Canibus) in glandulis humorem alimèntorum solutivum sequestrantibus fortè cubarent? Verùm ademit dubitationem hanc statim, quòd adspexeram eiusmodi animalculorum vestigia ibi nunquàm extitisse: inuenta verò fuisse, & quidè crebrò, abs me in glandula Thyroidæa, prout videli-

videlicet in sequentibus enarrabo.

Anno elapso 1710. quo tempore *Fossanum*,
 ut & alia complura *Pedemontana* loca febre
 Petechiali Epidemica tantum non deleta
 sunt, *Cellis* (paruo cuidam *Astensium* pago)
 quum idem contagium interuenisset, vide-
 re fuit ibidem *primò* die 18. Ianuarij ferè quar-
 tam partem Incolarum ceu fulmine tactam;
deinde singulis insequentibus Nouilunijs, Fe-
 bruarij nimirum, Martij & Aprilis (abhinc
 namque Pestis illa sensim remittere inchoa-
 uit donèc ad extremum Æstiuo tempore omni-
 nò extincta est) tria reliqua quartaria [adeò
 ut intra dictos menses saluis pueris, ijsdem-
 que magis tenellis, aut qui à Variolis, &
 Morbillis, qui, nempe affectus, longè la-
 tèque pridem debachati tali tempore etiam-
 num sæuissimè grassabantur, eluctati cen-
 sum immanissimo tyranno persoluerant,
 vix tres omninò è mille, quantus scilicet tum
 esse poterat in eo Oppido numerus persona-
 rum, sospites atque ab eiusmodi contagio im-
 munes euaserint] decumbere nimirum simul
 tot homines vno eodemque morbo, vno at-
 que eodem die, imò & eadem hora. Mor-
 bus autem ille erat ferè huiusmodi. *Tussicula*
 quædam *sicca* Oppidanos primitus, ac de re-

IX.
 Probatur
 Experien-
 tia.

pentè corripiebat aliquali ut plurimum *Cephalagia* coniuncta : deindè Febris, quæ tunc
 aberat, vel á paucis horis inuadebat *lenta*,
absque horrore cum *pulsu paruo*, *irregulari*,
profundo, atque in aliquibus *vix perceptibili*.
 Accedebant postea ad hæc *Lassitudines*, ac *su-*
bitaneæ Virium prostrationes, *Cordis angustie*, *an-*
xietates aut *pressura*, nonnunquam etiã *Ani-*
mi deliquia, *Syncopa*, aut *Lipothymie*, plerunque
 verò, imò infallibilitèr *Cardialgia*, eedem-
 que crebræ & contumaces cum *irrito vomendi conatu*; ac postremò apparebant ubique
 in vniuersa cute *maculae*, siuè *petechiae parvae*
 ac *nigræ*; quæ tandèm vel à *Delirijs* exci-
 piebantur, vel abs *Motibus convulsivis*, *Le-*
thargo, aut demùm ab *affectu* aliquo *Coma-*
tofo. Nouissima verò hæc sympomata initio
 quidém, hoc est hyemali tempore, ad summũ
 quarta die obueniebant, mòx septima,
 atque vltimò etiã vndecima, eademque,
 aut postera die lugubrem scenam claudebant
 cum hac tamen differentia, vt quò citiùs ad-
 uentaret *Æstas*, quemadmodum *Epidemica*
 constitutio minorabatur, sic *Ægroti* minùs
 itèm periclitarentur, & qui præsertim per
 contagium non fuissent infecti. Cæterà præ-
 tèt nonnullos, & quod in totum dixerim
 duode-

duodeviginti Infirmos partim Senes, partim ad extremam pauperiem, eò videlicet anno vel post hominum memoriam calamitosissimo, redactos, nemo Diuina largiente clementia desideratus est, imprimis quis mihi tum è proximo, sed longè nobilior vico, vbi conductus eram, certa per intervalla ad illorū visitationem accedenti, stabilito ob id annuo stipendio[si summam spectes miserando, nisi ex alia parte suppleuissēt preces, quibus me & per DEI amorem publicè ad sui curam inuocare non dubitarunt] morem (absit arrogantia dicto) gessisset, atque ipsâmet, ad summum altera inuasionis die pharmacum abs me excogitatum, eâque occasione magnarum virium expertum [de quo porrò *alibi*] assumpsisset: quo factum vt quotiès illuc adirem, vix ab equo delapsus vbique in platæis ac vicis magna confluentium iam laborare se sentientiū hominum caterua stiparer, aut obsiderer, quòd nimirum truculentissimum morbum vel unico presidio tempestiuitèr tamē adhibito omninò profligatum pluriès aduertissent: è contrà verò, hoc non, vti decebat, propinato Verum satis extrà oleas. Quod rem: Cùm itaque fatagerem callère ferocissimi affectus

Pathologiam: nec tamen in dicto pago propter ægrorum ad me nullo non tempore accurrentium importunitatem, additis dierum breuitate, istorumque impendio hinc in visitandis ægris faciendo, indè verò tùm in accessu, tum & in reditu ab illo territorio [ad hoc ettenim infirmi, quos alibi quotidie bis inuisere tenebar, me obligabant] vijs existentibus quasi inuijs, ac tempestate iniqua, *Anatomia* iccirco [cuius fax à Medico in eruendis morborum causis præmitti debet] ibidem studere possem, fato euénit, vt laborante vniuerso, vt ità loquar, *Cellensium* mundo, Cognati istorum, qui ex finitimis, præsertim *Antiniano* (quò subindè ad Ægroantium curam assiduò vocatus sum) nec non ex *S. Damiano* (quò videlicet conductus fueram) alijsque Oppidis eodem ad assistendum Consanguineis suis accedere debuerunt, diro illo contagio infecti cum his xenijs ad Patriam suam reuerti coacti sint; quibus tandem, vt fas erat, extinctis, ea demum occasio vltro, domique mihi oblata est, quam secus captare non potuissem. Hinc igitur clã propter Indigenarum in *Medicos Anatomicos* absurdam præuentionem dissectis quã hic, quãue illic, in alterutro nempè Oppidorum vltimò

ultimò nominatorum , plus decem Denatorum bustis , quoniàm porrò ex symptomatibus prenarratis, egrorum itè deiectionibus alyisque signis , quæ suo loco explanabuntur, constiterat mihi iamdudùm Pestem , quam descripsimus, esse à Vermibus (*uti nimirum etiam Vermes, inquit Tilingius, pro vera februm causa & præsertim malignarum ac consequenter etiam Petechialium plurimi agnoscunt. Gregorius enim Horstius [subdit paulo post] sect. 18. Epist. Medic. pag. 498. Vermis in quartana, & alterius striati in febris tertiana notha meminit. Sic lumbricus latus in febris putrida euacuatus fuit, ut Idem dict. lib. pag. 500. notavit Anno 1597. priusquam lues pestilentialis Seruestam infestare inciperet, febres grassabantur malignæ, epidemicæ. In Adultis quidè plerumque cum petechijs. In Iunioribus autè cum Vermibus, qui & ipso postmodum pestis tempore à multis pueris per os & Intestina reiciebantur. Salmuthus Cent. 3. obs. 54. Vermes è capitibus febris Vngarica mortuis proruperunt. Conradinus cap. 11. de Febris. malign. Volck. Coiter in appendic obseru. Chirurgic. & Anatò. in Matrona cuiusdam pestilenti hamitrito extinctæ capite aperto vermiculi cum cimicum copia reperti sunt. Cornel. Gemma in appendic. oper*

Cosmocris

de Febris -
bus pete-
chial. c.6.

Cosmocrit. *Iuuenis quidam in febre acuta duos tresue Vermes ad formam granorum pini reiecit.* Valefc. de Taranta lib 4. cap. 30. *In febre quadam maligna vermes excretos vidit Foreftus lib. 6. Obfer. Medic. 4. & 5. Zacutus Lufitanus lib. 2. prax admir. obfer. 42. & lib. 4. Medic. Princip. Hiftor. 46. queft. 42. in peste fauiffima, quæ totam Lufitaniam, & in ea Vlifliponem depopulata principio morbi omnibus vermium rotundorum nigrorum copiam per nares emanaffe obferuauit: Variolas verminofas in puella quadam vidit Excell. Ehrenfried. Hagendornius &c.) eò propterea direxi aciem Mentis meæ, vt illorum, nempè Vermium cubilia mihi forent aliquandò perfpecta. Aperui itaque Oefophagum, Ventriculum, Inteftina: nec Vermes indè porrò aberant; fed ità tamen proftabant, vt in aliquibus, quos paucis ab obitu horis exentraui [citiùs nàmque, quàm vt aliàs licuiſſet, humari poſcebant cadauera peſtiferorum] compererim Vermes Oefophagi, aut Ventriculi incolas vitæ indicia adhuc exhibere, cùm interim aly Inteftinorum flacceſcerent, marceſcerent mortui. Hoc adeò indicio fretus, & cùm inſupèr recordarer, quemadmodum aliàs in affectibus itèm verminofis aduer-*

uerteram quotquot ab ore erumpebant , esse vitales , aut saltèm magis viuaces ys , qui ab aluo descenderent, in eam incidi opinionem , vt censuerim Vermium genesin secùs quàm in inferioribus , in superioribus potiùs trunci corporei partibus quærendam esse . At quod Venter : intuitus sum porrò eundem in nonnullis, eiusmodi infectis vacvum , & quorum nihilominus corpora eâdem , vt suprà pestilentiali labe , dùm viuerent , erant infecta ; quod pròindè in causa fuit , cùr coniectatus sim ad extermum , esse OEsofagũ , qui velut Emporium sit talium belluarum , quemadmodum ibi etiàm ostendimus . Et fanè quis non nouit plura in verminosis ægri- tudinibus accidere phœnomena , quæ haud- quaquàm apparerent , si ydem Vermes in Ventriculo , aut in Intestinis progignerentur , qualia nimirum sunt *Pleuritis spuria* , *Tussis* , *Saluatio* , *Narium pruritus* , atque alia , quæ identidèm recensitum ibimus & coniunctim tandèm explicabimus inferiùs ? Ob hanc rem igitur totus in eiusdem OEsophi partibus enucleandis esse volui . Nec frustrà ; siquidèm à Pharynge orsus , atque ab ys locis in quibus *Strangulatiõem* aliquandò à Vermibus induci adnotaueram , apertâque *Thyroidæa* glandu-

la, quæ in præfatis cadaueribus plus solito turgidame iccirco ad ipsius sectionem antè alia inuitauerat (& cùm prætereà dicti Ægroti omnes indice externè ad *Pomum Adami*, vt vocabant, admoto ibidém dolere se se plerunque significarent) inueni continuó illic vermiculum quendam albissimum, diaphanum, parvum atque ità tenellum, vt vix è glandula eductus confestimeuanesceret, sæpè etiám papyro impositus indidém liqueſceret relicta duntaxát nota ceú loturæ carniū, aut guttæ lochiorum, quæ muliebre indusium intinxerit: atque hæc profectò ratio fuit, quòd mutuò licét accepta ob id vna atque altera vitreâ lente à Famigeratissimo Viro, Litteratorum Fautore eximio, ac de Republica Medica optimè merito D. *Ioanne Baptista Vulpina Astense* [cuius adeò nomini, vtpotè immortalì cùm ficulneis his corollis pro dignitate satis litare nequeam, dicam cùm quodam Poeta:

„ *Non canto Lui, però che Lui non posso*
 „ *Degnamente onorar, se non tacendo;*
 „ *E riverendo: ma non fian giammai*
 „ *Gl' altari soi senza i miei fiori, è senza*
 „ *Soave fumo d' odorati incensi;*
 „ *Ed allor questa semplice è deuota*

Rel-

„ Religion mi si torrà dal' core ,
 „ Che d' aria pascerañsi in aria i Cervi ,
 „ E che mutando i fiumi è letto , è corso
 „ Il Perso beala Sonna , il Gallo il Tigre.]

organicam tamen illorum structuram nul-
 latenùs obseruare valuerim: aduerterim au-
 tèm probè, quatinùs compendia erant ipsa
 eorum lumbricorum, qui *Rotundi* appel-
 lantur, & à quibus etiàm non, nisi in ma-
 gnitudine differrebant adeò, quòd illic natos
 autumare possem tales vermiculos, & si eis-
 dem indè abeundi potestas facta fuisset, vtrò
 in ingentem molem, cuiusmodi nempè sunt
Rotundi, excreturos. Et certè vndè-nam ys
 textura illa effatu facilis, seú, quæ nullo ne-
 gotio sufflaminabatur, color itèm vanidus,
 ac pelluciditas, nisi ex eo, quòd corpora
 erant illa viuere incipientia, ac recens ex
 ovulis suis exclusa? Denique volutabantur
 ydem Lumbrici in quadam sanie veluti coe-
 nosa & sanguinolenta, quæ, expressâ glan-
 dula gemebat in OEsophagum, per concauas
 quasdam fibras iám alibi adnotatas; fuitque
 hoc ipsum pus, quod mihi demonstraerat
Thyroidææ glandulæ excretoria vasa. His por-
 rò sic consideratis superfuit concludendum
 istiusmodi glandulã esse ipsum purũ putum

ouarium verminosum, prout nimirum sequentia perpendenti adhuc ulterius res inclarescet.

X.
Et Ratio-
ne auto-
ptica.

Primò namque si vera esset glandula, à quâ nempè aliquis determinatus humor filtraretur, ut reliquæ tam *Vesiculosa*, quam *Vasculo-vesiculosa* &c. eodem intimè maderet: cum verò tantum absit, quin succus qualiscunque stagnet in illius cavitatem, ut hæc potius sitiat, ac perpetuò quasi are scat, sequitur iccirco ipsam nequaquam fungi munere glandularum. Et de facto quomodo fungatur, si è *Bronchialibus* ramusculis tam parum sanguinis imbibit, ut hic nedum ad recrementi cuiusdam procreationem, vix sufficiat ad ipsius glandulæ nutritionem? Cū verò isthæc magnitudine innumeras superet, quæ glandulæ nihilominus pluribus ac maioribus arteriis irrigantur, dicendum venit, vel quòd Natura prouisis coeteris soli *Thyroidæ* deesse voluerit, vel quòd hæc non sit vera glandula, ut patet. Ac *rursus*, si vera esset glandula quidni proprio insigniretur excretorio vase? Licet autem spiraculis quibusdam pateat, seu fibris fistulosis, de quibus supra; fibre tamen istæ in emunctoriorum censu minimè sunt collocandæ, ut-
quæ

quæ nimirum impares existunt humori cui-
libet exantlando, nouerimque ipse sæpius
in recensitis casibus, quemadmodum expref-
sa vtcunque, licet fortiter, illa glandula,
pus in ea contentum egrè nihilominus, ac
nonnisi per binos, tresue porulos seorsim,
idest in OEsophagum cogi potuerit. Prop-
ter quod, & quia coeteris *Thyroidæum*
illud, nempe corpus, destituitur qualitati-
bus, quæ exiguntur ad verè glandulæ ratio-
nem; næ ego ipsum istiusmodi titulo iure
fraudabo? Substituam igitur huic nov-
um istud, scilicet *Ovary* nomen vel ex hoc
protinus, quod tale corpus fistulis illis per-
vium spectatur. Hinc enim clarè satis eui-
ncitur inesse ibidem virtutem quandam, quæ
in OEsophagum per eiusmodi tubos irradiat:
hec autem virtus, cum in Vermibus fundata
sit, qui in alimenta tam soluta, quam pro-
ximè soluenda chyli symbolum & vitalita-
tem conferunt, vt denunciauimus, ab isto-
rum ovulis propterea esse debet, ac rursum
quia ydem Vermes visi sunt illic pullulasse.
Tertio quia interior *Thyroidææ* glandulæ
præfatæ facies aspera, squallida, informis,
cauernosa cryptas, antra, specus aliaque hu-
iusmodi latibula, in quibus colubri, angues,

viperæ oua sua condere consueuerunt, proximè representat : & *quartò* denique quia eadem interior substantia quùm discindere-
tur fragorem edebat, qualem lendes, aut bombycina semina vngue discussa aut lacerata.

XJ.
Oua Verminosa
homini
Sunt con-
natural-
ia.

Haud itaque omninò temerè dictum est abs me, glandulam *Thyroidæam* Seminarium esse, aut germanum *Vermium Ovarium*, lūbricosque in eâ repertos ibidè prorsus, & non alibi fatos fuisse. Sed quæ postea sic me sentire fecit, consideratio illa fuit, quæ denique perspectum habui hætenus venditatas de *Vermium* Generatione sententias friuolas, ob aliud non substitisse, quàm ex eo, quòd à grauissimis vtcùnque *Viris* excogitatae, subindèque pro *Sacris* habitæ anathemate pessimo ferire posse visæ sint, quisquís non credidisset. Quæ nihilominus libero hoc scholasticè fandi tempore, ab aliquibus, prout decebat, carptæ ac fugillatæ; iam iam patronos non habent alios, quàm obstipas ceruices, solo silentio, atque contemptu dignæ.

XIJ.
Eluitur
Senten-
tia Vete-
rum de

Et primò quod *Aristotelicorum*, vt & *Galenicorum* mentem : hanc tam feliciter cicurarent hodierna die *Redus, Craanen, Suu-
mer*.

merdamius, Bidloo, Leueneek, vt nec eius, quod sibi volebat, quū Vermes ex putri nasci assereret, vspiciam recordetur. De facto quid sibi vult *putredo*, nisi *Corruptionem*? *Corruptio* autem cum sit *subita mutatio ab esse ad non esse*, iuxta declamatum illud ipsorum-met Aristotelicorum axioma, quo pacto, quæso, materiam congregare, eidemque formam conciliare verbo, viua animalia gignere valeat? Dixi putredinem intendere non nisi corruptionem; quippè putredo ab eodem *Aristotele* definitur quod sit *corruptio propriæ & naturalis caloris in unaquoque humido à calore ambiente externo*. In quâ definitione corruptio generis locum occupat; *putrefactio enim est contraria generationi simplici mixtorum* (ait *Tilingius*) *corruptio vero adæquatè repugnat generationi*: Ergo putrefactio & corruptio non differunt.

Cartesianos autem, *Cassendistas*, & quotquot demum Vermes ex Insectorum ovulis plerumque per os siue cum alimentis, siue aliter in Ventericulum introductis generari asseuerant, non ita dudum pessundedit *Vallisnierus*. Atque hinc ego planè non possum non gratulari Sorti meæ, qui cum *Helmintologiam* istam conficerem, ac Neoterico-

rum

XIIJ.
Reijcitur
altera Re-
centiorum.

rum opinionem illam refellere per consequens tenerer, impegi fortè in Epistolam quandam Italicè conscriptam, & quæ Tractatui similiter Italico *de Remedi delle Malatie del' Corpo Humano* annexa est; in qua porrò comperi tales partes ab eodem *Vallisniero* egregiè nauatas. Destiti itaque ab opere, ne videlicet actum agerem ut aiunt; utque ostenderetur, picturas has ce nostras iam inuenisse amafios suos, Epistolæ illius verba hic tantum transcribere operæ pretiū duxi. *Si fermò assai su l'ultima opinione,,* (nempè quam posteriori loco attulimus), *comme la piu applaudita ed abbracciata da tutti,,* & ultimamente anchora dal Sig. Ands Fran- *,,* cese nel suo libro *de Vermi humani* stampato *,,* in Parigi. Prouò con euidenza non puoter *,,* nascere questi da Voua, che si ritrouano ne frut- *,,* ti, erbe &c. imperoche non essendo il suo nido il *,,* nostro corpo, subito calati nel Ventricolo doue *,,* sta quel merauiglioso fermento, comme spezie *,,* d'aqua forte, che continuamente vi cola, è ge- *,,* me da certi canoncini ò siphoncini, vengono *,,* assaliti, stritolati, è consumati dal medesimo *,,* *Mà dato anche, che la buccia loro durissima,,* lo vieti, è che piu tosto aiutati, è fomentati da *,,* quel calore vi nascano, essendo i vermi appena *,,*
nati

nati di una tenerissima tenerezza, faranno subito da que sali pongenti, e roditori traffitti ed uccisi. Il che accaderà parimenti, se nasceranno negl' Intestini, o in altri couili, o nascondigli, piu reconditi del nostro corpo, stillando da per tutto sughi attiuissimi, e per lo piu impregnati di sali, che faranno sempre bastevoli per isminuzzare e diuidere la loro gentilissima macchina. Non potranno in oltre rintanati, e rachiusi in que caldi e tenebrosi repostigli non soffocarsi, auendo à questa la natura destinata l'aria libera ed aperta per il loro mantenimento, e respiro. Il nutrimento anche diuerso sarà cagione, che perano, essendo à tutti destinato il suo frutto, il suo fiore l' erba sua, o quello che è piu conuenneuoale alla lor tessitura, il che facilmente si vede da chi si diletta nutrirne, comme hà fatto tanti anni il Vallisnieri. Non viuono, se si tenta mutar loro il nutrimento, abenche à Vermi delle fruttra si dyno altre frutta, à que de fiori altri fiori, à que dell'erbe, altre erbe, e così discorriamo di tutti. Anzi, se à loro si tritano, o si sminuzzano, non li mangiano parimenti, tanto sono delicati e gentili. Dal che si vede, che maggiormente periranno, se faranno dalli attiuissimi fermenti, del nostro corpo adulterati, e mutati comme in

un'altra sostanza. Non essendo anche i vermi,,
 de' frutti legumi, erbe e simili auezzo al notto,,
 restaranno dalle beuande, e tanti liquidi che s',,
 ingolano, estinti, oltre i sughi, che continuamente,,
 gemono in ogni luogo. Ciò pure fece vedere con,,
 molte isperienze; poiche niun verme auezzo,,
 ne' frutti, legumi, e cose simili può campare,,
 nell'aqua non che pura, è tepida, è piuttosto muo-,,
 iono col' vaso strettamente chiuso, o anche se,,
 si rimescolano con poltiglie, e sughi, e muchi, e,,
 impurità liquide d'animali. Guai a Noi, di-,,
 cena, se douesser nascere i pellegrini semi, o vi-,,
 uere i piccoli bacheroluzzi, che inauedutamente,,
 di continuo inghoiammo.

Oltre à ciò non poteua capire, soggiongieua,,
 egli, comme da mille sorti d'uoua, è minuti,,
 insetti, che inosservati continuamente s'inghiot-,,
 tano, tre sole spezie di Vermì si ritrouassero con-,,
 tinuamente in Noi. Ne l'uom cauto ingegno-,,
 so molto per la sua gola mangia i grani e semi,,
 crudi ne le frutta senza maccinarle coi denti,,
 ne l'erbe senza cocerle, o almen condirle con,,
 oglio, sale, acceto, ed anche pepe, tutte cose,,
 che sono generose e sterminatrici de' vermi. Ma,,
 il piu forte argomento, che adusse à mio pa-,,
 rere, fù l'auere egli cercato con sudata diligen-,,
 za fuora di noi nell'ampio seno de' campi, e nel',,
 po,-

portentoso numero degl' Insetti i Padri è Ma-
dri consimili de nostri Vermi. Già si sà l'im-
menso studio, ch' hà fatto incercare con iscru-
polosa esattezza la generatione, le mutationi
i costumi, le virtù mediche di tutti quanti gl'
Insetti, che gli son potuto capitar alle mani.
E pure non ha mai potuto trouare i simili à
que comuni del nostro corpo. Cōme addonque,
conchiudeua, puossono venir dal' fuori, se non
v' è simile di luoro? Ogni simile nasce dal' suo
simile per autorità anche del' grande Aristotile,
è la gran' mano onnipotente d'Iddio ha stabi-
litolle sue leggi finite à tutti. Non nascon sem-
pre monstri, è se pure ne nascon alcuni, v' è la
sua legge anche in questi, che non è monstrosa.
Non succedono è per diritto è per trauerso, com-
me pensano alcuni. Da vn Volatile non nas-
ce vn Pesce, da vn Pesce non nasce vn Qua-
drupedo &c. V' è anche ne mostri il suo termi-
ne, è non possono passar que confini. Da ciò
fortemente mostrato deduceua, che da vermi de
frutti, erbe, è simili non puossono nascere i ver-
mi comuni á noi, imperciòche per centina-
ia d'osservazioni da lui fatte ha constantemen-
te veduto mutarsi quasi tutti quegli in Volatili,
cioè in Farfalle, ò in Mosche, ò in Cantaridi,
in Ibini, Troci, Scaraffaggi, è simili, ed i ver-

*mi ordinary del' nostro ventre restar sempre „
vermi.*

*Mà se alcuni ve ne sono, che non si muta- „
no in volatili, comme i Pidochi dell' erbe non „
alati, ed altri simili, ò comme certi vermic- „
cioli, che soggiornano nell' aque, in grembo al- „
la terra, sono però di così strana è diuersa fi- „
gura, che è ridicolo il pensar solamente, che „
syno genitori de nostri: Sono addunque tutti di „
spezie totalmente diuersa: onde con mutar su- „
ol luogo, non puossano mutare di spezie. Que- „
sta può bene alterarsi, può alquanto confon- „
dersi, non cangiarsi. Oltre à ciò, se sono di „
que di fuori, e perche anche fuori del nostro „
corpo usciti che sono qualche volta, non cam- „
pano? E perche subito si contorcono, s' illangui- „
discono, se ne moiano, se tornano nel' loro pri- „
mo Elemento à goder l' aure, che à loro sono „
connaturali, è più libere.*

*Mà sempre più incalzava l' suo argumen- „
to. Concediam, diceua, che nascano in noi, che „
si nutriscono, che crescano; giorni che saran- „
no alla loro perfezzione, comme fà il verme „
da seta, que d'ogni moscha, d'ogni farfalla &c. „
douranno incrisalidarsi; cioè mutarsi in altra „
apparente figura, cessando di cibarsi all' hora „
per poi spogliarsi anche di quella, ed uscire „*

volatili: altrimenti, se ciò non fanno, periscono. „
 Quella è la sua meta destinata à loro, quella „
 è la loro invariabile legge. Così noi dentro „
 l'utero delle nostre madri gionti, che siamo „
 à quella determinata grandezza, squarciam- „
 mo i veli, che c' imprigionano, ed usciammo „
 per le note lubriche vie, o periammo. Tutto „
 è fatto con regole indispensabili, è con un or- „
 dine eterno inalterabile di arriuare à quel ter- „
 mine, è non passare più oltre; altrimenti sa- „
 rebbe una perpetua confusione nella natura è „
 torneremmo all'orrore del Chaos. Sedonque non „
 ueggiammo in noi queste mutazioni de nostri „
 Bachi, è segno, che suono di una diuersa è par- „
 ticolarissima spezie; dunque non dobbiammo „
 per ignoranza confonderli con que di fuori „
 Ne uale il dire che nel mondo grande sono i „
 lombrici terrestri simili à nostri, che si possono „
 dire del mondo piccolo, onde questi saranno i lo- „
 ro Padri, è Madri.

Poiche fatta esattissima Notomia è degl' uni „
 è degl' altri, trouò le loro parti interne tutte di- „
 uerse comme disse auere offeruato il Vuillis „
 il Redi, & il suo caro amico Cestoni &c.

Oltre à tutto ciò, aggiungena, chi mai s' ingi- „
 ozzarebbe di quelle uona, che sempre si tro- „
 uano molto bene uisibili, è palpabili sotto ter- „

*ra? Comme uerebbero ne cibi? E se per qual-
che accidente uenissero, comme dal mondarsi,
è lauarsi le herbe non si raderebbero via? E fi-
nalmente inghoate, comme la loro tenera è,
facile buchia resisterebbe alla macina de' denti,
ò al fermento dello stomacho? comme le galline,
è molti altri animali, che ghiotissimi sono á
mangiare simile sorta di vermicoli, non sa-
rebbero pieni Zeppi de medesimi? Ed i fan-
ciulli finalmente, che non suchiano, che latte,
dalle poppe, come inuerminarebbero? anzi,
comme nel Ventre delle luoro Madri anchora,
chiusi dentro quella gelosissima, e ben' guar-
data prigione, farebbero vermi nel loro Ven-
tricino, è dentro i loro innocenti Intestini &c.?*

*Hęc vbi ab Excellentissimo Viro prælu-
sa audiui, reliqua etiám facilè ad meum
modulum cantatum iri posse credidi. Ve-
rúm tantúm abest, quin tonum is illum ob-
secundare voluerit, vt potiùs relicto plu-
teo in Sacrarium se receperit. Sic enim de
eodem iterùm Author Epistolæ allegatæ:
Preso fiato il Vallisnieri mostrò facile, non tan-
to forastiera, comme si vede la loro origine, mà
nota, dimestica, e troppo familiare. Disse na-
scere in noi da loro genitori, è venire trasmessi
dalle nostre Madri à figlioli, come male eredi-
tario,*

tario, e qualche volta anche dal latte materno, dentro il quale sovente s'annidano. E qui ripeteva molto alta la loro origine.

Iddio, diceva, quando creò questa gran mole del Mondo, mise comme in Iscena (che quasi chiamò Tragica) gl' Abitatori soi, con tal ordine, che uno cedesse finalmente il luogo all'altro, e che uno si servisse dell'altro, mà però con modo più innocente di quello segui doppo il peccato à tutti fatale d' Adamo. E ciò per soi loduolissimi fini non ben capiti dalla nostra troppo corta intelligenza. Così anche creò ne primi parenti i Vermi ò perche con innocenza, è più tosto con utile [notetur hæsitantia Vallisnieri, & si nondùm nostram de verminosi feminis facultate sententiam olfecerit] che danno, si nutrissero degli excrementi superflui (quid, si dixisset potiùs, vt chylum homini conuenientem, idest nutritium ac vitalem, perficerent, ac præpararent) è fosse à loro il nostro Ventre il suo mal noto mondo, per domare la nostra preuista superbia, è castigar noi quando era il tempo, con vilissimi nemici collocati dentro di noi, è senza nostra saputa. Reliqua videri possunt apud dictum Authorem, imò & apud præfatum Vallisnierum (audio namque hunc specimen suum
de

de Vermibus nouissimè edidisse) Vides igitur *Lector* quò istorum, nempè Vermium generationem refundat Vir Illustrissimus: ego autèm, quamuis reor interesse candoris Christiani Summum Opificem etiam in culicis aculeo contemplari; in ijs tamen quæ ex materiæ iàm creatæ necessitatē dependent, minùs candidè me facturum ducerem, si Creatorem implicarem; & cùm præsertim idem Deus morborum causa perpetuò statueretur. Quod verò subdit indè de Vermium seminio è Parentibus in Posteris per traducem propagato, præterquamquòd inintelligibile, est etiàm falsum. Cum enim idem è Matre in Filios transmandatum velit, idque aut cum illius sanguine, aut vnà cum lacte, patet recurrere in hoc argumenta, quibus ipse Vermium generationem ex ouis ab homine inter vescendum simul cum esca deuoratis impossibilem demonstraui. Et de facto, si cum materno sanguine in foetum emanaret tale semen, quamobrèm in tot vjs, in tot liquoribus, Menstruis, fermentationibus, in ipso denique tot annorum curriculo non suffocaretur? Si verò cùm lacte, nonnè obseruauit idem *D. Vallisnierus* Vermes in ipso infantis recens nati moeconio? nonnè hoc ipsum

ipsum didicit itè ex *Hippocrate* : Quid igitur, & cum hominib. insint antè lactis suctionem, Vermes tamèn è Matris vberibus erunt accersendi?

Grates nihilominùs, & quidèm maximæ, agenda sunt eximio Professori eatenùs saltem, quòd excussà veterè calligine novum Posteris Philosophandi campum potuit aperire. Et quod mea; eidem hoc etiàm nomine obstrictus sum, quòd ipsis Philosophis nobiscum opinandi necessitatem imponat. Ettenim si Vermium oua neque ex alimentis neque aliundè nuncupanda sunt, quòd nimirum hinc *Sparsimargia* [siuè sententia eorum, qui oua quotlibet, etiàm humana, vbique, ac per aera præsertim volitare docent, quorumque Coryphæus esse creditur *Reu. P. Magnan*, referente *D. Chirac*], indè verò altera *Suamerdamij* opinio perhibens oua quævis ad hominem procreandum necessaria in vno *Eue* Ouario delituisse, nec non consimilia alia Physicorum placita in hoc casu leuia, vilia, instabilia existant, concludendum remanet idem, nempe verminosum semen insitum, aut ingenitum, hominiue connaturale esse, planè vt, & oua, quibus parua hominum rudimenta conti-

XV.
Confir-
mat No-
stram

nentur, Mulieribus essentialitèr competunt. Quaproptèr vt his Testes concessi sunt, siuè Capsulæ ad oua huiusmodi asseruanda, sic & cuilibet homini Ovarium verminosum; quod quidè m ovarium siuè vna nostris cum Patribus à Summo Protoplaste creatum, vel *Damascenico* in luto, quo eos plasmauit idæatum, siuè denique, quòd ex peculiari hominis, hoc est fibrillarum humani corporis constitutione (id scilicèt, quod probabilius arbitror) pendere dicatur, ità nimirum, vt non magis mutilus censendus sit qui pede, brachio &c., quàm qui eòdem careat, nempe *Ovario*, parum moror: illud autem maximè, vt cèu pars humano corpori essentialis, ac veluti consubstantialis consideretur. Ob quam rem, cùmque nulla alia esse possit pars istiusmodi, quàm Glandula *Thyroidæa* [quemadmodum nempè ostendimus, vtque adhuc pluribus ostensuri sumus infra] superest, vt dicatur hanc ipsam glandulam esse idem Ovarium verminosum præfatum.

Suadet rursùm maximè realem huiusce Ovary existentiam in homine dispar Vermium magnitudo, vtpotè nimirum, quòd plurimi conspiciantur pusilli, tanquàm modò è testula egressi, alij magis grandævi, atque
ado-

adolefcere incipientes &c. Prioribus affines
 erant quotquot nos in Thyroidœis Pefte
 enectorũ glandulis obferuaffe diximus, idelt
 tam tenelli, vt non credam aliundẽ pro-
 uenire potuiffe, abſque quod in via fuiſſent
 diſiecti, ac lacerati, & cum porro aeri expoſiti,
 etſi cartha obducti extemplò ſufflaminaren-
 tur teſtibus huius rei exiſtentibus tũ alyſ
 quã plurimis, tũ & interdũ in Coemeterio
 Eccleſ. Parochialis SS. *Cofme & Damiani* in
 Oppido predicto *S. Damiani* Reu. P. *Vrbano*
Carmelita Excalceato, D. *Ant. Georgio Bochio*
 Med. Doc. ac Diſcipulo meo dilecto, D. *Io. Ia-*
cobo Rouagnono Chirurgo, quem etiã in ple-
 riſque Diſſectionibus Anatomicis adiutorẽ
 atque inuentorum meorũ teſtem ocularem
 & aſſiduum habui; prætereã D. *Franciſco* eiuf-
 dem fratre itidẽ Chirurgo &c. Quæ proin-
 dẽ ratio fuit, vt illorum oua exiſtimauerim ibi-
 idẽ condita, appulſo que illuc aliquandò va-
 pido quodam, aut aliufmodi ab arterys ſero,
 velut menſtruo idoneo atque appropriato,
 incubata aut excluſa, planè ſcilicet vt obſer-
 uare eſt raras plenaſque aquę pluuiæ guttas,
 cum pulueri ſuperexoidunt, æſtiuo tempore
 Ranunculas virides viuas de improuiſo pro-
 ducere. Eadem quòque Vermium teneritu-

do prædicta metum iniecit ne fortè istorum oua oculo vtut microscopys adiuto reuelatura essent se se, & cum in hunc finem aperiri postulet Thyroidoea glandula, cùmque in viuo homine nunquàm aperiatur. Quo non obstante non diffido rem prosperum aliquandò non habituram exitum, acremque Philosophorum industriam quod natura negat, id tandèm non esse euicturam.

XVJ.
Sola Ver-
minosi
feminis
foecund-
atio ho-
mini est
præter-
naturalis

His ergò positis uenit arguendum, ab ipsa hac Natura haudquaquàm tanta Zelo-
typia conseruatum iri illud semen (quanta scilicèt in *Thyroidæa* glandulæ tam imperforatione, quàm firmitudine elucet) nisi vtile esset idem atque humano corpori summè proficuum. Sed oggeris non esse vtile, quod horrendas [imò & ipsum *ultimum* *terribili-um*, mortem] parturit calamitates. Resp. & hoc ipsum esse, quod illius, idest verminosi feminis comprobat utilitatem. Vt enim *Corruptio Optimi pessima*, iuxta vetus axioma, sic tale semen, quod corruptum, summè noxium euadit, antè corruptionem maximè conducibile sit oportet. Et de facto non sunt oua verminosa, quibus hominum strages fiunt, sed vermes, hoc est horum oua corrupta, siuè foecundata, quæque desi-

desierunt esse id, quod erant prius [in quo scilicet corruptio consistit] nam nihil annihilatur. Quid? quod vitæ eadem valdeperé expedire rursus censendum est, cum ad ipforum iacturam siue corruptionem adeo vita commoueatur. Quapropter & tritissima vel apud Nostrates mulierculas observatio est, infantes, qui plures quam par est, lumbricos excernunt, longum non esse viuares. Dic igitur potius sperma verminosum homini esse auspiciatissimum non alias tamen, quam antè eiusmodi encheiresin.

Eatinus autem vite conuenit idem, quatinus chylum, vnde vita est, essentificat, ut patet. Patet etiam denique Conclusio nostra, tale semen esse *principium vitale trasmutativum* alimentorum debitè per soluentia OEsophagi menstrua præparatorum in dictum chylum. Pro cuius confirmatione sufficit attendatur lumbricorum humanorum fabrica. Hanc ego quum aliquando perlustrarem, vidi eos porro secundum externam speciem punctulis albissimis passim consimilibusque ramusculis, velut candentibus arteriarum finitionibus identidem distinctos; quos adeo quoniam nusquam repereram ab aliquo observatos, accuratatione indagine inuestigandos duxi. Se-

XVIJ.
Proba-
tur deni-
que oua
vermino
ia esse p-
rincipiū
illud iChy-
lifica iu-
um supra
dictum,
ex ipsa
Uermiū
structura

cui igitur aliquot ex ys lumbricis, quæque oculis statim se obtulerunt sunt sequentia. i. OEsophagus, idest canalis quidam transparens, prætenuis ac membranofus à Faucibus quæ Hirundineas propemodum simulant, hoc est Sanguifugarum ora, fermè duorum digitorum transuersorum [pro magnitudine nimirum Vermis] longitudinem excedebat nonnulibi strictior, alibi laxior, diuersæque texturæ nunc rarioris mox spissioris (de quibus consulatur *Redus*) à clarisque initys ubi totam Oris aperturam excipiebat, siue taliter, ut hæc illius diametro & vicissim responderet, terminabatur ultimò in Corpus quoddam *prasinum*, seu *olivare* paulò infra Fauces, ac iuxta Dorsum ad Caudam usque protensum. Hanc itaque insertionem contemplatus aliquandò idem *Redus* censuit tale corpus ductum esse alimentorum & fecum: verum [præfata prius apud tantum Virum venia] insigniter deceptus est tum ob alia multa, cum præcipuè propter hæc. Ettenim i. eiusmodi insertionem anticipat dictum corpus, videturque ab vno transuerso digito è faucibus ortum capeffere: quamobrèm & trans ipsum OEsophagum, utpotè pellucidum, probè spectatur. Hinc
igitur

igitur liquet. quod si huiusmodi canalis cum *Oliuari* corpore continuaretur, istius portio, quæ antè controuersam infertionem cernitur, esset omninò superflua: cum verò absurda sit hæc sequela, dicendum venit OEsophagum cum illo corpore non esse continuum: & si adeò deest huiusmodi continuatio, deest similiter ratio dicendi alimenta ac fœces per tale corpus egeri. Quòd autèm non detur ista continuitas, euincitur postea ex eo, quòd diuersissima est vtriusque substantia: OEsophagi videlicèt membranosa, vt suprà adnotauimus, *Oliuaris* verò corporis vesiculosa, inutilis ac mucillaginosa; & prætereà, quia nec prior sensim abit in posteriorem, sed illa eadem in fine est, quæ fuit initio, vt & hæc, antequàm OEsophagum excepisset. 2. quia statim ab infertione prædicta videre est aliam canalem itidèm membranofam è Dorso, ad quod desyt OEsophagus, horizontalitèr [at per breuissimum tamen interuallum] descendere adhuc in alium amplissimum ac rectangulum inque eo puncto, in quo istius latera se contingunt, porò defficere. Cum igitur nouissimum hoc omniū longè capacissimum vas se habeat instar Ventriculi, illud verò breuiusculum atque angu-

stū, instar Pylori, supereſt concludendū quòd
Oſophagus in hoc potiùs, quàm in corpus
prasinum supradictum inferatur. 3. quia sepe
numerò mihi contigit vidisse in Oſophago
Vermium humanorum eandem specie ma-
teriam, qua Ventriculus atque Intestina far-
ciebantur, scilicèt chilum: plerùmque verò
hoc ipso chylo infectus, siuè tinctus idem
Oſophagus compertus est. Vndé colligitur
ad extremum non comitti hunc cum corpore
diuersimodè colorato, idest *prasino* prædicto;
sed cum Pyloro & Ventriculo, ceū vasis con-
coloribus, vt est manifestum. Colligitur
etiàm indè, hunc ipsum Ventriculum. In-
testinaque, quæ illi hinc indè apensa sen-
simque gracileſcentia innumeris circunuo-
lutionibus Vermis longitudinem deciès su-
perant, non esse mera SpermatICA vasa (pro-
ut etiàm arbitratur *Redus*) materiamque in
ys contentam non esse liquorem feminalem
verùm purum putum chylum, vt partim ex
colore ac ſaporè deprehendere potui, partim
etiàm ex eo, quod puncta illa candentesque
venulæ abs me in externa Vermis habitudi-
ne obseruatae, atque incisæ, visæ sint eòdem
chylo manasse. Quæ causa est porrò, cūr hoc
ipso succo nutriri lumbricos humani corpo-
ris

ris demùm cognouerim eisdemque *Chylifor-*
bas citrà iniuriam posse vocari. Coeterà ,
quod totiès memoratum *Olinare* corpus, di-
dici nihil aliud esse illud quàm Vermis Pul-
monem qualem scilicèt in Bombyce alyf-
que Insectis obseruarunt *Malpighius, Villisius*
& aly passim: nec diffitetur idem laudatus
Redus aduertisse se quandòque, vti expresse
dicto *Olinari* corpore, aer per quoddam fora-
men non procùl à Pulmone in Cauda situm,
& quod proin *Podicem* appellat, eruperit. Sed
quod illi *Podex*, mihi verosimiliùs *Trachæ*
caput est. Quandoquidém Intestina ibidém
non exonerabantur, atque ex alia parte OE-
sophagus ità Fauces occupabat, vt non super-
esset pro aere inspirando locus. Insupèr sole-
mne est Vermibus, vt vndecùnque, præter
quàm ex Ore, Spiritũ trahant, quod & præci-
tati Viri testantur. Postulabis iccirco è quànã
parte lumbrici foeces egerant? Resp. negan-
do suppositum; quoniàm scilicèt chylo ij
vel purissimo aluntur: Sugunt autém,
ex hoc quantum vel capacissimus ipforum
venter patitur, aut vegetatio poscit, tùmque
pleni, languidi, inertes facti humano Venti-
culo, aut Intestinis, quæ depopulabantur,
vale dicunt, ac foras exturbantur. Quæ cùm

ità sint, vela contrahamus, dicamus nimirum bruitèr, quòd, quemadmodum axioma est illud penès Aristotelicos infallibile, quòd *ex ys constamus ex quibus nutrimur*, sic in casu nostro, Vermes cum chylo alescant, vi-geant, viuant, eo etiàm principio constent, quo chylus producitur: dicamus, inquam quòd & vti oua illorum exordia sunt, sic ipsa hęc, dùm ad OEso-phagum sistuntur, inspirent dictum principium chylicativum, cuius ratione alimenta iam præparata, siuè per fermentum digestivum iam soluta, aut soluen-da in chylum conuertantur mobilem ac vitalem.

XVIJ.
Ex acci-
dentibus
vermino-
sis & re-
mediorũ
anthelm-
inticorũ
actione.

Apparuit tanto magis hypotheseos eius-
modi soliditas, vt ad Praxin, velut ad incu-
dem reuocata nitidior quotidè fieri visa est.
Etenim, siuè *causam* consideres accidentium,
quæ Vermium generationem comitantur,
siuè *Curationem*, vtrumque in illa, perindè
atque in speculo, elucet. Quod priorem:
Tussicula imprimis *sicca*, Vermium prodro-
ma, explicatur sufficientèr ex eo, quòd oua
iàm affoetescencia ad glandulæ peripheriam
mota, in transitu suo per fibras fistulosas, quę
excretoriorum vasculorum vicariæ ad OE-
so-phagum desinunt, membranam, vndè eæ
ha-

habentur, quæque Laryngem exterius obducit, pungant, aut titillent: quamobrèm & reliqua Trachæa nonnihil corrugata aer præposterè inspiretur demùm necessum est. 2. *Salivatio* à Vermiculis interiorem Gulæ tunicā vellicantibus procedit, raptâ nimirùm in consensum etiàm intrinseca Palati membrana, vtpotè cum quâ OEsophagoea illa continuatur. 3. *Pruritus Narium* ab eâdem vellicatione pendet, interno scilicet istarum velo cum prioribus communicante; ac denique contingit indè etiàm *Nasi extenuatio*, siuè compressio, emuncta nempe ipsius membrana interiore. 4. *Sitis* iidem pariratione fit, quòd videlicet Disgregatæ Faucium & Gulæ glandulæ nimium exprimantur. 5. *Cardialgia* in ascensu ac descensu Vermium in Ventrículum succedit, aut, si maius, in transitu eorundem per sinistrum Ventrículi orificium, cuius proindè fibras ij laceffitum eunt. 6. *Marcor Tabes, Atrophia* Infātibus familiaris, sicuti vel à quolibet *Medico* in Vermes refundi solet, ità neque continens eiusdem causa ipsi occultaretur, vt si sciret talia infecta chylo victitare, istumque in Stomacho porrò depascere. 7. *Copiosæ deiectiones fætidae, cineritiæ, virides*, nonnunquàm

quam etiám *Sanguinolenta* &c. peruersam, Chylosin à Vermibus, intestinorumque irritationes, aut erosiones inculpant. 8. *Febres* presertim *lentæ* á chylo effoeto ac pauco in Sanguinem per lacteas *Asellij* venas introducto &c. dependent, ob quam rem vitata istius crasi, sèu eiusdem cruoris coagulatione facta, *Exanthemata* 9. petechiæ, aut maculæ emergunt. Mitto 10. *Syncopa*, *Deliry*, *Lethargi*, *Convulsionis* consimiliumque affectum verminosorum explicationem, vt quæ ex praua sanguinis diathesi á vapido, seu minus balsamico chylo inuecta, hinc satis erui possunt. Sed 11. *Cephalagia*, quæ in Peste suprâ memorata vnâ cum Tussicula primariò angebat, in eandem causam retorquenda venit, siue in eandem membranose Laryngem succingentis tunicæ titillationem, quâ nimirum *Tussim* illam excitari diximus. Ex eanámque irritatione concussis, aut alio modo motatis nervulis Sexti, præcipuè verò Octaui paris, quod iuxtâ latus *Asperæ* arteriæ in Thoracem illabitur, Dolor Capitis *grauativus* accedat decet. 12. *Dolor* autem alius ad *Iugulum*, seu qui mihi nonnunquám ad cartilaginem *Scutiformem* indicabatur, paren-

rentem agnoscit semper *Thyroidææ* glandulæ *inflammationem*, fitque hæc á Vermibus, qui in ea nati, cum deinde ob corporis incrementum momento factum forinsecus excedere non valeant, suis propterea motionibus corrugatis atque irritatis fibris, sanguinis affluxum prouocant, refluxum inhibent. Quocirca ruptis ad extremum arteriosis vasculis, venosisque, illa phlogosis excitatur, quæ in pueris, siquidem præ molli- tie partium facile turget, compressa proin Larynge, vel instantaneam aliquandò parit suffocationem; non sic in Adultis, utpotè complexionis robustioris. Consultò itaque solidam Natura comparauit glandulæ *Thyroidææ* constructionem, hinc videlicet, ne aeri exponerentur oua verminosa, indè verò & ne hæc cum ibidem nullo negotio foecundentur, strangulationem iccirco, nec citò, neque frequentè inducerent. At nihilo tamen secius lethalis semper abs me obseruata est *phlogosis* præfata, iungitque assiduò etiám sibi in comitem *notham Pleuritidem* (ut centiès aduerti) ob Pleuræ tunicæ distensionem, ac Pulmonum spasmus, quæ fiunt tali membrana contracta ac vellicata. Quamobrè catharro denique suffocantur egroti, & si in-

inflammatio illa suppurauerit, purulentam
 saniem post fata euomere porrò solent, quæ
 idiotis quidè *Capitis apostema* audit, cum
 tamen ea visa sit ex prædicta glandula erupis-
 se. Coeterùm hæc desultoriè tantùm, atque
 obitèr abs me prolata non ideò hìc insinuan-
 da censui, quòd meam quadantenùs probent
 Conclusionem. Tot enim verbis benignum
Lectorem distinguere impium fuisset in re scili-
 cèt dogmatica, & quæ nulli sic opinandi
 necessitatem imponere præsumit: duntaxat
 vt à *Præcticis* nondùm animaduersa deinceps
 attendantur, & cùm ex ys non tam recta
 pharmaciam administrandi ratio, quàm ve-
 ri saltim *Diagnoseos*, aut *Prognoseos* fontes
 (vndè porrò, absit iactantia dicto, non me-
 diocrem, vtut vanam, genuini Medici æsti-
 mationem mihi conciliaffe scio) in Vermi-
 nosis affectionibus deriuari queant.

Igitur quod Therapœiam [ne itèrùm va-
 na ganniam, aut ab alys iàm effutita] di-
 cam solummodò, quòd inhærendo indi-
 cationibus præfatis, applicui sæpenuerò
 externè remedium aliquod *antelminticum*
 glandulæ *Thyroidææ*, vt folia persicorum
 cum allio & aceto malaxata, petroleum, aut
 aliud, quoduis Rure præsto esse, aut citiùs
 ad

ad manus uenire poterat; ex quò planè mirum, quantam ægri faterentur se percipere alleuiationem. Narrabant scilicèt sensisse se confestim glomum quendam Fauces occupantem descendere ex hac parte atque in Intestina rapi; id quod enemate imposito postea comprobabatur, subductis vermibus quamplurimis simulque conglomeratis. Quæ res est etiàm, cùm Foemine nostrates pueros suos de lumbricis suspectos amuleto illo, aut simile alio, quo eorundem Colla deliniunt, aduersus hæce beluas instruant, aut præmuniunt. Nec immeritò. quandoquidè id properè usurpatum in multis occasionibus profuisse author sum; non ità, si serò, chylosiàm inuersa, sanguine foedata, aut *Thyroidea* glandula abscessu ex phlogosi periclitante. Vt verò curationum, morborumque huiusmodi verminosorum processus aliquis habeatur, subiungam tibi solemnem historiam, quæ, utpotè de casu nupèr [dùm hæc scriberem] mihi oblato, quemadmodum Rationi, ut in immoto persisteret, imperauit, sic propositam quæstionem, siuè connaturalem verminosi seminis in *Thyroidea* glandula existentiam non parùm itidè dilucidabit. Casus autè ille fuit huiusmodi. Tertio Idus

Iuny (si benè diei memini) accitus sum ab Illustrissimo D. Comite de *Priocca*, Dom. in *Castro-in-alto* &c. ad inuisendum eius filium natu minimum, infantem videlicèt duodeviginti mensium, nondùm ablaetatum. Huius igitur statum mōx ab ingressu ad illum sciscitato, retulit Generosus Dom. suspicari se puellum *difficili dentitione* laborare, prētereā verò nihil. Quæ vt accepi, vnā simul pergimus ad Nutricem. Ostendit porrò hęc statim alumnum suum *oculis canis, querulum, facie livida, genis concidentibus, palentem labys, capite, dorso, brachys quasi relaxatis, languidum, tabescentem cum pulsu paruo, febre lenta* &c. Quibus conspectatis, reposui Nobilissimo Parenti, ipsius filium plusquā *difficili dentitione*, vexari insupēr *febre hectica, verminosa*, & ni DEVS rem benè verteret, ipsum ægerrimè euasurum. Haud dedignatus est is sermoni meo statim fidem exhibere (cēu cui aliās cū in alterius filiolli, tum verò maximè in Eximiæ sui ipsius Matris ferè octogenariæ hinc *Tertiana Maligna* indè etiam *Quartana duplici* laborantis felicissimis curationibus summè probatus extiterā) recordatus etiām, quatinūs prēsens Infans vel à primis incunabulis (testibus de hoc

hoc insupèr existentibus Nutrice , Matre, coeterisque Domesticis) insignem quandam totius corporis alterationem singulis Novilunijs pati consueverat, & quæ tunc duobus, nonnunquam etiàm pluribus diebus perseverabat cum *siti maxima, rubedine membrorum* &c. Proptèr quod rogatus quid hìc opus esset? reposui, quòd stantibus *Dentiendi difficultate* præfata, *Abdominis intumescencia ac duritie* aliqua, benè satis quoddam pharmacũ propinari potuisset. Exhibui ergò statim cochlear vnum atque alterum syrussi de Cichor. comp. [eius scilicèt syrussi, quem ad Vermes vnicè commendat *Redus*] ac confestim ij ab Ore exire ceperunt viui, teretes, oblongi, subrubi, numero, ni fallor, nouem, quos deindè Nutrix, imò & ipse-met Infans digitis extrahebat. Postridiè, iterato eiusmodi helmintagogo, Vermes perindè, ac tot, quot antea eiectioni sunt, at cum molestia tamen minori. Quocircà territi Adstantes, & prognosin illam, quam suprà innui, iàm in deteriorem partem accipientes operam meam irritam futuram deprædicabant. Nihilominùs ipse, indicto, vt & ad peiora adhuc spectacula se componerent, de fausto alioquin exitu mecum tacitò gratulabar. Nondū enim aderant signa *novæ fecundationis*

in *Ouario verminoso* : & ni hæc daretur, cœtera facilè vtcùnque expugnatum iri posse existimabam. In quem finem, præscripto cathartico validiori (in quo tamèn syrappus præcitatus, veluti pro base, perpetuò collocabatur) in residentiam meam me recepi, ratus nimirum opus esse duntaxat, vt Vermes alicūdè exturbarentur, vtque experto aliquo remedio *hecticæ feбри* succurreretur. Verùm perendina die nuncius mittitur mali ominis. Cùm autèm Excell. Dom. *Cauda* illius Castri Medicus Ordinarius, quique Nobilissimo Infanti continuò assistebat, absente me nihil vellet innouare, eò propterea reuersus rescui ex eo, quatinus *Ægellus* Noster pridie ex dicto phermaco alios septem lumbricos de more euomuerat, vespere tribus alijs mortuis ex aluo depulsis ; vtque hac ipsa die, qua hæc agebantur, Vermibus in consueta cùm qualitate, tùm & quantitate per superiora eiectis, atque eâdem hora, idest ferè quarta matutina, sub declinium deindè solis *syncopam*, aut animi deliquium [arbitror ego potiùs *Insultum* aliquẽ *Epilepticum*] pertulerit, quo per semiquadrantem horæ pro mortuo habitus est. Ad hæc ergò credidi Vermes nuperrimè generatos fuisse, & cum insu-
pèr

pèr obseruarem in illo adhuc validam *deglutiendi difficultatem, suspiria, languorem, lamentationes, &c.* Ob quam rem porrò totis viribus depræliandum esse censui, & ne talis generatio succederet. Ut verò hæc impederetur, antelminthicis validissimis Collum illiniri, aliquot itidém istorum guttas in Fauces instillari, curavi denique, vt Ene-mata ex lacte semel, aut bis de die impo-nerentur, &c. Neque omissem iterum præ-laudati syrupperi dosin quotidie tradere; sed re-nuit Parens veritus, ne ex eo fortassè ver-minosa syndrome augeretur. Quicquid nihil-ominus post, Vermes numero tres, aut plu-res in dies singulos exsilire è consueta late-bra anguium more non destiterunt adeò, vt octidui spacio plus centum sexaginta indè, hoc est ex Ore eiectioni sint, non computatis qui cominus, siue ex ano suffugerunt. Resci-ui prætereà eò reuersus (ettenim præscriptis, quæ ad antedictam indicationem facere vi-sa fuerant, ad mea denuò me contuleram] quandoquidém primis ab usu eiusmodi re-mediorum diebus Illustrissimus Patiens ad-huc aliquali *Cardialgia* correptus fuerat, fe-bre tamen minus exacerbata. Causa itaque noui mei ad ipsum reditûs non alia extabat,

quàm quòd efflagitaret Parens generosus ,
 vt Vermium prouentus supprimeretur pe-
 nitús atque extingueretur; hoc enim laboris
 exanthlandi adhuc superesse ! Cui tamèn
 optato an facile fuisset respondere, alij vide-
 ant ; cùm nimirùm , Vermium genesis ,
 natura , qualitas , nondùm *Medicis* ritè
 perspecta sit. Quocircá eiusmodi desiderio
 planè subridebat alter Doctor, actionum me-
 arum testis: non sic ego , quòd Vermino-
 farum affectionum indaginem plús milliès
 instituere debueram , cùm incubuisset onus
 plus quàm septem milliùm personarum vale-
 tudini consulendi. Reposui ergò, hàud egrè id
 exequatum iri posse, ea nempè fiducia fretus,
 qua idem aliàs sæpè præstiteram . Ob quam
 causam propinatis mane ac vespere guttis
 quinque , aut sex *Balsami Peruviani* in hau-
 stulo vini oligophori tepidi , mirùm , quàm
 breui euentus exspectationi cessit. Namque
 à tertia potiuncula Verminatio illa, ceu ne-
 bula , discussa est ; serpentillorum eiusmodi
 nemo deinceps est insidiatus: tametsi ex alia
 parte ob talem tantamque vitalium particu-
 larum iacturã tam insignitèr debilitatus fue-
 rat pusio gratiosissimus, vt etiam nùm ambigã,
 an vires sit recuperaturus, quin imò & an diu
 su-

superstes futurus sit. Quandoquidē obseruauit hinc inuerti *concoctionem* jis Infantibus, qui valdoperē verminarunt; hac autē leſa, eosdem futilem constitutionem nanciſci. Iunge communem animaduersionem de iisdem puellis, quam alibi attulimus. Verū quod impræſentiarum est, ideò noueram resistere generationi Vermium præfatum *balſamum*, quia serum sanguinis compeſcit, ne illorum oua foecundatum eat: inque hanc rem porro *Corallia*, *terram sigillatam*, *bolum armenam* & reliqua *adstringentia*, quemadmodum etiā *acida*, *succos citri*, *limonum*, &c. item *amara*, *stiptica* & innumera alia, quæ idem serum valdoperē alterare, aut imutare valent, in malignis febribus [quas potiori iure vocarem Uerminosas, quatinus vermibus nusquā expertes sunt] præcipuè verò in quibuslibet Infantum morbis vtilitèr vsuuenire, ipsa bis mille annorum [quandiū videlicet Medicorum Sacra constare perhibentur] Praxis insinuauit.

Undè nec difficile est porro rationem reddere, proptèrquam pueri, secus Adultos, magis subiacent affectibus verminosis. Quandoquidē nempe, vel iuxta *Galenicos*, maior in illis pituitę copia fomenti loco inferuit,

XIX.
Satisfit
Obiectis
& resp-
ondetur
aliquib-
us quæſi-
tis.

aut masculini feminis, ad ouorum verminorum foecundationem. Quod autem & in nondum à lacte depulsis [vt in puero, cuius ægritudinem modò recitauimus] huiusmodi foecundatio contingat, hoc docere debet opinantes oua illa nobis non esse ingenita. Quid enim? nonnè contrariam sententiam altè menti nostræ infixam esse voluit vel ipse Summus *Medicinae* Dictator *Hippocrates*, quandiù hanc pluribus inculcauit lib. de Morb. *Nunc autem & de lumbricis latis dicam* (inquit) *asserò enim ipsos in puero, dum adhuc in Vtero est, nasci. Postquam enim semel ex Vtero egressus est* [addo istahæc in gratiam Antiquorum] *non tanto tempore stercus in aluo manet, vt ex eius diuturnitate ac putrefactione tantæ magnitudinis animal generari possit: excerni enim semper hesternum stercus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale verò animal nasci non potest* (quod nimirum aduersatur etiàm opinantibus procreari Vermes é semine vnà cum alimentis ingesto] *etiàm si homo multis diebus stercus non egeret: multa enim nascuntur dum puer in Vtero est. Et paulo post. Nascuntur autem, & rotundi lumbrici isthic eodem modo. Signum verò, quòd hæc res ità se habet, hoc est. Postquam*
in

in lucem editi sunt pueri, mulieres ipsis in cibo offerunt medicamenta, quo stercus ex intestino exeat. Et non comburatur, Et simul ut intestinum dilatetur (conseruatur etià nupèr hodièque laudabile hoc institutum potio- nandi recens natos felici sempèr cum succes- su, licèt potiori de causa (Vbi verò, pergit, cibum obtulerunt, multi sanè pueri Et rotundos Et latos lumbricos una cum stercore excernunt.

Quæ quidem verba vtut Hippocrate indigna nuncupet Marinellus, indignum potiùs Me- dici nomine dixerim, quisquis ab illius do- ctrina deflexerit, vbi nulla validior ratio ipsum cogit. Quæres 2. cùr in nostro casu pu- er ille insultus verminosos vel ab ipso exor- tu perferre debuerit. Resp. quia latus nimis, albus, Matre etià fatus erat albâ (vtpote nobilissimæ ex Alderamo familiæ] teneræ nimirum euanidæque constitutionis. Qua- proptèr quæres 3. & quemobrèm comedo- nes pueri, fuluis crinibus, alba cute, atque huiusmodi alij citiùs verminascuntys, qui minùs voraces, graciles, nigri &c. apparent Resp. 1. quod helluones, vt sic dicam; aperiri in his ob Pharingis dilatationē, bolis crassio- ribus minùsque masticatis existentibus in- ductā poros fibrarū eodem è Thyroidea glan- dula

in Com-
ment.

dula definentium sic, vt oua verminosa hinc illecta aut prouocata, veluti quā data porta irruant in Gulam, vbi mōx ab influente, etiā inſitā, hūmiditate turgeſacta in Vermes denique abire debent: quod autē reliquos; ſatis patet diſparitas corporum, ſiue diuerſus in vtriſque habitus ac textura. Sed opponenti circā præſatum vermiſi ſeminis deſcenſum in OEſophagum, non poſſe videlicet hunc accidere proptēr craſſitiem eiufdem ſeminis, nec non præ viarum, per quas denoluitur, anguſtias atque obliquitatē, Reſp. haut itā craſſum ſupponendum eſſe, tale ſemen, cū videamus Bombicinum e. g. [quod tamen ſemen inſecta perhibet iſſis Vermibus longē craſſiora] tenuiſſimum exiſtere, ſinapi granulum plantam edere ſublimem &c. adeoque nihil obſtare quominus Vermes initys vtcūque licet minimis conſtent, perque imperuios, hoc eſt imperceptibiles mæandros dilabantur, Adde, quod huiuſmodi gurguſtia, vtpotē membranosa, cuicunque etiā paulo maiori corpori cedere, ſiue tranſitum permittere apta ſunt. Et rurfus, quod magnitudinem ouorum vermiſorum: hanc vix ſenſibus ſubiectam eſſe, indicabat paruitas Vermiculorum, quos

quos in dicto Ouario conspexeram. Ast re-
geris, plùs, quàm in *Thyroidæa* glandula,
animadueros etiàm alibi fuisse lumbricos,
& præcipuè in sanguine, quod propterea de-
notat germanum Vermium *Ouarium* esse uni-
uersum corpus, vt liquet. Ad quod resp.
obseruationem hanc de Vermibus in sangui-
ne, quam nempè alibi adduximus, qua-
mque athanatos ille *Athanasius Kircherus*
benefificio microscopij nobis non monstra-
uit solùm, sed non vnà descripsit, aut de-
pinxit, præter quamquòd incredibilem
appellat *Simon Pauli*, alijs etiàm valdoperè
suspectam esse, vt *Martino Scockio*, cuius hæc
sunt verba: *Nec tamen putandum est, in feбри-
bus, quæ vocantur putridæ, Sanguinem usque adeo
corrumpi, vt reddatur verminosus, quemadmo-
dum vellet Vir aliàs polimatefatos Athanasius
Kircherus Scrutin. de Peste part. 2. pag. 240.
ubi non dubitat profiteri, se obseruasse sangui-
nem per venæ sectionem febricitantibus subdu-
ctum, vnà aut alterà horà post emissionem ple-
num Vermibus, detegente illos scilicet microscopio;
quod vt res exiles facit grandescere, ità
grandior species, iuxtà quam visui se se res mi-
nutæ perhibent, sæpè iuxtà analogiam duntaxat
explicanda est: adeoque mox non debent haberi*

*D'gress. de
Febr. Ma-
lign.*

*Tract. de
Ferment.*

vermes, quæ interueniente vitreo instrumento illorum speciem referre videntur, &c. Vtut ergo (concludit sic deindè Mathias Tilingius) microscopia nobis inseruiant ad multos præclaros usus, tamen sine ullo partium studio falsò eadem nobis representare in sanguine humano vermes omninò nobis persuademus, ob varias modo dicti salis volatilis figuras, hispidi hirsuti, setosi, sabulosi, cubiformis &c. adeò ferè teneri, ut omnem sensus captum eludat, & quod maximum pro nobis argumentum, quòd una, aut altera hora post missionem sanguinis demùm se in conspectum det beneficio microscopij. Nàm longè rationi congruentius est defendere sal in superficie sanguinis humani roris vel pruina instar, ubi is nempe sanguis perfrixerit, & efflorescens minutulos vermiculos falsò representare, quàm astruere, modò descriptum sal volatile vel viuos, vel mortuos esse vermes. Usque ergò dùm quis non obseruauerit imaginarios illos vermes, loco, & quidè spontaneo, voluntario aut proprio motu moueri, ut cyrones ex cute exsculpti scabie infestatarum manuum pedumue super nitidissimo speculo errant, nulla ratione induci possumus, ut putemus febricitantium sanguinem totum ordinariè vermibus scate-re. Interim tamen [subiungam hæc iterùm
ex

ex eodem *Scockio*] non sum vsque adeò incredulus, vt fidem derogem illis, qui subindè vena secta vnà cum sanguine prorepfisse vermes perhibuerunt. Videatur *Borellus loc. alibi citat.* Sed vt hoc referri debet ad rarò contingentia, ità resp. 2. quòd in tali casu putandum est illos vermes ouis prognatos fuisse è *Tyroidæa* glandula dilapsis, & quæ porrò chyli motu obsecundato in lacteas *Asellij* venas, subindèque in sanguinẽ intrusi fuerint; vbi, vel alibi post exclusa, vermes produxerit maiores vel minores, prout hi magis minùsue eòdem chylo fuerint enutriti. Hoc etiàm pacto oriuntur lumbrici, quotquot in Hepate, Pericardio, Corde &c. sub conspectum cadunt. Quæ res est profectò, vt vniuersum corpus minùs rectè [nisi metaforicè fortassis] pro genuina Vermium Matrice, idest Ouario deputetur. Mitto circum, qui in hac sententia cõmitteretur, aliaque argumenta, quæ abs *Vallisniro* contrà alios, quæque abs me aduersùs istum in superioribus adducta sunt. Replicabis iccirco, si *Tyroidæa* glandula verum esset *Ovarium verminosum*, lumbrici humani omnes solius cuiusdam speciei forent: quod cùm falsum sit, & eorum alij *lati*, alij *cucurbitini*, *ascarides* &c.

spectentur, venit concludendum eosdem diuersam originem agnoscere. Resp. dari & inter homines monstra, vt quorum alij pygmoei alij Cilones Strabones, Silones, Loripodes, Scauri, Panfæ &c. vocitantur; vtque singuli hi homines sunt eodē specie vtero egressi, sic lumbrici, qui deformitatem aliquam fuerint fortiti. Et sanè rari sunt *Cucurbitini*, fasciæ, seu lati lumbrici; *Ascarides* plerunque in pueris obseruantur: coeteri, si demas *Teretes*, nec nomen habent. Huius ergò differentiæ causam si quæris, præsto est dicere cum *Broe-*
nto, quòd *illorum diuersa figura, magnitudo &c. dependent maximam partem ex diuerso nutrimento, quod in diuersis animantium partibus inueniunt* sic nempè, vt *Ascarides* extremum Intestinum incolere dicuntur, & *Lati* Illa vniuersa. Verùm, quatinus vermes [quosuis in *Thyroidæa* glandula obseruaui] erant *teretes*, siuè rotondi, eatinus porrò censeo germanam hanc esse lumbricorum figuram, reliquas autem præternaturales, uel adscititias. Rogabis denique, cù in homine duntaxat oua, in Cane verò, atque in alys animalibus etiàm vermes consistant in glandulis OEsophagoeis? Resp. quia animalium quorūcunque diuersum est institutum, ac dispar viuendi

in Not.
ad Prax.
M.d.Hen.
Reg.Medi
33. lib.3

viuendi ratio . Quamobrè & vnaqueque species suis peculiaribus gaudet vermibus , idest specie inter se omninò diuersis . Cùm igitur Cani e. g. ad ossa in chylum conuertenda , viteque principium eidem chylo inspiciendum sufficere minimè potuerint oua verminosa , factum est proindè , vt Omniscius ille rerum omnium Architectus , Deus Vermes insupèr illi concefferit , qui dùm in cryptis suis , hoc est glandulis OEsophagoëis morarentur , nullatenùs ei noxy forent ; non sic homini , vtpotè alimenta millenis modis sibi condire gnaro & specialis uitalitatis indigo , quæ à Vermibus haberi non potuisset . Coeterò uitalitatem hanc aliundè , quàm ex proprio mechanicismo expectandam esse , docent animalia inferiora quamplurima , quæ uitam extrà se , atque ab alys adhuc uilioribus præstolantur . Sic serpentes nonnulli rube-tas uiuas deglutiunt , quas deindè fracto à Nobis carcere uidimus effugisse . Narrauit etiàm Venator fide dignus anguem se in insidys expectasse , à quo buffonem uiuum pridè deprædatum aduerterat ; sed cùm re infecta abire exindè coactus fuisset , postera die rediisse ; in quâ denique voti compos factus , exentratoque angue , buffonem adhuc

palpitantem, neque vllatenús læsum extra-
xerit. Aranæ etiàm muscis uescuntur, ut-
que uitale principium ab ijs meliùs hauriant,
cirris suis irritant ac flagellant. Sic denique
Catus mures concutit ac fatigat &c. . Sed
ad rem. Quandoquidém ergò in hoc syste-
mate claré, ni fallor, satis dilucidari possunt
accidentia, quælibet uermes concernunt,
idipsum proptereà hoc etiam titulo ample-
ctendum fuit, dicendumque, existere na-
turalitèr in *Thyroidæa* glandula illorum,
nempè Vermium, oua, esêque ipsa hæc,
unde alimentorum in chylum conuersio,
istiufque uitalitas pendent.

XX.
Vndé cō-
cluditur
nihil de-
esse hu-
mori gl-
andularū
conгло-
merata-
rum OE-
sophagi
ad veri
fermenti
digestiui
rationem

XXI.
Probatur
5. hæc cō-
clusio à
simili.

Quæ cùm ità sint, cùmque ouorum uer-
minosorum actio in cibos refundatur ad eum
modum, quo & reliquarum OE-sophagi glan-
dularum recrementa, liquet abbundè nihil
deesse ys, quominús uerum *fermentum digesti-
uum* constituent, siuè tale, ut edulia quælibet de-
glutita soluat, solutaque in *chylum*, idoneū
scilicet hominis nutrimentum, transmutet.

Verùm, vt hoc adhuc ulteriùs pateat,
imò & ne alicuius palato nouitatem sapiat
libamen istud, siuè assertio, uenit inuesti-
gandum, an nouum similiter in Naturæ
censu sit, ut digestiuum menstruum ab OE-

ſophago euocetur. Iàm adduximus ſuperi-
ùs teſtimonium Expertiſſimi *Franciſci Redi*,
quo quamplurimę glandulę ad OEſophagum
quarundam Auicularum indicate ſunt, quę
tali menſtruo plorabant adeò, vt idem,
propemodum & in reliquis eiufmodi anima-
libus euenire denique faſſus ſit Vir ſuprà om-
nem laudem poſitus: Nunc & qualiter de-
prehenderim talem ſuccum ex eadem parte
in alyſ beſtys prouenire, paucis expediam.

Princeps lumentorum Canis hoc nomine
haudquaquam dignandus eſſet, niſi cœteris
claiſſis eiufmodi belluis virtute meritòque
pręcelleret. Vigilantiâ etenim nulli par, ob-
bedientiâ in hominem tanta pollet, vt ne
latum quidẽm, vt aiunt, vnguẽ ab eiufdem
imperio nutũue recedere audeat, gnarus pro-
in infidiantibus adlatrare, aggredientes im-
petere, mordẽre, hinc indẽ excurrere, om-
nia percuntari, attendere, inueſtigare, vt-
que tandẽm *iuvamenti* omen omne contineat
in ſe atque exequatur, hero ſuo vel alimo-
niam ipſam comparare. Atque in hunc qui-
dẽm finem ſolus venari didicit, ſolus feras
indagare, perſequi, aſſequi, tenẽre, conſer-
uare vbique porrò ſagax, impavidus, inten-
tus, aſſidvus ſempẽr. Quid plura? adiecta
de-

XXIJ.
In Cane.

dēmum, quasi superpondium, est hæc utilitas ex Cane, vt nempè, postquam homini diu assentatus, diu adblanditus fuerit: postquam indè eiusdem emolumento inhiauerit, opibus inuigilauerit, ingluuiem expleuerit, voluptatem satiarit, quum denique aliorum iumentorum nullus amplius vsus est, illius porrò incipiat esse maximus. Siquidem planè in Theatrum Anatomicum inductus [ne videlicèt ignobilitèr periret tam nobile animal] Magistrum statuit se se doctissimis Spectatoribus, dumquè præda istorum fit, eodem vicissim prædatur ac venatum ducit. Et sanè inuersa propemodùm lege venationis [vt nempè ibidèm Canis ac Venatoris officia etiàm permutantur] non is ampliùs odorat, niçtit, incurrit: verùm clauso rictu ligatis artubus, ventre velut ad haruspicianam composito, linoquit vt experiantur, inuestigent, clamitent aly. Iámque adeò carpitur ac laniatur Canis, colliguntque ex hinc Anatomici novum aureum vellus, id est *notitiam sui*: planè scilicèt, vt cum inter bruta idem rationis capax magis si, sic & ad hominis constitutionem magis accedat. Quæ cum itá sint se ipsum in illo inuenire, hominem, inquam, in Cane lustrari dicendum

dum est, atque ex hoc porrò Anatomen cumulatam, veriùs dictatam fuisse. Sic enim & in tali libro Lacteas venas legit *Asellius*, chyli Receptacula *Pecquetus*, quorum deinde indicio consimilia in homine reperta sunt ad maximam ipsius vtilitatem, *Medicinæ* gloriam atque ornamentū &c. Mihi verò (vt ad rem tandè redeam) quod secùs quàm in Cane, innotuerant aliquandò in homine Conglomeratę glandulę præfatę, à quibus nimirum vtrumque mēstrum tam solutivum, quàm alimentorum transmutativum ducitur in OEsophagum, onus propterea incumbere visum est, vt qualiter hæc & in illo haberentur minimè præteriret. Ob quam rem Trachæam, Pulmonem, OEsophagum verbo Thoracem vniuersum interiùs atque in eodem Cane nonnunquàm etiàm rimatus cùm vidissem deindè rem respectu glandularum prædictarum heic longè aliter se habere, quærebam causam huiusmodi ablusionis. Sed patuit hæc vltrò, attento quòd diuersus esse debet vtriusque animalis chylus, hic videlicet homini nutriendo par, ille autèm Cani. Atque adeò in isto animaduersum est abesse imprimis glandulam *Thyroidæam*: tùm alias *Tracheales* abs Nobis in-

digetatas, quæque tergeminae sunt, atque innumeræ circa Mediaſtinum conſpiciuntur; rurſumq; alias *Dorſales*, vt & glandulas *primæ di-
viſionis* *Aſperæ arteriæ*, *Bronchiales*, *Gaſtricas* &c: adefſe verò loco iſtarum, atque ad OEſophagum, è media uſque ad imam partem glandulas quafdam, vt ſic dicam moſtroſas aut inſuetas, quæ vel omnes omninò extrà eundem OEſophagum prominebant, vel partiatiſſimè tantùm, vel denique vniuerſim etiàm in ipſius viſceris ſubſtantiam erant abſconditæ, numero plerùmque tres, interdùm plures, ad ſummum autèm ſex. At quùm ternarium excedeabant, ficvum figuram reſentabant, rotundarum verò duritatum & quas ferè exoſtoſes dixiſſes, quùm pauciores numerabantur. Quod materiã; videbantur penitùs carthilaginofæ, tales nempè, vt cultello ægerrimè ſcinderentur, conſtabantque ſingulæ ipſis tunicis OEſophagoëis vnà, præter *externam*, in talem materiam induratis: quæ nihilominùs tandèm abſciſſæ, compertæ ſunt veras non eſſe glandulas, ſiue quæ alyſ minimulis glandulis ſimul congregatiſſimè compingerentur; Sed capſulas eſſe quafdam carthilagineas, ſpiſſas, internè cauas inſtar ſpecvum, plurimiſque fornicibus in-
qua-

qualibus cameratas, quas pilæ variæ informes fulciebāt distinguebantque. Stillabat præterea vndequaque in illas aqueus limpidusque succus, qui tamen post, mixtione cum Vermibus eiusmodi cryptas incolentibus, in limosum, siue flavum mutabatur. Aderant namque insuper ubique circa illas pilas, salebrasque, lumbrici teretes rufi parui, atque ab humanis longè absimiles, qui porro humori eiusmodi innatabant vnà cum ipsorum semine, quod nonnunquam visum est minimis pulueris pyry granulis assimilari, eademque fermè mucilagine obduci, quâ & ranarum oua. Postremò hiscebant eæ glandulæ orificio quodam instar aperturæ marsupiorum, quæ scilicet minús exactè conclusæ; idque porro abindè in OEsophagum peruium spectabatur, non ità, si secus setam inrudisses: cum verò constrictorys, siue musculosis fibris, more sphincterū, minimè donaretur idem orificium, exitum proin semper humori illi flauo supradicto concedebat. Atque hinc planè cū perpetua Canum appetentia sequatur, *humor istorum digestivus* aliundè in cassum deriuabitur. His ergo sic consideratis, nullo negotio inductus sum ad credendum Vermes, aut istorum oua requiri ad

cibos in verum chylum *transformandos*, succumque ipsorum *solutivum* ab OEsophagœis glandulis vtcunque petendum esse.

XXIIJ.
Sue

Hanc posteriorem effati nostri partem fulcit hæc altera observatio. Ipse namque in Sue observavi aliquot conglomeratas glandulas Dorso Ventriculi incumbere, nonnihil versus Pylorum, numero quatuor, quinque sex, nonnunquam etiam plures: crassitie fabam æmulantes, figuræ lenticularis, coloris denique ad liuiditatem vergentis. Licet autem propter circumfusam pinguedinem texturamque obindè laceratu facilem ipsarum emunctoria toto ductu persequi non valuerim, inuento tamen copioso eodemque flauo succo, qui ab ysdem glandulis atque intrâ vtramque Ventriculi tunicam in inferiorem istius-met Ventriculi regionem terminabatur, non ineptum fuit colligere talem fontem ab eiusmodi laticibus exfilire. Meminit eiusce rivuli ante me ipse etiam *Malpighius*, ut qui ita loquitur. *Color eius* (hoc est Ventriculi porcini) *varius est. nam in parte propè os superius sub albus est, sicut & in parte superiori horizontali; reliquum colorem rubiginosum refert, & circa pylorum interdum aspersa bile flavescit.* Verum enim verò non esse bilem, quod

quod é prædictis scaturit adenis, hoc ex viarum, per quas idem labitur, obseruatione iam patefactum est; remanet itaque, vt dicamus humorem esse illum alimentorum fermentativum, quemadmodum ex loco, in quẽ definit, abundè probari potest. Etenim illic Venter spissioribus, crassioribusque, quàm alibi, rugis scatet [vt nimirum ibidem cum suo menstruo esca diutiùs ferietur, sicuti & ob consimilem rationem locus ciborum solutionis in Boue est Omasum, siue Echinus, aut sinus ventris interior cancellatus.] Sed dicet interiorum dictarum glandularum substantiam albam liquore etiàm candido, ac tantum leuitè falso scatere. quò fiat igitur vt hic deindè statim ab exitu in flavum, degeneret? Resp. hoc diu meum animum torfisse, neque demùm aliam huiusce phœnomeni causam assignare potuisse, quàm, quòd salia eiusmodi floris post egressum præfatum areas fortiantur diuersas ab antè occupatis: hinc enim, & luminis globulos secus, quàm dudum ab eisdem salibus reflecti debere: quæ scilicet ratio ipsa est eadem, quam alibi redidimus quòad apparentiam vasculorum ab Oesophagœis glandulis prodeuntium in homine, & quæ, nempe

pè excernicula, ceù croceo colore delibuta, venas proindé simulabant.

XXIV.
Vitulo

Denique in Vitulis, præter Conglomeratas, de quibus alio loco, videre est adhuc alias eiusdem generis glandulas sed maiores quæ itè in Omasum. Adstant autem hæ à parte eiusdem posteriori tres plerumque numero, humanisque Renibus crafitie similes, vt & figurâ, quamvis colore non ita: habentque suos excretorios ductus, qui albidum falsumque succum in idem deferunt Omasum. Sed quid de his plura commemoro? Si autopsiam consulant, vix dubito, quin refractariæ quævis ceruices, *Dialecticotoni* &c. huic sententiæ subscribant, *humoremque* alimentorum *digestivum* in plerisque animalibus aliundè, quàm è Conglobatis Ventriculi glandulis prouenire tandem admittant.

XXV.
Explican-
tur phœ-
nomena
Digestionē
concer-
nentia, &
1. Fames

Quo non obstante libet ulterius animaduvertere, an posito, quod talis liquor in homine ab OEsophagoëis glandulis eructetur, accidentia porrò, quibus Naturalis facultas ex eo interdum læsa spectatur, ritè explicari queant: quod tamen in tali hypothesisi tam benè succedurum reor, vt etiamnum teneam contrà sentientes exin' facilè confusum iri.

Jd

Id itaque ut, experiar explicetur v. g. *Fames*
 Hanc Philologi deffiniunt, quòd sit. Molesta
 sensatio vellicationis in Ventriculo orta ab
 acido quodam fermentatiuo, quod in ab-
 sentia ciborum dentes suos infigit in Stoma-
 chum, ac præsertim in eius orificiũ superius
 Verum, i. *Famis* sedem non esse Ventricu-
 lum, aut aliquam ex ipsius partibus, docet
 abundè ea consideratio, qua perspicuum est
 irritari non posse *Nerveam* Ventriculi, aut
 sinistri eiusdem orificy membranam, absque
 quòd Vomitus, ad minimum Nausea, vel
 Cardialgia sequatur. Quandoquidem scilicet
embesis non aliter porro excitatur. Prætereà
 verò, si alimenta (verba sunt Insignissimi
Uulpini) nedum visa, & olfacta, sed ore tenus
 prolata, salivam, ut constat, in faucibus moue-
 re, quod idem ac appetentiam excitare commu-
 nitè solent, cùr tam nobile munus, fluenti ma-
 chine instaurandæ tantoperè necessarium, ubi
 liqua etiàm ad melius esse sensuum organa
 in capite locantur, si pro faucibus (addo ego &
Oesophagum) tot militant argumenta, ad vi-
 lissimæ culinae fores latrabit? tantòque magis cum
 extremis in inædys, syncope lypothimia, deliquys
 alysq; exsolutionibus, gutta una, aut altera
 spirituosì liquoris faucibus instillata, imò narri-
 bus

Spasmo-
 log. Pag.
 177.

bus illita, absque eo quod os Ventriculi appellat dictum factum languentes suscitatur, & fouet.
2. si acidum illud fermentativum descenderet iugiter in Venter, sicuti interius huiusce inuolucrum ab illo assidue stimularetur, ita & ut *Fames* perpetuo vrgeret necessum esset, quod est contra experientiam. Dicere autem, quod acidum illud eodem influat, tempore duntaxat nutritionis, hoc omnino licentiosum dixerim, quatinus scilicet propellitur continuo ad predictae tunice glandulas arteriosus ille latex, qui pro acido Ventriculi habetur, neque in ipsis desuper tantum capacitatis est, ut hoc ad tempus ibidem asseruari queat. Adde, quae alibi attulimus de falsa eiusmodi *acidi* existentia, quaeque de palpabili talis hypoteseos vanitate. Quamobrè, ut quod, ego de *Famis* essentia teneo, paucis exponam, eam sic describam, quod nempe sit *Molesta sensatio vellicationis in faucibus & Oesophago orta ab humore praesertim glandularum huiusce conglomeratarum, qui in pastu exhaustus, atque ab hoc iterum post aliquot horas illic coacervatus, ubi mox turgente copia in eandem Gulam fluere incipit, salinis suis spiculis Nervum ipsius tunicam feriat, atque absumi denuo exposcat.* An

autem hoc rectè dictum sit, nec-nè, attendatur imprimis oblectamentum illud, quod in ciborum assumptione Famelici experiuntur. Hoc enim, quatinus non in Ventriculo, sed in OEsophago perſentitur, ex abrasione ſcilicet illius ſucci, qui interiorem iſtius tunicam vellicat, decidere ſufficienter po- teſt, quòd ſi ipſius oblectamenti ſedes Gula eſt, quidni etiàm *Famis*, ſeu *moleſta ſenſationis*? Prætereà, quoniam maiorem in- uenire eſt in OEsophago eo ſucco aptitudi- nem ad moleſtiam illam inducendam, quàm in quocunque alio, fruſtrà proin *Famis* cau- ſam repetis ex Ventriculo. Non abnuo ta- men, quominus in hoc interdum cibi reli- quijs vacuo collectus idem ſuccus ibi etiàm infeſtus eſſe queat, vt nempè in *Cholera* mor- bo, in *Vomitu* &c. Verùm quòd *Famem*, hanc ibidèm nunquàm orituram crederem. Uetat enim hoc deſupèr *Vvilofa Cruſta*, quæ in Ventriculo craſſa, ſubtilis autèm in OE- ſophago ſpectatur planè, vt & exhinc cogno- ſcere queas, vtrum in *Famis* ſedem elligere debeas. Quid enim aduerſus tam firmũ ſcutũ valeant imbellia iacula? E contrà verò OEſo- phagum leui tantum, quaſi lanugine Natura intus obduxit, ne membranæ *Nervofæ* pru-
K k ritus

ritus tam ad Vitam necessarius [vtpotè nem-
pè ex quo Homo viuere sese identidèm re-
cordatur] porrò impediretur. Postremò,
quìa ex allata descriptione satis, meo vi-
deri, percipitur, cùr abeat, ac recurrat *Fames*.
Recedit nimirùm hæc, quandò liquor glan-
dularum Conglomeratarum OEsophagi ab
alimentis abstergitur, vnàque abindè per cō-
petentem *Deglutitionem* exanthlatur: redit
autèm, eòdem liquido in eisdem glandulis
recolleto, ac præ copia foràs, vt sic dicam,
ebulliente, id videlicèt, quod quatuor, quin-
que, aut sex &c. horarum interuallo à pastu
contingit. Ad hæc, obseruo quosdam nullo
non tempore inappetentes, & qui nihilomi-
nùs intèr edendum esuriunt planè: quod
quidèm non aliò refundi potest, quàm in di-
ctas glandulas pigrè admodùm secernentes,
& quarum iccirco recrementum non, nisi
diutina prolectione obtineri potest; vt verò
exire inchoauit, sequente *musculosa* tuni-
cæ actione, faciliùs prodit. Aduerto itèm ali-
os esurie percitos, bolis tamen vix quinque
voratis, ampliùs non appetere, proptèr vi-
delicèt idem recrementum, quod in glandu-
lis diù moratum, vt vrina in Vesica, magis
falsum euadit: non sic, quod postea succedit,
vt-

poté naturâ ferofum.

Sequerentur explicanda adhuc plurima phœnomena, quæ ab alyis diuerfisq; eiusdem recrementi conditionibus proueniunt, niſi interpellaret me *Sitis* [tot nimirum blateratis nugis] quæ principem, poſt Appetentiam, locum ſibi concedi poſtulat. Huic itaque vt mos geratur, dicam *Sitim* excitari cum alibi, tum ſpecialitèr in Oeſophago, abſumpto hic à cibis, veluti per ſpongiam, humido, quod hinc ab arterys, indè verò è glandulis *Iugularibus* emanat, vt vnicuique in propatulo eſſe poteſt.

XXVI.
Sitis.

Quapropter redeundo ad fermentum ſupradictum atque ad ea incomoda, quæ ab eodem ipſo præternaturalitèr affecto gignuntur, confidera 3. *Bulimum*, ſeu Magnam Famem [ita nempe, vt ægri ob *nimiam Famem* Deliquium animi patiantur.] Adſcribi is vulgo ſolet liquori cuidam corroſiuo in Stomacho reſidenti, atque huius orificium finiſtrum inſignitèr mordicanti : in quo tamen latet manifeſta contradicção. Quid enim ? aliquid in *Ventriculo reſidebit*, atque interim *ſuperius eiusdem orificium vellicabit* ! Si propterea re-geris, iaculari huc aliquandò poſſe à Flatibus e. g. corpuscula complura volatilia, quæ

XXVIJ
Morbi.

aliquandò inter fermentandum in Ventriculo ab alimentorum massa fuerint separata, non habebis me repugnantem. Neque enim ignarus sum idem in *flatulentia hypocondriaca* sæpissimè accidere, *Nausea* nimirum, & nonnunquàm etiàm *Cardialgia* ob eadem miasmata sursum per *Ructus* eleuata contingere sæpè compertis: verùm in *Bulimo*, quemadmodum non sunt hi *flatus*, sic nescio quidnam sales illos *corrosiuos* in superius Ventriculi orificium sit impacturum. Obstat enim prætereà salium eiusmodi euaporationi ipse saltim ciborum descensus in Ventriculum, & nihilominus tamen tali imprimis tempore animo linqvunt ægri. Rursùm *Bulimus* constans affectio est: talis autèm, quasi effusio, diutina esse non potest. Quamobrèm Rationi magis consentaneum existimarem dicere quod eiusmodi passio à *corrosiuo* quidèm aliquo succo procedat, sed qui abs *Oesophagoeis* glandulis sequestretur: adeoque hinc è forti *Nervosa* tunicæ in Gula veluti lincinatione *Magnam Famem*; in superiori autèm Ventriculi orificio *Defectum animi* ob eandem causam debere contingere 4. Multo minús culpanda est eadem *lymphæ Gastrica* in *Fame Canina*, *Nausea*, vti & in

Soda

Soda, quatinus uempè sinistri totiès nomi-
nati orificij potiùs, quàm ipsius-met Ven-
triculi passiones sunt: quarum propterea
causam si in prauam salium humoris *nostri*
digestiui constitutionem retorqueas, ipse pro-
piùs rem attinges. Peculiare paritèr eiusmodi
fermenti vitium supponunt 5. *Pica & Ma-*
lacia, consistitque id in speciali configura-
tione salium componentium aliquem ex ys,
qui succi labuntur in OEsophagum à glan-
dulis huiusce visceris Conglomeratis; si vide-
licet eiusmodi configuratio analoga sit confi-
gurationi particularum, quæ res præter na-
turam expetitas constitvunt sic, vt dùm salia
talis humoris descendunt per OEsophagum,
rerum istiusmodi caracter imprimatur fibris
Nerveis: ex quâ postea impressione feratur
animus ad easdem appetendas. 6. adhuc aliã
fermenti digestiui, siue eius, quod sic nominaui-
mus, idest OEsophagoei succi, malitiã parentẽ
agnoscunt *Inflatio Ventriculi, Ructus, Crudita-*
tes cum acida, tùm nidorosa, Vomitus, Cholera sic-
ca Hypochondriacorum; eaque siue *originaria*, à
prava glandularũ, vnde idem menstrvũ ori-
tur, constitutione contracta, siue *adscititia*, in
ipso-met Ventriculo à rebus vna cum eodem
menstruo admixtis, nec ritè cõgruentibus ge-

ta ; quam tamen malitiam , hoc est peculia-
rem in vnoquouis morborum eiusmodi [vt
& in alys *Chylosin* adhuc concernentibus ,
Bradipepsia nimirum , *Apepsia* &c.] salium
partiumque laudati succi characterem descri-
bere non est huius loci . Sufficiat igitur hæc
vel summis , vt aiunt , naribus olfecisse , quo
positionum mearum Veritas magis splen-
descat.

XXVIIJ.
Remedio
rum Sto-
machico-
rū actio.

Atque vt Therapia denique eodem pari-
tèr conferatur ; docuit quotidiana praxis ,
in modò scriptis egritudinibus *Martialia*
medicamenta in debita cum præparatione
tùm & coniugatione administrata reliquis
palmam præripere . Cùm autem hoc ? Respon-
dent nonnulli , quòd virtute illorum inci-
sua Mesenterij , atque aliorum Viscerum
glandulæ [: quarum obstructions statvunt
in causa esse Ventriculi malè affecti] ab in-
farctu , & sarcinâ sua , quasi gypsea , libe-
rentur . Sed , præterquamquòd videre est
aliquos *inappetentia* laborantes , & quorum
tamen viscera nullatenus obstructa sunt ,
refragatur ys insupèr hæc altera observa-
tio . Ipse scilicèt noui plures , quibus appe-
titus vel à longo tempore deiectus triduoano
Martis vsu fuit restitutus . Vndè verò tam
cita

cita fanatio, si *Mesenterij* glandule fuissent obstructæ? Excipis porro non esse conglomeratas Pancreatis, *Mesenterij* &c. quæ glandulæ in tali casu obstructæ fuerint; sed Ventriculi glandulas miliares, siue conglobatas Resp. hoc gratis dici, quatinus huiusmodi glandulæ non, nisi à frigore, ut à potu niuato e. g. obstrui possunt, planè, ut & cutaneæ corporis glandule, quarum succus abs nitro aereo coagulatur. Demus nihilominus illas sic fuisse constipatas; nonnè tamen citius Diaphoreticis, quàm chalybeatis pharmacis fuissent referandæ? Ad hæc propterea aly cum *Helmontio*, *Tachenio* ac propè vniuerso Chymicorum Choro perhibent *Martis* usum intantum prodesse in morbis à *Chylificatione* lesa, inquantum quòd alkalicæ eiusdem moleculæ *acidum* Ventriculi absorbent. Ast contrà reputando, si *acidum* Ventriculi [per illos] iuuat *Chylificationem*, cur remedys esset absumendum? Etsi autem quantitate fortè peccaret, nonné idem per emetica veriùs, quàm per incisiva, aut aperitiua medicamina posset euacuari? Mallem itaque autumare, *Martis* vim ferri in sanguinem, cuius deindè principia minùs vnita, minusque salis suppeditantia in
Glan-

Glandulas OEsophagi Conglomeratas, feri autem magis, præfatis affectionibus velut ansam præbeant: quæ nihilominus post, operante stiptica *Martis* natura, seu corpuscularitate, reductâque ad congruentem crasin vniuersa massa, remittantur protinus, debito nimirum fermento prædictis glandulis restituto. Quam quidem rem ita profecto se habere ostendit mihi hæc nupera observatio. Quatinus videlicet comperi, quotquot iam sæpè memoratis infirmitatibus tenebantur, citius, aut tardius curari, prout nempè minora, vel maiora eiusmodi discrasie signa apparuissent. Et quod sanguinem; vidimus dudum eum, qui in toties nominati fermenti materiam abit, è puriore fonte manare hoc est ex Corde, à quo scilicet in *Bronchiales*, *Mediastinas*, *Celiacasque* arterias [quibus OEsophagi glandulæ allvuntur] immediate transcurrit: id profecto, quod me etiam induxit ad opinandum, glandularum huiusmodi succum ideò fermentativum esse debere. Secus enim, quorsum talis deriuatio? et si eedem glandulæ lympham colligere, aut alio quopiam ignobili munere fungi debuissent? Infero prætereà exindè, quòd tale fermentum summè activum, summèque mobile,

bile esse debet, quatinus scilicet hinc nitrum aereum, quod in Pulmonum vesiculis se se sanguini incorporavit, nondum de acutie sua quidquam remisit, inde verò sanguis sumptum à Corde motum per breuem illum tractum, qui ab hoc ad glandulas iam citatas intercedit, oppidò conseruare valet. Sed iuxta hanc talis menstrui originem aduerto rursus odora corpora, etiam non vesca, appetitum inducere. Hoc autem ego non aliò retorquendum putarim, quàm in miasmata eorundem corporum volatilia, quæ in Pulmonem introducta vti sanguinem attenuant, huncque postea in Cor atque in arterias supradictas solito citatiore cursu impellunt, ita humorem OEsophagi ad exitum è suis glandulis illiciant. Obseruo itidem ad hunc modum instigari Famem ab aere puriore, vt Matutino e. g., à lætitia quòque & gaudio alyisque rebus motum sanguinis sollicitantibus, sicuti è conuerso minuitur eadem ab aura minus temperata, idest paulo crassiore, atque humida: item à mærore, tristitia, metu, iracundia similiibusq; quotquot nimirum pathemata, vel respirationē cohibendo, vel alio quocunque modo sanguinem afficiendo, istius motum remorantur, atque ab OEsoph-

phago, siuè ab huius glandulis abstrahunt. Coeterùm, quod *Stomachica* nuncupata medicamenta : hæc, quandoquidèm plerúnque amara, falsa, aut potiús vrinosa, atque acria, seù aromatica existunt, patet ratio, proptèr quam Ventriculo amica sunt, ac *Digestionem* iuvant. Cum etenim analoga sint *fermento digestivo* [quod scilicèt falsum comperimus, subamarum, atque vrinosum] ciborum fermentationem non procurare, Ventriculi fordes non abstergere, cruditates non attenuare nequeunt. Iàmque adeò ipse sententiam meam vndequàque confirmatam video, ac talitèr, vt obices illi non formidandi sint, in quos hætenús impegerunt, quotquot tandiù decantatum Ventriculi *acidum* quòcunque intrudere, atque extollere perrexerunt.


Acidum fanè bilem mouens, Veritatis larvâ, secùs quàm facie tumens, & quid? si reliqua eiusdem probra singillatim persequi liceret! Sufficiat igitúr demonstrasse, non existere in Humano corpore tale *acidum* Chylificativum, quo porrò consequentiæ ex eiusmodi positione hucusque diductæ meritum iudicium subeant. *Semel enim falsum semper est falsum*, ex vetusta Philosophorum sanctione: siuè, *cùm falsum est, quod præcedit, falsum*

falsum etiã est, quod consequitur; Et rursus, cum falsum est, quod consequitur, necesse est, ut falsum sit, quod præcedit: quæ regula est D. Augustini.

Falsitas autem eius opinionis (quâ nempè lymphæ Ventriculi *acida* prætenditur à plerisque in causam alimentorum Digestionis) tam quod antecedentia quàm quod consequentia luculentissimè, ni fallor, ex dictis euinci potest.

*l. 2. de
Doct. Ch-
rist. c. 32.*





Epilogus, seu Conclusio.

I.
Ergo li-
quor gl-
andularū
OEsoph-
agi verū
est ferm-
entum di-
gestivum

JTaque collige *Fermentum* verum *Digestivum* abs vno *OEsophago* humore manendum esse, & cum ex hac hypothesis præsertim ritè intelligatur quamobrēm *Stomachica* vocata medicamenta eiusmodi nomine dignanda sint, & quomodò *Chilosis* plerūque labefactetur. Deindé, qualiter *Sitis*, *Fames*, & quamplurima huius pedisequa accidentia pangantur, & rursū cūr *comparatiuè ad Bruta* succi *chylificatiui* scaturigo scorsū à Ventrículo, idest in *OEsophago*, ut plurimū auguretur &c. Hæc namque genuinos laudati menstrui titulos contestari debere.

II.
Et est du-
plex

Ulteriùs; ambigua vox *Fermentum*: huius ergò significationem aliquanto certiùs exponendā fuisse; quæ in nostro casu non tam *solutionem*, quàm ipforum-met alimentorum in aliam materiam *conuersionem* importare videbatur. Quatinùs *chylus* quidpiam est aliud ab alimentis quantumvis fuis, aut aliquo quocunque modo liquatis. Cū igitur *liquor OEsophagi* supradictus vtrum-
que

que illud præstare posse visus sit quidni proin ambivisset *fermenti digestivi* dignitatem?

Etenim ex vna parte *salsus* glebulis etiã pollet talis humor, quarum aliæ integran-
tes *analogæ* sunt poris ciborum assumptorũ; aliæ verò essentielles eisdem poris penitus *incumpetentes*: Vt verò ex ista cum propor-
tione, tũ & disproportione particularum respectu obiecti fermentabilis intercipi debet æther vndèquaque excurrent, sic & fermentatio cum eadem materia contingat decet. Nec iuvat profectò isti, hoc est alimonie, diuersimodè figuratis particulis constare. Quandoquidẽ liquor ille pluribus etiã scatet quæ eidem hinc homogeneæ, indè verò & etherogeneæ existunt alkalice nempè, acres, nitrosæ armoniacæ, siuè vrinosæ &c., quæ propterea plũs, quàm vulgare menstruum, ipsam aquam, regiam constituere aptæ forent.

III
Solutivus

Ex alia autẽ continet in se atque amplectitur præfatus liquor *chylosam* radicem, siuè basin, quæ est instar pulueris proiectionis in opere philosophico. Vt enim hic centuplo crassio rem mercurij debitè alterati massam in verum aurum transformat, sic

IV.
Et transmutativus.

illa in chylum, cui analoga, est deglutitam escam sibi assimilat.

V.
Hic é gl-
andula
Thyroi-
doea

Sed profectò chylus viuida materia est: huius iccirco basis, seu principium, itè viuat oportet. Quæ quidem vita in fluidis humani corporis radicalitèr non inuenitur; ergò neque in humore OEsophagi solutiuo, saliuo, humore Ventriculi, &c. vtpotè quæ principiata sunt, non principia [principiatum autè nequit elicere effectum potiorè se, qualis in chylo percipitur] vndè fit, vt tale *Viuens* esse debeat quidpiam principale, distinctum, in Viuente animali consistens. Cùm verò obseruentur in vnoquolibet istorum [etià Vegetabilium] alia diuersi generis, quæque propria ac speciali vitâ vivunt animalia, plerùmque Insecta, seu *Vermes*, dispeream, ni istorum sit principium illud vitale chylificativum præfatum. Sic enim ordinatum est in naturâ omnium animalium, vt alterum alteri alimento sit, & cùm denique chylo viuere conspiciantur etià Lumbrici, quotquot incolunt humanum corpus, vt nouimus. Quamuis in Homine animantium præstantissimo, sibi que idoneâ escam apparare gnaro hàud opus ys specie *Vermibus* ad chyli formationem: sufficit ipso.

ipforum semen, quod vt vite primordia in se fouet, sic & basi gaudet quâdam vitali, alteri materiæ conciliabili, eique analogâ, quâ vtrique vivunt, Homo & Vermis. Atque hæc quidè̃m basis radix illa est, siue fermentum alimentorum *transmutativum* cuius necessitas luculentè̃r, ni fallor, satis alibi fuit demonstrata.

Porro autè̃m tale semen, hoc est oua verminosa, conduntur promunturque à glandula *Thyroidæa* Ouarij nomine idcirco indigetanda; suntque illa oua in ovo muliebri quemadmodum reliqua Foetus rudimenta, à Natura designata. Hem! par Testi Muliebri est itè̃m *Thyroidæa* glandulæ in Ovo delineatio: sed fecundata illa, nempè oua verminosa, innumerabilium morborum portenta sunt: non sic quæ è Muliebri Ouario secidunt.

Quod vero spectat fermentum *solutivum*; exprimitur hoc è reliquis conglomeratis OEsophagi glandulis, nominatim, è *Trachealibus* triplicis speciei, è glandulis *primæ Divisionis Asperæ arteriæ, Dorsi, Bronchiorum ac Ventriculi*, prout nimirum in Anatomicis enarrauimus; adeo vt tandem concludere liceat, in vno liquore glandularum enuncia-

ta-

VI.
Ille emanat è reliquis.

tarum reperiri illas omnes conditiones; quæ ad humorem digestivum verè talem attestandum necessariæ existunt.

VII.
Vera OE
sophagi
descrip-
tio.

En igitur paucis, qualem [consequentèr ad dicta] publicandam duxi OE sophagi descriptionem. OE sophagus est canalis membranofus à Faucibus ad Ventriculum protensus ut esculenta ac potulenta Humore Digestivo suffundat, imbutaque in eundem Ventriculum diducat.

VIII.
Perfecta
denique
pergluti-
tionis ex-
plicatio.

Sic itidè quomodò deglutitio absoluitur nempe Constrictionem OE sophagi, adeoque cibi potusve protrusionem ulterius continuari usque ad Stomachum per dilatationem fibrarum annularium tunice Musculosa, & constrictionem fibrarum longitudinalium Antagonistarum eiusdem tunica ita scilicet, ut quo tempore dilatatur OE sophagi pars inferior, constringatur eiusdem pars superior: dum verò eadem Musculosa tunica ampliatur tubuli glandularum OE sophagi conglomeratarum excretorij altiùs invaginentur à trochleis dictam membranā perforantibus eodemque tempore magis, quàm aliàs patefactis; dum autem constringitur, exprimantur eidem tubuli ac veluti emungantur, propter nimium contractionem trochlearum tunc temporis accedentem; humore interim fontium memoratoris

large

*largè in OEsophagum collacrymante per plures
poros siue conglobatas , aut , si manis , disgregatas
glandulas per nerueam eiusdem canalis tunicam
disseminatas . In his etenim Ratio antè pro-
cellis agitata securè , velut in portu , tan-
dèm quiescere comperta est .*

D I X I .

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 11
PART 1
1881

1881



BIBLIOPOLA

LECTORI

S.

P*R*omiserat *P*reclarus *Au-*
thor heic *F*iguras exhibere,
*quibus Fa*cti *V*eritas magis indi-
caretur. *Verum*, cum hoc *Sibi* per-
ocium, atque ob defectum *Instru-*
mentorum in ea, quam colit *Uil-*
lam, minimè licuerit, rescripsit
prestaturum *Se id in alterà Edi-*
zione, quam ornatiorē parat,
Et auctiorem; postquàm scilicet in
Urbem (*prout destinat*) exceptus
me

*meliozem ibidem Operibus Suis
consulendi copiam nactus fuerit,
hac, quod Se absente facta quam-
plurimis mendis scateat, minus
arridente: Interim nihilominus
his vel absque eiusmodi Tabulis
viri cuiuslibet integrum esse. Vale.*

I A C O B I
V E R C E L L O N I

P E D E M O N T A N I

Phil. & Medic. Doctoris

D E

P U D E N D O R U M M O R B I S

&

L V E V E N E R E A

Tetrabiblion

Illustrissimo

D. L V C Æ P E R T V S A T O

Dicatum.



A S T Æ M D C C X V I.

Apud Ioannem Baptistam dè Zangrandis
Superiorum permisso.

*Hoc lege, quod possit dicere Vita,
meum est.*

Martial. Epig. 5. lib. XI.

MAGNĬ NOMINIS VIRO,

Illustrissimo Domino

D. L V C Æ

PERTUSATO

S A C R I

SENATUS MEDIOLANENSIS

P R Æ S I D I,

Supremi S. R. J. in Italia Consilij Regenti
Comiti, &c.

Domino ac Mecænati suo Gratosissimo

JACOBUS VERCELLONUS PEDEMONTANUS

S. P. D.

NOUVM Munificentie
Tuæ Argumentum hîc
Posterî inueniẽt, P R Æ
SES AMPLISSIME.

Dilcent liquidẽm ex me qualis er-
gà Literatos extiteris, qui idio-
tam, hominem à Musarum cõner-

DEDICATIO
cio alienum fisti Te coram iterum
non dubitaueris. Stupebunt nihilo-
minus adhuc magis, vbi me non,
quemadmodum antea, ex audacia;
verum ex nutu, ex inuitatione Tua
ad Te nunc accessisse comperient:
quum nimirum nouerint; uti ex in-
scitia insipiens factus cum post edi-
tionem priorum Commentationum
mearum in Publicum vidissem nihil
plus profecisse apud vulgum, quam
si in folle nugas obtulissem, aut
ollas, iuxta adagium, ostentassem;
cumque adeo melius actum iri pu-
tarem cum rebus meis, si qualibet
didascalie cura posthabita, qua
Medici scientiarum auidi hodie-
no tempore obolum in triuio emē-

DEDICATIO

dicare coguntur, in illorum partes
transiſſem, qui verbosi & iactabun-
di Magnatum fores obſidere, cul-
tè luculentèrque viuere ſatagunt,
Tu, PRÆSES AMPLISSIME,
indictò per humaniſſimas litteras
phaſmatum eiufmodi contemptu,
morum huius ſeculi & calamitatũ
tolerantia inculcata ità me in pri-
ſtino inſtituto meo confirmaueris,
vt non tam ad noua Studia, quàm
ad nouas inſupèr ipſorum euylga-
tiones impulieris. Dicent equidèm
tunc Meccœnatem Te omnium ma-
ximum, ad dirigendas præuarica-
tiones hominum veluti natum, Le-
gibus condendis parem digniſſi-
mumque & quem *Conſultiſſimi*

DEDICATIO

ipsi suspiciant, & *Reges Cæsaresque*
 in difficillimis negotijs adhibeant,
 & totus demùm Orbis veneretur.
 Ast missis Proprijs Tuorumque
 laudibus, à quibus abstinere Tui
 etiàm pars Consilij est, dicam fu-
 turum rursum hinc, vt & grates qu-
 andòque plurimas Tibi sit habitu-
 ra Posteritas; vbi nempè intelliget
 Opellam hanc Tibi ortum suum de-
 bere. Debebit etenim & Tibi quic-
 quid emolumenti ex ea percipiet;
 nec dubito, quin multum sit per-
 ceptura Auspice imprimis Te,
PRÆSES AMPLISSIME, qui
 omnes Liberalitate, Sapiëntia, Con-
 filio iuuare consueuisti. Vale.



AUTHOR

De Editione huius Operis ad Lectorem.



Vod Libellum hunc ROMÆ inchoatum anno 1701. nonnisi nunc ASTÆ absolutum videas, ne mireris Lector. Fuerat ad lucem nimium præcox; utque *plus satis festinata seriùs ad finem* (inquit Plato) *perducuntur*, sic Libri præmaturi.

Scilicet, eram paulo iunior, annorum circiciter 23., quum illum edere incæpi. Ibidem nêpé in Archiospitale S. Jacobi Incurabilium ad Praxin medicam exercendam accitus cum offendissem statim numerum propé incredibilem eorum qui non tam Fortunæ, quam *Veneris* flagris pessimè subacti [planè iuxtà illud; *Venus etiàm parvis in tectis habitat*] opem imploratum veniebant, mearum partium esse duxeram nervos intendere, ut ijsdem opitularer; insupèr, & quia à Medicis passim per Italiam obuijs didiceram non esse tutum ad Infirmos absque *Antiueneris* accedere, notas mihi compilarem, quibus in reliquis morbis pro ijsdem exhibendis ad Cynosuram dirigerer. Propositi igitur tenax congesseram toto biennio, imò & triennio, *Observationes de Pudenda*, quæ ibidem pleno velut horreo dabantur: cumque ijs mox iuxtà quatuor Medicinæ partes Physiologiam, Pathologiam, Simioricem & Therapeuticen
[Hy-

[Hygiene ad Physiologiam relata] distributis, Tetrabiblion compegissem ad meum ipsius modulum & eorum, quæ nupèr *Monspellij* habueram ab eximio Professore eodemque Præceptore meo D. D. *Petro Chirac* Aureliensis Ducis nunc Medico celeberrimo [cuiusque siue hospitalitatis, siue beneficentiæ, amoris, institutionis, aut laudum denique in me tùm adolescentulum atque immerentem clam, coram, vbique ac passim effularum memoria apud me posterosque meos æterna erit] operæpretium fore duxeram si idem publici iuris efficeretur. Nedùm autém ordinato prælo monuit me Illustrissimus *Bartholomæus Torini* Archiater tùm Pedemontanus præclarissimus, cum quo consilium communicaui, non decere, inquiens, imberbem Medicum typis quidpiam mandare, seniumque esse expectandum. Quamobrém pænitiâ ductus manum ferulæ, vt aiunt, libenter subduxissem, nisi præualuisset in iuvene inanis gloriæ æstrum, quo iam, quò non licebat impellebar. Nihilominùs acceptis postea literis ab Excellentissimo D. *Fantonio* Professore Taurinense, quibus sciscitabatur *Ecquid mihi videretur Nicolaum de Blegny, aliosque plurimos de tali argumento dignè satis non disseruisse?* abstinui ab opere. Ignarus quippè eorum, quæ in Medica Republica hætenùs gesta fuerant, censueram ante me neminem extitisse, qui *Venereorum* morborum Causas, Differentias, Signa & Curationem denique tradidisset, meque adeò potissimo iure talem impressionem meditari debuisse. Euertit verò denique & tale propositum

om.

omninò , idem D. Fantonus nuncians transiisse illac
-Nepotem Doctissimi Musitani, Patruī scripta, intēr quæ
-primo loco Tractatus de Lue Venerea reperiebatur,
-Geneuam adsportantem Typis mandanda. Quid igitur
reliqui, nisi vt tempori inseruirem, expectaremque quid
noui hic esset allaturus, interim & vt comparatis labo-
ribus eorum, qui haftenus de *Pudendagra* scripserant,
discerem mei ne alicui interdum vsuuenire possent,
nūmq̃ adeò fortè cum tempore proferendi, an fru-
stranei inuenti ad extremum essent sepelliendi? Hinc
portò à Naturæ Libro [quem in Anatomijs peruolutum
ad alios congregandos sufficere vsque credideram, quo-
que adeò in meo casu duntaxat vsus fueram alijs vt-
potè destitutus] lectione ad carthaceos translata Scrip-
tationum mearum ità obliuisci cæpi, vt reuersurus in
Patriam Amico commiserim colligendas, mihiq̃
si daretur occasio, transmittendas. Redux autem fa-
ctus, cū non, nisi de *Pudendagrophis* mihi com-
parandis sollicitus essem; nec, nisi Librorum huiusmodi
lectitationi incumberē, nescio quo fato [siue id cōtigerit,
ex eo quòd suum cuique pulchrum [*delectat veluti Bal-
binum polypus agnæ, ex Horatio*] siue, quòd expectatione
mea fraudatus ipse viderer, meorum desiderio iterum
carpi cæpi: Jàmque reddita mihi aliquandò fuerunt ea
scripta, sed lacera acdum humentia ex naufragio, quo
in transitu per mare fuerant periclitata. Cū verò vix
recuperata deserere, instante scilicet obsidione Tauri-
nense, Librisque illis valedicere vnā debuerim Corde

Pudendagologica omnia exciderunt; conuersoque alió,
rurc [quò diuerteram] animo, Dissertationes Anato-
micas parauit [quarum prima vulgata iam est] aliasque
Exercitationes Practicas, inter quas *Tetrabiblion* postre-
mo loco reponebatur. Nihilominus hic hostiles flam-
mas tandem eluctatus, adeoque ab aqua & igne, cui
merito erat deuouendus, incolumis factus gratiam ali-
quam inire cæpit: eò magis, quòd noueram iam, *Musi-
tanum, Blegny, Le Monier*, aliosque de *Luc Venerea* Scri-
ptores rem minus propius, quàm crediderã, attigisse.
Quo factum, ut Lucubrationibus alijs, quæcunque licet
ad manum essent, amotis, ipsum quamuis in Exercita-
tionum Practicarum ordine quartum antè alia in lu-
cem prodire maluerim, & ne demùm longius pressus
plus quàm Elephanti partum fortassis audiret. Cœte-
rùm quid in Exercitatione huiusmodi præstiterimus
suprà tot *Pudendagræ* Dictatores ipse idem nosces,
Lector ingenuè. Mihi certè in ea nil magis cordi fuit,
quam ut *Brunoni* satisfacerem sic loquenti: *Vix, ac ne
vix quidém adhuc de vera & accurata huius morbi (nempe
Gallici) indole, causis & generatione certos nos esse licet ob in-
determinabilem symptomatum in diuersis indiuiduis varia-
tem.* Ea proptér, si parùm á scopo aberrauimus, intentum
obtentum est; sin itá, aliquale saltim ordinem tot va-
rietatibus nos posuisse gloriabimur. In *sparsa namque &
confusa quâuis materiâ* (ait *Lipsius*) ordinem seruare id
Socrates apud Platonem diuini viri censet, ego diuini doni.
Vale

CONSPECTUS

*****s*****
CONSPECTVS

*Eorum, quæ in Quadripartito
hoc Opere continentur.*

CAPVT PRIMVM
Theoreticum.

PROLOGVS.
PROPOSITIO 1.

E purâ Venere etiâ impuram nasci pag. 3.

- | | | |
|-----|---|-------|
| I | <i>Probatur exemplo proprio</i> | Jbid. |
| II | <i>Et alieno:</i> | Jb. |
| III | <i>Itemque ex aliorum Authoritate.</i> | p. 5. |
| IV | <i>Queritur, an Fœmina Masculo citi-
us inquinetur?</i> | p. 6. |

PROPOSITIO 2.

Ab excessu in Coitu Muliebri Pudendum primariò infici.

- | | | |
|-----|--|-------|
| I | <i>Quia Mulier est magis libidinosa,</i> | p. 7. |
| II | <i>Et magis parhica</i> | Jb. |
| III | <i>Præsertim quòd Pudendum;</i> | p. 8. |
| IV | <i>Et quia magis conspurcatur.</i> | p. 9. |



PRO.

PROPOSITIO 3.

Succum glandularū Vaginaliū ab insolentiori Venere lædi ante reliqua Muliebria p. 10.

I Ob Calorem, pag. 11.

II Agitationem Ib.

III Dissimilium corporū commixtionē Ib.

IV Et quia denique liquida præ solidis magis subiacent fermentationi. p. 12.

PROPOSITIO 4.

Quamobrēm Succus Vagina præfatus ab intemperantiā in Coitu corrumpatur? Ib.

I Effectus Caloris immodici, Ib.

II Nimia Agitationis, p. 13.

III Et Confusionis corporū extraneorū. p. 14.

IV Corollarium de Natura succi Vaginalis mutati. p. 16.

C A P V T S E C V N D V M

De Pudendagra Muliebri.

INTRODUCTIO.

I Qualitèr Uaginalis humor corrumpatur. p. 17.

II Natura corrupti eiusmodi liquoris. p. 18.

III Eiusdem profluvium; p. 19.

IV Undè Gonorrhœa. p. 20.

§. 1.

I Muliebris Gonorrhœæ diuisio in simplicem & compositam. p. 20.

II Sim.

II	<i>Simplex non est à Lacunis,</i>	pag. 21.
III	<i>Neque ex Utero;</i>	p. 22.
IV	<i>Sed à Glandulis Uaginalibus supra memoratis.</i>	p. 25.

§. 2.

I	<i>Composita, siue Virulenta unde?</i>	Ibid.
II	<i>Et hinc ulcerum ratio</i>	p. 27.
III	<i>Et Symptomatum concomitantium.</i>	p. 29.
IV.	<i>Eiusmodi morborum cause remotiores</i>	p. 35.

§. 3.

I	<i>Fluxuum Muliebrium differentiæ;</i>	p. 37.
II	<i>Signa Gonorrhœæ diagnostica;</i>	p. 39.
III	<i>Signa Prognostica.</i>	p. 44.
IV	<i>Prognosis Ulcerum.</i>	p. 47.

§. 4.

I	<i>Indicationes curatiue Gonorrhœæ simplicis.</i>	p. 50.
II	<i>Et Gonorrhœæ virulenta.</i>	p. 56.
III	<i>Cura accidentium istius morbi.</i>	p. 58.
IV	<i>Curatio dietetica.</i>	p. 59.

C A P V T T E R T I V M

De Mentulagra

PROLVSIO.

I	<i>Capitis argumentum:</i>	p. 60.
II	<i>Observatio Anatomica;</i>	p. 61.
III	<i>Vsus huius Observationis,</i>	p. 62.
IV	<i>Et diuisio presentis capitis.</i>	p. 63.

ARTICULVS PRIOR

De Affectibus partium Obscænarum, si- uè Genitalium Exteriorum in Viris

§ I.

- | | | |
|-----|--|----------|
| I | <i>Morbi extrinsecè Præputio contin-
gentes,</i> | Jbid. |
| II | <i>Morbi intrinseci.</i> | pag. 65. |
| III | <i>Labes Fræni, Coronæ & Glandis,</i> | p. 67. |
| IV | <i>Et tandem Scroti</i> | p. 68. |

§. 2.

- | | | |
|-----|---|--------|
| I | <i>Accidentia Vlcenum in Præputio
externo;</i> | p. 69. |
| II | <i>In Præputio interno;</i> | p. 70. |
| III | <i>Coronæ, & Glandis:</i> | p. 72. |
| IV | <i>Accidentia Verrucarum & Exco-
riationum.</i> | p. 76. |

§. 3.

- | | | |
|------|------------------------------------|--------|
| I | <i>Signa causarum distinctiua:</i> | p. 79. |
| II | <i>Prognosis Vlcenum,</i> | p. 85. |
| III. | <i>Verrucarum</i> | p. 87. |
| IV | <i>Et Excoriationum</i> | p. 88. |

§. 4.

- | | | |
|-----|--|---------|
| I | <i>Curatio Vlcenum,</i> | Jb. |
| II | <i>Phymoseos & Paraphymoseos,</i> | p. 92. |
| III | <i>Bullarum Crystallinarum,</i> | p. 99. |
| IV | <i>Verrucarum & Excoriationum,</i> | p. 100. |



ARTICULUS POSTERIOR

De interiori Virilitate læsâ

§. 1.

- I *Observatio Anatomica de Lymphaductibus Penis.* p. 101.
II *Sidenhamij Opinio de Sede Gonorrhææ Virilis;*
III *Vera eiusdem sedes,* p. 104.
IV *Et processus morbosus* p. 106.
p. 110.

§. 2.

- I *A Gonorrhæa incōmoda in Prostatis,* p. 112.
II *In Vrethra,* p. 115.
III *Uesficulis Seminalibus,* p. 122.
IV *Testibus & Perinæo.* p. 125.

§. 3.

- I *Diagnosıs Gonorrhææ simplicis* p. 128.
II *Et Virulentæ:* p. 132.
III *Prognosis prioris,* p. 134.
IV *Vt & posterioris.* p. 135.

§. 4.

- I *Cura simplicis Gonorrhææ* p. 136.
II *Nec non Complicatæ, siue inueteratæ* p. 145.
III *Curatio Hypersarcoseos Uenerææ,*
seu Carunculae meatus Urin. p. 153.
IV *Et Herniæ Venerææ.* p. 158.



CAPVT QVARTVM

De Morbis Utriusque Sexûs, &
De Affectibus Torus, ubi

DE LVE VENEREA.

ARTICVLVS I.

De Pano inguinis.

§. 1.

I	<i>Bubonis nomenclatura</i>	pag. 164.
II	<i>Causa</i>	p. 165.
III	<i>Ortus,</i>	p. 169.
IV	<i>Incrementum</i>	Ibid.

§. 2.

I	<i>Maturatio,</i>	p. 170.
II	<i>Abscessus,</i>	p. 173.
III	<i>Suppuratio & ulcus,</i>	Ib.
IV	<i>Gangrena.</i>	p. 175.

§. 3.

I	<i>Signa Diagnostica</i>	p. 177.
II	<i>Prognosis Bubonis non aperti,</i>	p. 179.
III	<i>Ulcerati,</i>	p. 183.
IV	<i>Gangranosi.</i>	p. 185.

§. 4.

I	<i>Cura Bubonis Venerei benigni;</i>	p. 186.
II	<i>Maligni, siue non suppurantis,</i>	Ib.
III	<i>Aperti</i>	p. 190.
IV	<i>Sphacelati.</i>	p. 191.

AR.

ARTICULVS 2.

Subsidiarius.

De Morbis Femorum

- I *Rhagades & Verruca Coxarum*, pag. 193.
- II *Mulieribus præsertim familiares* p. 195.
- III *Vt & alia ad Interfæminium.* Ibid.
- IV *Earundem cura.* p. 196.

ARTICULVS 3.

De Ani Condylomatis.

§. 1.

- I *Inuectiua in Pedicones.* p. 197.
- II *Condylomatum generatio simplex,* p. 198.
- III *Complicata.* p. 199.
- IV *Viri præ Fæminis sūt huic morbo subiecti* Ib

§. 2.

- I *Condilomatum numerus, mollities,*
rigiditas. p. 200.
- II *Pruritus,* p. 201.
- III *Inflammatiō & Exulceratio,* p. 202.
- IV *Mortificatio & Gangrena.* p. 203.

§. 3.

- I *Signa diagnostica Simplicium.* Ib.
- II *Nec-non malignorum.* p. 204.
- III *Prognostica priorum,* p. 205.
- IV *Vt & Posteriorum* Ib.

§. 4.

- J *Cura cum ferro & igne* p. 206.
- I J *Et cum localibus* p. 207.

III tam

- III *Tàm ad Cristas simplices,*
 IV *Quàm ad virulentas*

Jb.
 p. 208.

A R D J C U L V S 4 De Lue Venerea

§. 1.

- J *Causa morbi remota;* p. 209.
 II *Eius divisio in Legitimam,* p. 210.
 III *Spuriam,* p. 211.
 IV *Et Hæreditariam.* p. 213.

§. 2.

- J *Causa proxima* p. 214.
 II *Accidentia Morbi Gallici Legitimi.* p. 217.
 III *Accidentia Spuriij.* p. 247.
 IV *Et Hæreditarij.* p. 251.

§. 3.

- J *Natura eiusdem Morbi.* p. 256.
 II *Differentia* p. 257.
 III *Diagnosis,* p. 260.
 IV *Prognosis* p. 270.

§. 4.

- J *Cura Luis Venereæ Legitimæ* p. 176.
 II *Curatio Spuriæ,* p. 308.
 III *Et Hereditariæ.* p. 309.
 IV *Cura Dietetica.* p. 311.

TYPO.

TYPOGRAPHVS LECTORJ
BENEVOLO.

ERratis in hâc prima Editione cùm neque ipse ob ruditatem, neque Author mille curis distractus occurrere potuerit, Tuum erit *Lector Candide* vel ignoscere, vel supplere, vtro, quem libuerit modum, de vtroque benemeriturus. Vale

IUSSU A. R. P. Lectoris Jo. Caroli Bordini, Uicarij generalis S. Officij Astæ, eiusque Diœcesis, Librum perlegi, cuius Titulus, JACOBI UERCELLONJ PEDEMONTANI Phil. & Med. Doct.; *De Pudendorum Morbis*; cumq; in eo nihil repererim, quod bonos mores, aut Orthodoxam Religionem offendat, Typis permittendum censeo. Dat. Astæ, in Conuentu S. Mariæ Magd. Ord. Præd. die 16. Augusti 1715.

F. Dominicus Antonius Maria De Quinquenijs, de Medico ~~Lectori~~ Præd.

APPROBATIONES

DE Mandato A. R. P. Jo. Caroli Bordini Uicarij Generalis S. Officij Asten. legi Librum cuius Titulus est JACOBI VERCELLONI PEDEMONTANI Phil. & Med. Doct. *De Pudendorum morbis*, in eoque nihil quod orthodoxæ Fidei Principibusque aduersetur inuento Typis committi posse testor. Astæ die 5. Augusti 1715.

Io: Baptista Vulpinus, Asten. Urbis, eiusque Ditionis Pro Archiater, & Serenissimæ Cariniani Celsitudinis Medicus Cubicularius &c.

Attentis Præfatis attestationibus

JMPRIMATUR

F. Io. Carolus Bordinus Ordinis Prædicat. Vic. Generalis, Sancti Officij Astæ.

JACOBI



J A C O B I
VERCELLONI

PEDEMONTANI

PHIL. ET MED. DOC.

DE

PVDENDORVM MORBIS

TETRABIBLION

CAPVT PRIMVM

THEORETICVM

Prologus.



EPOSITIS, exemplo *Syluij* &
aliorum [quotquot res magis,
quám verba curant] quæstioni-
bus proœmialibus quibuscunque,
dicam more meo, breuitér, in-
telligere me 1. *Pudendorum* nomine mem-
bra quacunque *Veneri* inserviunt, ità scilicèt
appellata, quód *libidinis* (ait *Augustin.*) nos

1.15. Ciu.

A

ma-

maximè pudeat, siuè, vt mavult *Commenius*; quòd eadem nominare multòque magis *revelare intemeratus vetet Pudor*. Quo fit, vt in ijsdem designandis diutiùs immorari non libeat. *Quæ enim natura occultavit* (inquit *Cicero*) *ea omnes, qui sanà mente sunt, remouent ab oculis; quarumque partium corporis vsus sunt necessarij, eas neque partes, neque earum vsus suis nominibus appellant: quodque facere turpe non est, modò occultè, id dicere obscœnum est*. Quàmuis tamen ab hoc officij genere dispensandus est Medicus, & cum officiosissimum ei sit Impudicorum probra, meritaque idcirco poenas manifestare; nobis propterea decursu istius Tractatus hæc ipsa præstituris, & si minùs, quàm pro officio quid dictum fuerit, hoc ipso in limine veniam præfaturis.

Comprehendere me, iterùm & consequentèr ad dicta, sub *Pudendorum Morbis*, quotquot à *Venere sunt*, coeteris aliundè genitis, illegitimis, in istorum coetum haudquaquàm cooptatis. Excludimus propterea hinc vitia omnia tùm naturalia tùm præter naturam ab intrinseco principio [præcisa tamèn sempèr *Venere*] *Pudendis* aduenientia, aut à violentiâ aliquâ externa

ternà, puta, ex uulnere, casu ab alto &c. Sed infurgis, *Venerem* innoxiam mali nihil vnquàm intentare. Prò responsione sit.

PROPOSITIO I.

Ex pura Venere etiàm impuram nasci.

PVritatem voco hìc, quę in Uirginum corporum munditie consistit: quà non obstante, assero, quòd, si coniuges partibus *Venerem* spectantibus abutantur, ex munditie fordes, ex his earundem partium, labes oriantur. Patet res exemplo: vna è nostris Virginibus spectatę, & formę, & virtutis, etatis anno sextodecimo, viro pugili trigenario nupsit, à quo velut ab equo, & mulo (seruatis seruandis, vt dicitur, vtque in *Sacris Paginis* legitur] idest enormitèr agitata, perendino post coniugiũ die inferiùs tota madere, deque fastidioso mixtu querula esse coepit; negotio cum Præceptore meo communicato, inuenta est Gonorrhæa laborare, quà tamen neuter coniugum ante, neque per Parentes, fuerat afflictatus.

I.
Probatur
exemplo
proprio.

Observa-
tio

Simile aliud affert *de Blegny*, cuius adeò verba,

II.
& alieno

verba, prout extant, heic ad vltiorem
fidem duxi transcribenda. Vne Fille [in-
quit] de quatorze a quinze ans estant pour-
suiuie par sa mere, qui la vouloit battre,
allá se ietter entre les bras d'un des freres,
d'une certaine Communauté d'Ovriers,
qui est establie dans un lieu, qu'il n'est
point necessaire de nommer. Ce frere la
conduisit dans sa chambre, & la força: il en
fit ensuite confidence à un autre, qui cou-
choit ordinairement avec luy, qui ne man-
qua pas de proffiter de l'occasion, & de
l'indiquer encore à un autre, en sorte, qu'
en trois iours, qu'elle y fut, il y en fut six,
qui en abuserent. A la fin, le plus prudent,
d'entre eux voyant que cette rencontre
pourroit amener quelque facheuse suite,
enuoya cette Fille par une femme, qui
feignit de l'auoir trouée dans une Eglise.
Elle fut aussitot enfermée dans un cabinet,
ou personne ne pouuoit entrer, que sa me-
re; a qui elle se plaignit six jours apres de
ce qu'elle souffroit des tres grandes dou-
leurs en vrinant. Elle fut dabord visitée,
par un Chirurgien, qui assura, qu'elle
auoit une Chaudepisse venerienne. On
negligea de la penser, parce qu'elle soutint,
que

que celà n' estoit pas veritable; & douze ,
iours après il luy vint vn bubon dans l' ,
aine droite . Comme ce nouel accident ,
acheuá de conuaincre sa mere , elle fut con- ,
trainte de declarer tout ce , qui s'estoit pafsé ,
pendant sa fuitte . Les freres furent visitez ,
par ordonnance de justice . On les trouva ,
tous sains & netz ; & celui , qui m'a fait ,
part de cette histoire m'a assevré , qu'il les a ,
toujours frequentez depuis familierement ,
sans auoir rien vú paroître d'eux : quoy ,
qu'il y ait Environ deuze ans , que la cho- ,
se soit arriuee .

Quamobrèm in nostras partes venire non
dubitarunt cum alijs plurimi , tùm imprimis
D. Uçay , cuius textus itá habet : On scait ,
que si vne fille parfaitement saine & pucel- ,
le , si on veut , afin qu' il' n' y ait pas au- ,
cun supçon de mal venerien , se meloit ,
parmi vne demi-douzaine de garçons aussi ,
sains , qu' elle , & se debauchoit tour a ,
tour avec eux , ou les vns , ou les autres auri-
ent bien tot la verole , & tous ensemble la con- ,
tracteroient enfin par la repetition des ,
actes veneriens . On a que trop d'exem- ,
ples [subdit paulo inferius] de ces verites ,
& on ne scait que trop de malheurs , qui ,
font

IIJ.
Itemque
ex aliorũ
Authoriõ
consensu

font arriuez an debauches de cette ren-
contre. On lit plusieurs de ces histoires dans
les liures, & les personnes raisonnables ne
doutent plus, que la verole ne se produisse
de cette façon. Sic Indi non ob esum ani-
malculi Inquanas, vt *Recentior* quidam
somniauit, neque ob anthropophagiam, Sy-
derum influxum aliasque, quotquot com-
menti haftenùs sunt ludiones Pudendagro-
graphi; verùm ob illam causam, quòd ni-
mirùm, effrænis luxuriæ sint, veluti pro ver-
naculo habent *Pudendis* laborare. Sed audia-
mus nunc demùm adhuc *D. de Saint Ro-*
main: qui croiroit en effet [sunt eius verba],
que le seul vsage immoderè de Venus fut
capable de doner la Verole? il n'ya pourtant
rien de plus certain: & nous pourions rap-
porter icy l'experience de plusieurs person-
nes, a qui ce malheur est arriué, s'il estoit
permi en cette matiere, comme en plu-
sieurs autres de nommer les gents par leurs
noms, ce que nous ne faisons pas icy pour
espargner leur honneur.

JV.
An femi-
na citiùs
Masculo
inquine-
tur?

Cùm itaque in plano iam Thesis nostra
versetur, venit inquirendum mas- ne, an
foemina citiùs ab assiduis eiusmodi exercitijs
fædetur. Dubium namque mouet, quòd,
dum

dúm hæc scriberem, venit ad me quidam novus maritus benè humeratus, neruofus, retulitque vti octiduo post, quàm nuptias celebrasset cum virgine alioqui pudicà, probis parentibus & satis honesto loco natà gonorrhæam contraxerat, qua tùm magno-peré affligebatur, ob id solúm, quòd per id tempus ab appetito cuncubitu nunquàm se temperare valuerit. Verùm, vt casus iste rarus est, cenfeoque ortum à latente aliquo feminio [quidquid contrà vir idem reclamaret] & quod tùm fortè, dato impetu, fuerit fuscitatum, ità superiores creberrimos, & constantissimos habeo, siué tales, vt bases loco esse possint dicendis infrà, inter quæ incipit.

Observatio.

PROPOSITIO II.

Ab excessu in Coitu Muliebri Pudendum primariò infici.

NAM, si *Lasciviam* consideres, invenias in eo Sexu parentem Otivm, invenias Mollitiem, Intolerantiam, Infidelitatem, Avaritiam, Suasibilitatem & sexcenta alia ità, vt nihil desit ad illius nutritionem è con-

I.
Quia mulier est magis libidinosa.

è contra in Uiris Labor, Prudentia, Gloria omnes eiusmodi stimulos aueruncant;

II.
Et magis
pathica.

Si verò *libidinandi patientiam*? videas *Semiramidem*, anum pessumam hircissantem non solum admittere, ast etiam provocare plerosque è suis militibus, qui formà essent elegantiore; filij quoque & equi congressum appetere &c. testantibus id *Diodoro*, *Trogo*, *Plinio* & alijs plurimis: videas *Messalinam*, illam indomitæ libidinis catulam, ex *Suetonio*, eligere præstantissimam ex prostitutis ancillis mercenariæ stipis, eamque die ac nocte superare quinto ac vicesimo concubitu; videas *Cleopatram*, quæ sub vnâ nocte sumpto cucullo in lupanari prostribulo centum & sex virorum amplexus pertulerit: videas quid, inquam, videas? nonnè prostant palam, vbiq; & diu nouæ semper *Laidæ*, ad quas ciues turmatim conuolant, nouæ *Thaidæ* iuventutem corrumpentes, nouæ *Coeliæ* de quibus *Martialis*;

*Das Catis, das Germanis, das Celia Dacis,
Nec Cilicum spernis, Cappadocumq; toros:
Et tibi de Pharia Memphiticus vrbe fututor
Nauigat, è rubris & niger Indus aquis.
Nec recutitorum fugis inguina Iudæorum &c.:
cum his igitur etiamsi Commodos, Gordianos,*

dianos, Proculos, aliosque notissimæ lasciuia viros conferas; tantum abest, quin superatas censeas, utij vel à vili qualibet meretricula rideantur. Et de facto, si Mas, dum in micronepilepsiam, *Hippocratis* verbo, siue in parvum illum morbum comitiale incidit, tantam sui iacturam facit, ut Vertigines, Tabes, Fatuitates [quarum non ignarus testis sum] aliquandò patiatur, quid est amabò, quod suprà foemininam libidinem præsumat?

Verùm neque hìc profectò sistitur omnino, mulierum maior in se conspurcando facilitas; consistit vel maximè in eo, quòd in Coitu plura patiuntur, quàm viri. Etenim in eo actu *Exterius Vteri Ostium* comprimitur; *Alæ* extenduntur, nonnunquàm etiàm: diuelluntur: *Clitoris* vnà cum inhærente, smorchia conquassatur; *Rugæ* tandèm *Vaginales* annexæque partes ampliantur, locomouentur, agitantur: è conuerso *virile membrum* nihil tale perfert, nisi, ad summum, quòd ad *Frænum Glandis*, ut si mulier fuerit Atreta.

Prætereá mulier partes sui Sexus discriminatiuas habet omni inluvie deformes, latrinas iccirco, aut, cum *Scaligero*, recessus
B Cloa-

IIJ.
presertim
quòd Pu-
dendum:

IV.
& quia
magis cõ-
spurca-
tur.

Cloacarum appellatas. Fluunt quippè exindè, præter lotium, menstrua diuersi generis, Saliua *Lacunarum*, vdor *Vaginalis*; quæ porro vel retenta innumeros pariunt morbos, vtcunque verò eiecta ipsi *Pudendo* noxia esse non desinunt, vt si per se, vel [quod crebrius contingit] ex intemperanti coitu fuerint alterata. Iunge demùm, quòd *Pudoris* ille *sinus* quasi sordium sibi non sit satis, *Priapi* amurcam auerit in eo lusu, marisque semen recipit, istò interim, nempè *Priapo*, nil, nisi *humorem Vaginalem* lambente. Quæ cùm ita sint, liquet Muliebre *Pudendum* præ Virili subiectum esse *Venereis* affectionibus, principemque istarum sedem in priori potius, quàm posteriori quærendam esse. Vndè adeò emergit.

P R O P O S I T I O III.

Succum Glandularum Vaginalium ab insolentiori Venere ladi antè reliqua Muliebria.

PAtet Assertũ. Quò námque actio coitus tota collimat, indè, & ipsius effectus sequantur necessum est: vt verò eadem actio in *Vaginam* omninò refunditur, sic etiám illius

illius malitia, in hanc, indè est attendenda. Probatur anterior pars consequent. Nàm *Veneræ* actio in *Calore*, *Agitatione* diuer-
 forum corporum *Commixtione* consistit :
 Et *Calor* quidè ut totum corpori per id
 tempus communis sit, potissimùm tamen
Vaginam vrit [ut nempe & vulgo vsitatum
 sermonem vsurpem, qui in Ippomaneas,
 hoc est libidinosas, iactatur,) cum nimirum
 sanguis, impellente animo, tunc solito magis
 illam suffundat, eique calori adiungatur al-
 ter ex *Priapo* itè in tali oestro valdoperè
 feruescente: similiter neque *Agitatio* aliud,
 quàm *Scaphium* (*Satyrici* appellatione)
 respicit, instante ibidem imprimis *Glan-*
de Penis, quæ illius *Rugas* principalitèr
 obtrectat; ac denique *Commixtio* corporum
 extraneorum: cum hæc in eo loco tota per-
 ficiatur, nec tantum quoad Organa, quàm
 quoad Inorganica. Quippè dicere, quod se-
 men in Vterum iniiciatur Coitus tempore,
 vanum est [viti scilicet ex *Dissertatione* no-
 strà *Anatomico-Medica quarta de Conceptione*
muliebri in Vtero fiet palam.] Remanet igitur,
 ut concludamus, quemadmodum actio *Ve-*
nereæ omnis, seu quod singula sua constitu-
 tiua, *Vaginam* intendit, sic & passionem

1.
Ob Calo-
rem,

2.
Agitatio-
nem,

3.
Ob diffi-
miliū
corporū
Comixtio-
nem vagi-
nam præ-
cipue af-
fligentē.

Et quia
liquida
solidis
magis sub-
iacent
fermen-
tationi.

quamlibet *Veneream* isti indè obuenire; & rursùs, quandoquidem intèr *Vaginalia* nihil æquè obnoxium est dictis causis, atque succus *Glandularum* eiusdem *Vagina*, & præsertim, quia fluida solidis citius alterari consueuerunt, propterea humorem hunc præcoeteris mox indicatis partibus *Veneræ* corruptioni subiacere. Iàmque adeó modum rationemque huiusmodi alterationis demonstrabit.

PROPOSITIO IV.

Quamobrè Succus Vaginæ præfatus ab Intemperantiâ in Coitu corrumpatur?

de Ferment. C. 7.

J.
Effectus
Caloris
immodici,

LEX Chymicorum est inconcussa [quam etiam *Willisius* docet] pleraque fluida alterari, corrumpi, mutari in alia Calore immodico, nimia Agitatione & corpore extraneo & non miscibili ipsis confuso: prorsum, quasi Chemiam Thesi nostræ videas protulisse. Et, quod Calorem: *Vina tenuia* [exemplum est præfati Authoris] aut *cereuisia* generosior *dolijs inclusa*, tempore æstivo radijs solaribus exponuntur, aut etiàm, bruma urgente, propè hypocaustum in loco calido detinentur.

mentur: hoc modo dum spiritus nonnulli evapo-
rant, reliquis sub iugum missis partes salina ex-
altantur & acore suo totam liquoris massam in-
ficiunt; nec tantum vina diutius servata, aut
cerevisia inueterascens, à quibus spiritus sua
spontè exierunt, sed recens mustum, at cerevisia
novella hoc modo in acetum transeunt. A pari
ergò Vaginalis humor postquam importuna
libidine excalefactus volatiles partes ami-
serit, quid est, quòd, remanentibus in eo
duntaxat fixis, iisdemque loco-motis atque
subuersis, in acidum non degeneret? Aduer-
ti non rarò in novis nuptis recrementum
illud ex lascivia sic efferbuisse, vt internum
Præputium excoriarit, Glandem eiusque
Coronam rhagadibus edolarit: quæ propte-
reà isti monstratum veniebant dolore per-
culsi; nec Vulvæ arctitudinem incusabant,
quam non erant experti ex feruore in coitu
percepto sibi talia inaugurantes.

O'seru.

Quod Agitationem; in comperto est vel
ligna, vtcùnque etiàm dura torno circum-
acta odorem (notante Nob: *Greuv*) emittere,
& quæ antè erant inodora; poma, & Vege-
tabilium folia digitis attrita fortiùs olêre:
ipsa denique *Verenda* in Virginibus minùs
fordescere, quàm in foeminis iam à longo

IJ.
Nimiæ
Agitatio-
nis

tempore subagitatis . Efficit namque hic Affrictus, vt *Glandulae Vaginales* (quemadmodum alias etiã Cutaneæ) liberiùs perspirent, saliaque in ijs contenta citiùs in actum exerantur . quaproptèr earundem succus paulo petulantius conquassatus, vt oui albumen, spumescere, euaporare, solito magis excandescere debet .

JII.
& confu-
sionis cor-
porum
extraeo-
rum.

Postremò, quod attinet extraneorum corporum, nec miscibilium, idest fermentorum, *Confusionem*; huius encheiresis, aut in alterandis liquidis energia, nedùm in Spagyricis, & Pharmaceuticis in ipsis etiã Vinarijs & cereuisarijs operationibus elucet. An autem masculinum præcipuè semen se habeat ad dictũ *Vaginae* humorem tanquàm menstruum quoddam, aut fermentum, nulli dubium esse potest, qui aduertat ab eodem semine ipsum etiã muliebrem sanguinem alterari, vt videre est in impregnatione; & prætereà ex eo, quòd fæminę quotquot pluribus sui corporis copiam faciunt (Spadones itẽm & Eunuchi) languidę prostant, non arrogant, fiunt desides corpore debilitato, rancidæ axungię nidorem exhalant &c. Quæ cum ita sint, si complures idcirco eiusmodi *commixtionum* perferat præfatus

fatus humor, considera qualis eiusdem sit futura mutatio, eius, inquam, succi, qui prior sanguine iroratur abs tali menstruo, quique isti immediatè nubet. oppones fortas-
 sè, non posse còmmisceri semen cum succo in *glandulis* stabulante. Ad quod resp. 1. quòd, cùm hic *Vagina* inferuiat lubricationi, vt proindé assiduò stagnat in idem vas, sic ibidè cum semine confunditur coitùs tempore, confusus autém quandòque absumitur à venosis ductibus, inque eiusdem *Vagina* substantiam vltimò adsportatur. 2. trās-
 uolare nihilominùs semper salia feminis volatilia in dictas *glandulas* ibique nubere eidem succo: id profectò, quod sufficit ad istius alterationem. Replicabis iàm suprà obiecta, eiaculari nimirum Virile sperma non in *Vaginam*, sed in Vterum. Ad quod tamen & ibidem responsum est, huius assertionis falsitatem tam clarè abs me *alibi*, Deo dante, ostensum iri, vt non dubitem, quin vel obstinatissimus quisque opinioni meæ valeat acquiescere; & prætereà illuc licèt iniiciatur semen, secùs ab imprægnatione tamen, nunquàm retinetur: quamobrèm, dùm à fœmina reijcitur *Vaginamque* præterlabitur, vtrò istius colliquijs valet inherere. Summa
 igi-

Dissert.
 Anat.
 4. citat.

igitur Masculinum semen habere rationem
menstrui respectu succi *Vaginalis*, eique hunc
in coitum utcumque commisceri.

IV.
Corolla-
rium de
Natura
Succi *Va-
ginalis*
mutati,

Sed haud satis est diuissim expendisse al-
latas Causas; contemplandæ veniunt etiã
coniunctim: considera verò, cum vnaqueque
earum per se mucum *Vaginalem* temerare
valeat, quid non ausuræ sint vnitim, & cum
in actum incessantè fuerint exertæ? dices
equidè saluam *Vaginæ* præcitatum indè
oppidò corruptum iri. Supere est nunc porro
exploremus quæ natura sit corrupti huius-
modi liquoris. Pro quo libet aduerere, quòd,
ut in Cane salua vitata [vndè Rabies, &
Hydrophobia] omnium calculo est acido-fi-
xa, sic in muliere catuliente sputum *Vagina-
le* (Neque enim alitèr, quàm Caninæ linguae
assimilari solet *Vagina* tum quoad *Rugastum*
quoad *Glandulas*.) Adde his modò vitium
commune lymphæ [quæ matrix eius est;]
annè porro, quemadmodum hoc in acidita-
te consistit, sic, & labes *Vaginalis* fluidi?
Lymphæ autè acor ex eo dependet, quòd
oleosa est, seu chyli portio butyrofa, digesta
ac diu elaborata: quam adeò si inficieris abi-
re posse in succum *Vaginam* oblinientem,
nil moror; erit hic saltem portio eiusdem
chyli

chyli serosa, ac propterea facilius acescere apta nata. Coeterum fixitas ob amissas in fermentatione vel, si mauis, in efferuescentia magis volatiles particulas, eidem fluori corrupto tribui debet. Quo posito pergo ad



CAPUT SECVNDVM

DE PVDENDAGRA MVLIEBRI

INTRODVCTIO.



AGINÆ Succum sic, vti nouimus, excalfactum, agitatum, fermentatiuis salibus imbutum naturalem suarum partium dispositionem seruare posse quis credat? Vetat hoc certé cum motus ratio, tùm fermenti, vt quæ non alitér constat, quàm si mixti, in quod agit, glebam aliquam è serie depellat. Quamobrèm particularum eiusmodi columnis incessúque interturbatis, vti consuetus æthereæ materiæ fluxus per easdem inhibetur, ità ipsæ met inordinatè agantur necessum est: hoc facto lymphatica filamenta turgescunt, attolluntur, inflantur sic, vt glan-

I.
eualitér
Vaginalis
humor
corrum-
patur.

Observatio.

dula etiàm , vbi hospitantur , in manifestos acinos adolefcent. Uidi fepiùs , & mecum plures alij meminerunt , in catellis intensiori coitu laceffitis *Glandulas* illas *Vaginales* mole auctas , à quibus albidus iustoque craffior liquor emergebat. Ex alià parte falinæ moleculæ in eo motu , inque illà ætheris excandefcentià viciffim concitantur , aliæ in alias feruntur , luctantur , digladiantur donèc integrantibus exfolutis effentiales veluti acuatę in alias abeunt diuerfamque à priori faciem inducunt. quippè post longam fermentationem facta viciffatim multiplici præcipitatione eadem ab integrantibus diuerfimodè excipiantur opus est.

II.
Natura corrupti
eiusmodi
liquoris.

Observatio.

Qualis autèm fuerit hæc noua falium fic vnitorum configuratio mihi liquidò nunquàm conftitit. Exploraui fanè lintea humore fic corrupto recens madefacta , atque ex microfcopio comperi in eo cryftallos quasdam prismaticas vtrunque acuminatas affimilari quafi manipulis fpiculorum , quę ferre in modum fuerint fastigiata ; fed quòd aliæ innumeræ speciei differentis ibidèm paritèr lustrarentur , in apricum res minimè deduci potuit . Licet nihilominùs coniectare , quandoquidèm præfatus humor
in ftatu

in statu naturali subsalsus, ac salivæ similis observatur [vnde etiam Saliva *Vaginae* audit Anatomicis] in præternaturali idcirco austerum esse, siue acrem: quemadmodum nempe in Canibus rabie percitis [quorum etiam Glandulae ac rugae Linguales equiparari solent *Glandulis rugisque Vaginalibus*) saliva exasperata. Atque hæc rursùm acrimonia enitet vel maximè ex eo, quòd in dicta efferuescentia foràs despumatus talis humor in exitu suo é *Glandulis* trucidet istarum poros, sicque sphincteribus ablatis sponte deinceps ac perpetuò elabatur. Videntur itaque prædicta saliva acido-fixæ, siue acria, ut nimirum sacchari acor volatilis ac balsamicus per destillationem euadit corrosivus.

Coeterò, quod profluuium illud spectat; nemo in dubium reuocare debet, quin *Vaginales glandulae* eidem sufficiendo sint capaces. Nam & ne fidem propriam inuocem facit autopsia. Reperiuntur [inquit *Verheyen*) per totum *Vaginae ductum* multi pori, seu meatus exigui: plures tamen ac maiores in parte eius inferiori circa exitum meatus *urinarij*: ex quibus continuo, saltem ætate vegetis emanat ea materia sero-pituitosa copia, quæ ad partes illas humectandas sufficit. In *Veneris actu*, ac se-

IIJ.
Eiusdem
profluuium;

pè etiàm in solis libidinòsis affectibus extra Pu-
denda profluit, ac passim pro muliebri semi-
ne haberi solet; at perperam: siquidem verum
semen non foras, neque, ex inferiori Vaginæ
parte erumperet; sed vel ex Superiori, vel ex
Vteri lateribus aliàue parte interiori in cavi-
tem correspondentē profiliret. Cùm igitur fluor
ille iugitèr deriuetur in dictum canale, quid mirum, si disruptis aggeribus eodem
postea exundet?

IV.
vnde Go-
norrhœa.

Iàmque huiusce inundationis nomine Go-
norrhœa venit salutanda, ille, inquam, mor-
bus, qui primus omnium *Pudenda* occupat
Mulieribus ex nimia *Venere* primario datus;
estque, *Brunone* Authore, *Præternaturalis*,
inuolutaria, & *intempestiva materia cuiusdam*
recrementitia, & *corrupta excretio* è Vagina.

§. I.

QVÆ quidem materia quandiù è solis to-
tiès citatis glandulis prouenit, meo qui-
dè iudicio, Simplex venit appellanda; ali-
tèr verò, si etiàm ex alijs partibus. Notum
est enim sterni *Vagina* à parte eiusdem supe-
riori atque intrà ipsius substantiam urinæ
ductum, *Urethræ* nomine: hæc autém *Ure-*
thra obducitur exteriùs substantià quàdam
albi-

albicante partim glandulosa, partim membranosa, ex quâ procedunt quidam meatus, qui inferiùs in principium *Vrethrae* & anticam *Vaginae* partem desinunt, ac loca vicina humore sero-pituitofo irrigant. Cùm itàque istud corpus (*Lacunae* à plerisque vocitatae) sit nimis vicinum dictis *glandulis*, sequitur, vt nullo negotio contracta tabe (idest etherogeneis valdè fermentabilibus miasmatis) ipsius humor paritèr in fermentationem irrumpat: quâ mediante corrosivus factus auulsis foribus laceratisque ostijs demùm extrinsecus vna cum illo, nempè succo *glandularum*, inuoluntariò descendat, vtque Gonorrhoeam constituat illam, quam Compositam, plerique Virulentam nominare malunt; sed dic vt vis: mihi satis est in hoc mentem meam aperuisse.

Illud autèm minimè tolerandum, quod nonnulli, intèr quos *Amatus Bourdon*, spectatis fortè eiusmodi *Lacunis*, quæ in foemina, dùm viueret, gonorrhoeam passà paulo intensiùs liuescebant, palàm prædicant, stillicidium istud ibi adeò primitùs eformari. Nàm, quòd tale spectaculū; vidi ego pluriès in eiusmodi Cadaueribus non tam *Lacunas*, quàm totam ipsius *Vaginae* substantiam, quæ

II.
Simplex
non fit in
Lacunis

Observant.

externè ut plurimum adiposa est, adeoque & cellulosa, ad eum modum suggillatam, quin imò & nigram penitus & putrescentem. quorsum autem dixissem propterea Gonorrhœam primitus processisse? Ut verò me in mea opinione confirmarem faciebant ulcera, quæ duntaxat interiorem partem, intactis reliquis, excuabant. hinc etenim intelligebam Gonorrhœam, quæ ansam præbuerat dictis ulceribus, in hac imprimis parte stabulasse. & prætereà, nonnè patet *Vaginales glandulas*, utpotè magis obnoxias coitus affectionibus, præ *Lacunis* ab eodè esse diuexandas?

JII.
neque in
Utero

Minus adhuc tamen audiendi sunt *Archiatři Monspellienses* (saltém, à quibus hoc accepi) aut quotquot *Minadoi* vestigijs inherendo muliebrem Gonorrhœam ab Utero deriuant. Aiunt namque in hoc congesta diuersorum feminum salia ob ingentem loci ascititiamque oestri foeminei caliditatem fermentare, in exigua spicula conteri, sulphureis flocis vinciri, ac denique abire in succum aquæ stigiæ similem: qui modò succus Vterinis glandulis affixus ipsarum emissaria obstruat, inflet, extendat adeò, ut manentem circum illas sanguinem sistat. Addunt exindè residem hunc sanguinem ob consensum

sum, quem habet cum semine proximè fermentante, alterari prorsum, in faniem converti aptam, quæ matricis glandulas erodat, ac patrato vlcere Gonorrhoeam suppeditet. Hoc inquam, aut simili ratiocinio plurimi inducuntur, vt credant Gonorrhoeam ab Utero proficisci; verum hallucinantur cum in alijs plurimis, tum in eo præsertim, quòd existiment semen in Uterum emitti immemores fortassè, quod ex *Harvæi* aliorumque in id experimentis compertum habent. Sed de his *alibi*, sufficiatque impræsens commissariam exhibeam Lectori candido fidem meam, ipsum acu, vt aiunt, attacturum, falsitatem opinionis de feminis in Uterum iniectione: interim verò aliam de Gonorrhoeæ generatione huic basi superstructam nutare penitus ac labascere. Sed concedamus nihilominus utcunque eiaculari liberalitèr sperma etiàm bis mille Admissariorum vel ad usq; Matricis imum, quid est nihilominus quod ab istius spiraculis non absorbeatur, ac libidinis incendio non deuoretur? Persæpè memini admotâ igni geniturâ è vestigio exaruisse, residuâ tantum remanente notâ ceu limacis reptantis: quam ego crustulâ etsi frequentè imaginer in foeminâ virofa, nunquã tamen

*Difert. 4.
citat.*

tamen excogitabo parem, quæ cum Uterina ferofitate fermentet. Caret enim fermentatio principio, nimirum fale, atque eatenus caret ipso, quatinus Salia feminis volatilitate tam exquisita pollent, ut in ipso ferme Uteri limine dissipentur. Ulterius; *credimus Minadonum* [loquar cum *Musitano*] *parum versatum fuisse in Veneris palestra. nam mulieres meritorie post coitum semen non retinent, sed inde sponte labitur, cum lubricam & sine rugis hanc habeant partem: si quandoque illud retineri accidat, vel post aliquod tempus reijciunt, si non, concipiunt, & uteri os ita clauditur, ut specilli aciem non admittat, vel ita statim se comprimunt, ut illud reijciant &c.* Præterea Gonorrhoea in Utero fieri à suppurante ulcere perperam auditur à Practicis, quibus exploratum est mulieres matricis ulcere laborantes guttatim micturire, febriculâ corripî ac tabe secus ac Gonorrhoeam patientes. & rursus, nonne scorta quantumvis fordida effoetescunt, & suâ quæque lunâ fruuntur; quorum minimè participarent, si utero esset affecta? Mitto, non tangam inconsideratam illam hypothesein, quæ de loco generationis curam tantum agere videtur, de loco lasciviæ nihil sollicita.

Sum-

Summa itaque primariam muliebris Gonorrhoeae sedem esse in *glandulis Vaginalibus* secundariam in *Lacunis*: siue, quod idem est, illinc Simplicem, hinc haberi Compositam: tertio autem loco Virulenta est, ut quae vtrunque prouenit, ac praecipue è *glandulis*, quemadmodum breuibus ostendemus infra.

J V.
Sed in
Glandulis
supra me-
moratis.

§. 2.

ETenim abscissis fibris, quae supradictarum *glandularum* ostia constringunt, Sphincteres idcirco vocitatae, sicuti trucidantur etiam vascula, quae tales partes irorant, ita fero, limpha, nec non reliqua demum sanguinis massam inde subtracta & fermentata, oritur pus, quod illuuiem illam adauget, proque maiore sui redundancia Gonorrhoeam reddit quotidie magis Virulentam. Jamque tantum erosioni illi tribuit *Broen*, ut vel omnem muliebris Gonorrhoeae causam eidem adscripserit. *Existimamus* [inquit] quod coitu immodico (nota quam bene heic proluserit Theoriae nostrae Author clarissimus) nimisque frequenti fibrilla vasculaque tenella Vaginae fuerint attrita nimis & rupta ita ut humores in vicinia stagando acredinem notabilem

J.
Virulen-
ta unde.

in notis ad
Henr. Reg
Medicat.
43.

D

susce-

Observa-
tio.

susceperint; ast falsò. siquidè conflat tales
 fibras neque á validis distentionibus, vt in
 partu, vlllo pacto diuidi: benè autèm aut *exte-
 rius Vaginae* orificium, aut *Nymphas*, vti nem-
 pè harum alteram vna cum Sphinctere Ves-
 ficæ [cuiusmodi obseruationem habet etiám
Salmuth] nupèr in Nob. Comitissa ab exclu-
 sione foetus mortui amputatam vidi. Sanè
 quidèm [rescripserat sic ad me quidam ma-
 gni nominis vir, cum quo dudùm de hac re
 verba feceram] si eæ fibræ tám tenellæ essent,
 vt à *Broenio* existimantur, Uirginibus in
 primâ accessione, præsertim queis acerbior
 ætas florem virgineum nundùm aperuit,
 talis fibrarum disruptio, & per consequens
 illa humorum acredo inferenda esset, non
 Veteratricibus fouea, seù *naviculari cavi-
 te* amplissima patefcentibus. Ex alia parte
 cogita [inquit *de Blegni*] an disruptæ ali-
 quot fibræ tantam humoris extrauasati co-
 piam suffecturæ essent, quanta in Gonor-
 rhæa proijcitur? id profectó, quod monere
 debet etiám *Musitanum* asserentem tale stil-
 licidium ab vlcere in *Vagina* ab externo ali-
 quo principio (puta aeris inclementiam) ex-
 orto procedere: perindè quasi iàm eorum
 esset oblitus, quæ non ità pridèm iecerat in,

Leo.

Leoniceum, *Massam*, *Fracastorium* eorundemque affeclas. Quid enim? cùm dissenteum duxerit Luem *Veneream* ab Aere, aut Syderibus ortum contrahere, muliebrem Gonnorrhæam, quæ eiusdem Luis proxima causa esse consuevit, autumabit postea indè procedere!

Sed relinquamus huiusmodi epiphillida hominibus otiosis, & iam illius vlceris naturam inuestigemus. Certum est autem, ruptis sphincteribus *glandularum* factoque viru, sicuti vicinæ fibræ sensim eroduntur, ita inflammatione parta *Vaginam* indè exulcerandam esse. Verum hæc pars quoniam officio vacua refert formam flaccidi cuiusdam Intestini sic, vt latera eiusdem concidere soleant, non vbique adeò vlceribus obnoxia est: sed ad fornicem atque ad latera Rhagadibus tantum: quatinus scilicet pus morari ibidem, sibi que cuniculos facere prohibitum serpendo protinus, quasi lambendo, *Vaginales* fibras duntaxat deglabrare valet oblongasque illas excoriatiunculas exarare, quæ minus propriè Rhagades vocitantur, quamuis decursu temporis suffosso tramite fiant interdum veræ fissuræ: ad imum verò, idest ad partem inferiorem plerumque etiã

IJ.
Ulcerum
ratio.

vlceribus ; quandoquidẽm ibi stagnat fa-
 nies & quasi lacunatur : quę res est , vt altẽ
 admodũ impactis in ipsius *Vaginae* substan-
 tiam corrosiuis salibus phlogoses excitentur
 atque vlcera, etiã quocunque titulo peiora
 Phagedenica nimirũ, Disepulotica, Ca-
 riofa, Chironia, Cancrofa, Thelephia, mali-
 gna. Vidi ego complura, à quibus dicta *Vaginae*
 pars atque Intestinum Rectum erant arofa,
 Anticã tunc Postici vices supplente, quęque
 vna simul dehiscebant, & vicissabant, nempẽ
 & foecibus non careret, quę sentina iã eua-
 ferat omnium impuritatum. Quòd reliquas
 dimensiones ; rarò latefcvnt talia vlcera, ple-
 rũque in longitudinem extenduntur. Siqui-
 dẽm pus ad humillimam canalis partem pro-
 uolutum hàud expatiari, ast foras exire pro-
 perat, dũque adeo abit, quã prætèrlabatur
 acrimoniæ suæ vestigia linquit. Ex aduerso
 autẽm labellis iuxtã latitudinem duriusculis
 obsepiuntur eadem, nempẽ vlcera, inquan-
 tũ quòd orbiculares ac nerueæ *Vaginae* fi-
 bræ disruptæ ac contractæ terminos nancif-
 cuntur crassiusculos, velut in capitula reda-
 ctos : quorum adeò ratione succi nutritij
 vijs angustatis coementantur ibidẽm, inque
 duras margines occallescent. Tametsi ad hunc
 cal-

obseru.

callum facit vel maximè puris contagium
utpotè ex quo dictum cambium, siuè nutri-
tia lymphæ, circumfluens necessariò fixatur.
Atque hæc quidè fanies vel serosa est, vel
spissa alba, flava, lurida, livida &c. prout
glandulosa *Vagina* substantia profundius ex-
cavatur, ipsumque pus magis, minùsue fer-
mentavit, aut à sanguine processit iam vi-
rulentis salibus inquinato. Quippè eadem
Vagina superficialitè tantum depasta, sicu-
ti nonnisi extrema arteriarum ac vasorum
lymphaticorum capillaria dehiscunt, è qui-
bus mòx serum duntaxat salit & lymphæ;
itá, quæ indè emergit macies serosa paritèr
ac fluida esse debet: è conuerso, ductibus
sanguiferis abruptis; quandoquidè adiun-
ctis purpureis globulis simulque fermentatis,
ulcerosæ sordes alitèr, atque antea, lucem
reflexuræ erunt, siuè itá ut flavedinem
representent, aut virorem, liuoremue, &
si sanguis fuerit labefactatus. Quæ causæ
sunt, cù Gonorrhæa alba, flava, viridis
ac postremò etiàm livida appareat; itè ut
inolida in principio, processu temporis val-
dè foeteat, quò nimirum sanguinis ac sani-
ei in ulceribus fermentatio augetur.

Haftenùs de *Vaginalibus*: supersunt alia *La-*

Gonor-
rhæa Vi-
rulente.

cunarum, quæ vlcera intantum fiunt, in-
quantum quod perbreue est iter ab illis ad
has *glandulas*; quo fit, vt virulentis cor-
pusculis exindè huc permigrantibus fermenta-
tio cum nouo istarum succo [vndè alterà
Gonorrhœa causa] sequatur, vt nouimus.
Iàmque adeò hæc fermentatio, quoniàm,
vel omnia interturbando sanguinis fluxum
inhibet, vel acrimoniosa spicula inuehendo
eiusdem vasa cariat, inflammationes gignit:
quæ in abscessum versæ ac suppurantes Go-
norrhœam primò reddunt [vt *Vaginalis* præ-
fata] multiformem, idest albam, flauam, vi-
ridem, liuidam &c: ac consistentiæ paritèr non
abfimilis: mòx verò effluuijs vicino adipi cõ-
municatis, vlcera infligunt; quæ fistulosa esse
consueuerunt præcipuè versús *Pubem*, vbi
maior eiusdem pinguedinis copia obserua-
tur. Nám, cum cellulosa sit istius substan-
tia, velut spongia, illa effluuia facilé imbibit,
ac saturata cutem ipsam superiectã corrup-
pit. Aduerti ego multotiès vlcera hæc ad
Veneris Montem aperta, & per quæ lotium
emittebatur præcipuè quotiès mulier prona
decumberet: itèm alia, per quæ etiàm stan-
ti; cùm nimirum vel hyperfarcosî: teneretur
Vrethra, vel ipsa hæc inflammatis *lacunis*
veluti

Obseru.

veluti strangularetur. Huius autem phœnomeni ratio patuit aliquandò demùm ex ipsa cadauerum sectione. In his etenim *Lacunæ* valdoperè nigricabant, Vrethra ad latus perforata erat, adeps consumptus ac flauescens. Denique inflammationes illæ quatenus mucum abliguriunt, à quò Vrethra interiùs oblinitur ità nempè, vt caua istius superficies penè nuda remaneat, fit quòd vrina postea intèr excedendum eandem, vellicet, ac lixiuiosis suis tunc etiam per vicinam fermentationem agitatis, seu exaltatis salibus torreat, affectumque inducat illum qui, Gallis *Chaude pisse*, Nostris etiàm *Pissacauda* vocatur. Pretereà, salia *Lacunarum* existente acre, *Clitoris*, *Nymphæ* totumque *exterius Vteri orificium* vtpotè ab eiusdem salibus iugitèr irritata nō tam prurire, quàm crispatis fibris, adeòq; sanguinis intercepto ac retardato cursu inflammari debent. Noui ego Scorta, quibus eę partes sic aliquandò intumuerant, vt viros admittere ampliùs non valerent: retulerunt alia se ex eo tumore perindè passa in eo actu, ac si Uirgunculæ fuissent in primo ætatis flore constitutæ. Rursum *post pruritum* [verba sunt *Ettmulleri*] ex simili causa Corosio in labio Pudendi ac sinu pud-

Observ.

pudoris, hinc furfures, pustula ac denique pudendorum scabrities interdum oriri solent: quæ ipsæ pustulæ malignæ quandam habent speciem, quæ vocatur Epinyctides, quarum dolor admodum vrens est & insignitèr intensus, & qui longe excedit proportionem magnitudinis pustulæ; neque enim faba maiores nonnumquàm visuntur hæ Epinyctides sæpiùs sunt minores, scabræ, seu furfuraceæ. Narrabant nonnumquàm scortatores emeriti ob hoc genus furfuris *Vaginam Vteri* scabram, tamquam aridam & siticulosam inire interdum non potuisse & nonnisi postquam à scortis admoniti *membrum* salua obduxissent. ulterius, adnascuntur, imprimis *Vaginae orificio* Condylomata, tubercula nempe dura, occallescentia, tædioq; magis quàm dolore molesta. *Oriuntur autem* (inquit *De le Boe Sylvius*) *in cute rugosa qualis est in Podice, Muliebri Uagina, virilique Præputio in quibus duntaxat oriri solent partibus, & quidem à præpostero Ueneris usu & partium arcto confictu, siue id contingat personis lue Venerea infectis, siue alias sanis: Plerumque verò sequuntur inflammationes, aut Rimas induratas; ut patet. Postremò, auctarij loco, coronatur eadem Fissura magna*
(cunnus)

(*Cunus* abs *Galeno*, & passim *Vulua* appellata) Poris, seu Verrucis: quæ cum nonnisi serò contingant, palam est ab intrà procreari. Quippè si Gonorrhoea fatæ essent, quæ siuè Masculina, siuè muliebris externè *Vulvam* irrumaret, vt Recentiores nonnulli contendunt, quidni à tali irrumatione statim pullulascerent? melius igitur cum *Galeno* mox citato sunt *Acrochordones*; *Verrucarum* nempe genus dolens, pensile & foras prominens exilique veluti pediculo cœu basi, innitens (siuè id, quod in hoc casu se se oculis exhibere solet) vitiosi multi succi nutritij ad exteriora & Cutim repentis soboles, ex Castello. Et ne Authoritates emendicentur, sufficiat obseruare tales Ficus, vbi aliquandiù consenuerunt, ferositatem quandam vlcerosam è fastigio vomere, plerùmque etiàm mediam setam [Ego *stylum* ad digiti altitudinē multotiès introduxi] per eundem culmum admittere: quo fit vt ab interno latice, vt grumi à talpà, sic Verrucæ illæ producantur, minimè verò ab indusio sanie madefacto, à membro sordido & cunnilingo &c. Quod attinet fiendi modum; diximus suprà, virulenta salia è *Lacunis Vaginalibus* in *Pubis* pinguedinem adacta vortices & anfractus struere, qui extrorsum

Obser.

aperti Fistulas relinquunt, aut vlcera fistulosa Liquet igitur nunc, quod si minus fixa fuerint ea corpuscula penetrato adipe (quo non tam *Mons Veneris*, quam & extrema *Vulvae* ora tument) cutis fibre paulatim extendi incipient [vnde adeo initio non nisi paruae ac rubrae papulae apparere solent] extensae vero, & arcuatae aditum prebebunt nutritio succo, qui easdem idcirco saginando ulterius producet; donec tandem, euaporata istius aquosiori parte pyri resultent duri, idest *Pori*, aut *Acrochordones* illi, quorum supra meminimus: si vero fuerint paulo fixiora, eadem fibre protinus, cogente infra subiecto fermentatiuo motu, allongabuntur, acutisque insuper ipforum-met fermentantium salium angulis discerptae, vt iuxta adipem molliusculae, non ita secus, duriusculae ob ambientem aera, euadent, ita, cum erectae consistere nequiuerint, simul concident, spiras describent velut in exiguas cochlearum testulas abiturae, seu in *Verrucas*. Huiusce posterioris speciei sunt, quotquot praecipue *Mons Veneris* germinat, quasque in summitate apertas saniem diximus euomisse. Coetero aliae, quae siue *Thymi*, siue *Myrmeciae*, siue demum alio quouis nomine indigentur, in *Vagina*

gina succrescunt, eæ communem cum pustulis ducunt originem, vt & postremò etiàm *Mariscæ*, idest *Ani Condylomata*: de quibus tamen (vt & de *Pano Inguinis*), vtpote *Uiris* quóq; familiaribus, alibi erit differendi locus.

Coronidis ergo adiungam heic alias causas, quæ etiamsi externæ, cùm ipsam muliebrem Gonorrhœam, tùm pedissequa eiusdem symptomata nihilofeciùs promouere solent: suntque 1. concubitus cum viro vlcere *Preputij*, aut Gonorrhœâ affecto; 2. Oris vlcera à *Basiatore Veneris* stipendiario inflicta; 3. Mammarũ inquinamenta à *Lactente* eiusdem *Luis* hærede, & si quæ sunt alia. Et quod primam: extrà dubium est *priapinas* sordes quoquo demùm modo à *Vagina* absorbeantur cum istius succo ità confundi posse, vt subindè ipsum fermentare compellant; hoc factò, nonnè Gonorrhœa & reliqua *Veneræa* excitanda sunt? Quod spectat alteram; satis demirari nequeo consensum Oris, & *Vaginæ*. Hoc etenim obseruatu dignum [quodque ad *Diagnosin* haúd parùm confert] simulac *Vagina* sanie plorat, inflammari *Columellam*, *Fauces* exulcerari, *Vocem* alterari, nec minùs pati illam, si hæ partes fuerint attactæ. Ratio autèm huius phænomeni [missis, quæ de

JV.
Eiusmodi morborum causæ remotiores

Obseruat.

salua vtriusque Oris, deque similitudine *Vaginae* cum Lingua canum ab Anatomicis perhiberi suprà adnotauimus) non alia est meo videri; quàm Geometrica proportio Glandularum vnius ad glandulas alterius cavitatis ità nempe, vt par sit ambarum diameter, eadem figura, & æqua dimensio; vndè est, quòd saluialis humor ad vtrasque transiens qualis hìc absumitur à venis talis illic reponatur ab arterijs, & viceuerfa; vt autèm sanguis intrà horè spatium ferè quindecies susdeque circulat *Louuero* teste, sic vlcerosa diethesis alterius partis alteri ocysimè communicatur, vt liquet. Tertiò denique Mammarum altera cū *Vagina* Sympathia deducitur abundè nō tam ex neruis (vndè & contractatis Mammis puellarum vterus prurit) quàm ex Hypogastricorum vasorum commercio cum Mammarijs vasis *Ab Hypogastricis* (inquit *Verebyen*) *vasa sanguinea vsque ad Mammam insecutus sum nunquàm: sed quandoquidè in cane masculo facile aliquot centenas horum vasorum cum Mammarijs connexiones offendi, nullatenus dubito, quin illa etiam in Mammam vsque extendantur.* Cùm verò ob eiusmodi anastomoses extrà non communicent dicta vasa, verùm mutua inter se commercia

cia exerceant, sequitur, vt virulenta Al-
umni salua Papillæ admota inque Mamma-
rios ductûs, qui extrorsum repunt, nec non in
Hypogastricos subinde adducta *Vaginam* tan-
dem impetere, ac vicissim istius virus in Mam-
mas denique concedere debeat. Atque hæc
quidém posterior causa est, cûr *Vagina* affe-
ctis schirofæ duritates in Mammis gigni so-
leant, vt non rarò in Nosocomijs licuit ob-
seruasse.

Observat.

§ 3.

Miraberis interea, *Lector*, postquàm ea
narrauerim, quæ seorsum ab exce-
ssivo Coitu, Gonorrhoeam eiusque sympto-
mata patrare posse autumaui, alia tamen
omiserim, quæ vulgo ad id mali vel maxi-
mè conducere existimantur, cuiusmodi sunt
Cachexia aliqua Scorbutica plùs iusto acris,
inordinata Cathameniorum euacuatio, Flu-
xus albus, & id genus alia. Hæc enim, in-
quis, vlcera in *Vagina* [penès aliquos etiàm
Gonorrhoeam] excitare posse omnibus in-
comperto habetur. Verùm stupere defines,
vbi in mentem reuocaueris, quæ initio fu-
mus protestati: nolle nimirum nos hoc li-
bello alia commentari, quàm, quæ incom-

J.
Fluxioni
Mulieb-
rium di-
ferentia

moda ex *Venere* fiunt. Vndè sequitur, quòd, etiàm si Cachexia Scorbatica & reliqua recensita aliquam *Vaginæ* plagam [quod non credo] iniustura essent, ea tamen nostrum onus esse non debent. Id verò ne credam, facit experientia. Nàm quot Viros inuenias, qui uxores talitèr affectas quotidie incessunt citrà noxam, à quà tamen minimè immunes essent, si earum *Inguina* forent ulcerata. Dicendum igitur, quòd vel eiusmodi vlcera non sunt contagiosa, & sic non sunt *Veneræ*, vel [quod probabilius] neùtquam existunt in illis *Ægris*. Et de facto, quòd saltèm binæ priores causæ (Cachexia & menstrua irregularia) ne minimo quidèm vlcusculo impingendo pares sint, suadetur ex eo, quòd sanie carent, nec nisi falsuginosæ sunt; quomobrem pruritum duntaxat aliquem circa *Vl-*
nam gignere compertæ. Quòd verò Fluxum album, vnum si demas *Rhodium*, neminem, ni fallor, reperies, qui ex eo *Vaginam* no-
observat. uerit ulceratam. vidi ego non paucas, quibus foeminis idem fluor (referente tùm id mihi præstantissimo *Mario Cechino* Archiospitalis Incurabilium Romani, vbi Medici Assistentis munereungebar, primario Chyrurgo & Med. Doct.) ab ulcere Matricis proueniebat

bat, & quæ tamen foeminæ vlcere *Vaginali* nunquàm fuerant diuexatæ: cuius rei causam arbitrabar tùm in eo consistere, quòd sanies Vtero pulsa, quemadmodùm intestini, siuè fermentatiui motus expers erat, ità radices [vt sic dicam] altè in *Vagina*, vtpotè canali membranoso atque oleagineâ mucositate obducto iicere non potuisset. Sed censeo *Rhodium*, vt & alios multos Fluorem album cum Gonorrhœa confudisse. Quod vt credam suadet Historia. Fertur namque lege cautum fuisse *Ægyptijs*, ne qua tale stillicidium patiens nuptui traderetur ob incōmoda, quæ comperita fuerant Viris obuenisse ex eo fluxu non alio iccirco, nisi Gonorrhœæ, nomine indigitando.

Quod et ne nobis accidat, præstat missis commentitijs hisce causis ad ea procedamus, quæ Gonorrhœam distinguunt ab ijs atque ab alijs morbis. Præcipuum autèm distinctivum istius ab Uterino fluxu est hoc. *Nàm in Gonorrhœa [Sennerto connotante] ulceris notæ adsunt, quæ absunt in fluxione Matricis; ipsum etiàm pus, si sit laudabile, crassius est ac magis albidum, quàm fluor albus, & minoris quantitatis: si verò sit saniosum cruore, perfusum est, & cum dolore excernitur.* Prætereà cui fluxio alba (siuè Vteri Coryza, aut Vteri Rhumatismus iuxta

II,
SignaGo
norrhææ
diagnosti
ca.

Charle-

Charleton) oborta fuerit urina veluti asinina [*Hyppocratem* audis] apparet; & dolor imum ventrem habet & lumbos & lateris mollitudinem, & tumores fiunt crurum & manuum, & cava eleuantur, & oculi tumidi sunt, & color arquatus, & albus fit, & cum iter, facit anhelat. Differt etià Gonorrhœa à Mensibus decoloribus in eo præsertim, quòd Menses decolores adhuc ad menses pertinent, & depravati sunt; color autem ruber adhuc in ijs conspicuè apparet: Gonorrhœa verò & substantiâ, & colore à mensibus decoloribus differt. Deindè etià exeundi tempore & modo Gonorrhœa distinguitur à mensibus decoloribus. Menses enim decolores adhuc suâ periodum servant etsi non semper exactè: Gonorrhœa verò alio, quàm Menses fluit tempore, nimirum continuò, antè & post menses; grauidis quòque, & quibus menstrua suppressa sunt, accidit. Vtteriùs, tam ab his mensibus, quàm ab alio quocunque fluxu distinguitur Gonorrhœa, si mulier vegeta sit, si gaudeat, edat, confabuletur hilaritèr. Quippè in illis cachectica est, squallida, languida, sæpèque, imò & continuò aliquandò febricitat. Adde his, *Pudendi*, aut cuiusdam ex ipsius particulis tensionem doloremque

que Gonorrhœa affectis familiarem esse: cæteris, eiusdem partis relaxationē, indolentiā atque aliositatem.

Sed quid de his plura? cū videlicet ab effectibus suprā descriptis Gonorrhœa muliebris abundē elucescat! Rectiūs igitur cum Ægrotis agemus, si, quemadmodū processu temporis illa per sua symptomata se manifestat, sic Nos eandem initio inuestigare noscamus. In quem finem consuevere Medicastri & nonnulli de fœce Barbitonforum, statim atque mulierem audiunt de mixu conquerentē, quod ardens sit & molestus, audacter pronunciare, ipsam Gonorrhœā maderē, & si præsertim *Vaginæ* stillicidium aliquod fuerit adiunctum; in quo tamen quantum à Veritate aberrant liquet ex eo imprimis, quod, *Doleo* docente alijsque Praticis, etiā Vteri coryza affectæ talem Diuresim nonūquā patiuntur; & prætereā, quia ostensum est in superioribus Gonorrhœam simplicem cum mictu illo minimē copulari; cum

Observat.

filiij causa conuenerit Uir quidam Nobilis, Medicinæ non imperitus retuleritque uti ex concubitu cum muliere, de cuius probitate non dubitabat Gonorrhœam cōtraxerat Venerream verā solitisque accidentibus stipatā: nescire igitur sese vnde ea fluxio exordiū accepisset. Ad hæc reposui, sciscitaretur ancillas, aut, quæ illius lintea curabant; comperturum se indè Amicam, vel Gonorrhœā, vel vlcere *Vagina* aliquo laborare. Dictum, factum; lintheamina explorata sunt, vestimenta omnia examinata; neque tamen ex his indicium aliquod desumi potuit, quo in vlceris, aut Gonorrhœæ suspicionem veniri posset. Adiecit & foemina præstolationum huiusmodi gnara facta querelas, obtestationes, iuramenta centum (sed vah; *Muliebri iusiurandum!* inquit *Erasmus*, & rursus *Mulier! ne mortuæ quidē credas*) immaculatam se se penitus, nullum in mingendo fastidium, dolores nullos, nihil non sani in *Pudendo* persentire: quibus relatis, suggesti Amico introduceret clanculū & simulantē in *Vaginam* pessarium aliquod acre, puta aceto & sale delibutum, renunciaretque postea successum experimenti. Nec mora; iocusque fuit audiuisse ex eo gemitus, gesticulationes, imprecations

cationes, quibus mulierem illam ab eiusmodi intromissione usam fuisse retulit. Quare is mecum tandem opinari non ambegit, se in antrum haud legitimum [vt prouerbiali figurâ vtar] stimulum impegisse: quod & insupèr euentus declarauit. Quippè non diù post Muliercula nostra in Gonorrhœam incidit effectibus stipatam, quos enunciauimus. Summa itaque vrinæ ardorem potius esse indicium Gonorrhœæ complicatæ, idest virulentæ, quæ è *Lacunis Vaginalibus* depluit, quàm Simplicis, quæ è *Vagina*, vt cuilibet consideranti patefcet. Signum autem posterioris tutissimum est vlcus (nempè vt cum *Sênerto* monuimus) cuius præsentia, pessarijs inuestigatur. *Cognoscitur vlcus, hoc* (sunt eiusdem verba) *primò ex colore & perpetua eo in loco mordicatione, quæ sensim augetur & intenditur, atque imprimis, si tangatur, vel aliquid abstergentium & acrium, uti acetum, sal, limonius, citrinus, similisue succus: itèm vinũ, hydromel, aut huiusmodi alia immittuntur, ut & in concubitu. Rursùm [pergat] etiàm cognosci visu possunt hæc vlcera, præsertim adhibito Matricis speculo. Tertiò ex affluente pure, quod interdum, est odoris expers, interdum flauum, viride, fætidum, prout vlcus nunc mite est, nunc sordi-*

sordidum, cuius etiã pars interdũ permixta emingitur, interdũ, & si vlcus grandescat, etiã sanguis effluit, & potissimũ ubi mensium fluxus instat. Denique instar omnium, quãtũ Ulcera, tũ Gonorrhœam, huiusque species indicare valent, est Ægræ confessio; vel, quoniã cum sexu agendum est naturã fallace, præstabit, cum debita tamen cautela & prudentiæ norma, Domesticas aut Uicinas mulieres sciscitari de anteaçta illius vita, vt, cuius gregis fuerit, aut contubernij, nũm moribus liberalioribus, an secũs vixerit &c.

III.
Prognostica

Observatio.

Quod attinet prognosim: illud esse debet de Gonorrhœâ iudiciũ, vt plus damni afferat extrario corpori, cõmunicata, quãm ei, cuius est passio. Sic ego Nonariæ cuiusdam reminiscor, quæ vtut à triginta annis amphidromiam ageret, ac marcida Gonorrhœa sua plus centum Amasijs infecisset; nil tamen, præter Eemicraniam & cancrosum in *Labijs Pudendi* vlcus patiebatur. E conuerso obseruaui magna familiarum clade apud Nostrates puellas inquinatis Viris cõiunctas vno aut altero à nuptijs anno Luevenerea occubuisse. Quamobrẽm verò pellices ex virili Gonorrhœa citiũs intereunt, quã

quám sua ? An , quòd Mas præpolleat foeminae , quòd , iuxtà tritum sermone prouerbium , hæc materiâ sit imperfectiore ? An est , quòd vitiatum semen virile actuosius reddatur *Vaginali* recremento similiter putrefacto ? An (id nequaquám falsum est) muliebrem Gonorrhoeam perpetuò expurgari , virilem autem absorberi à vasis , cum præsertim in actu *Venero* patefiant , eorumque spiracula appetitu libidinoso dilatentur ? Quid ? quòd hæc ita interdum hiant , vt obiter maschile virus exfugant , tùmque nullo patrato vlcere , ac sine præuia Gonorrhoea mulieres in Tabem , imó & ignorata causa in mortem præfocentur . Missâ , de quâ nondum loquendi tempus est , Lue ; quoties sonticam illam puris suctionem considero , venit in memoriam alius morbus eadem Lue non minús funestus , nempe Vomica Ovariorum : quæ á paucis animaduersa impune grassari , & quia impunita sæpius mortem inferre cõperta est . Nam quot ego dissecai mulieres citrà aliam manifestam causam extinctas ? Obseruaui etiàm in his talem Vomicam alterutrum , aliquandò vtrumque Ovarium occupasse : de quâ sanè quoniam , vnum si demas *Panarolum* , nemo , quod sciam , hactenus

Observatio,

nus mentionem fecit, eius proinde origo paulò altiùs est repetenda. Constat ex Anatome Hypogastricas arterias, quæ á lateribus *Vaginæ* ad superiorem istius partem ascēdunt, superato Vtero, ad Falloppianas Tubas, atque ad Testes, siuè Ouaria, terminare. Harum igitur meatus si contingat virulenti quidpiam excepiſſe, nonnè patet id ad eosdem Testes denique transmissum iri? Admittitur autem facilè, siquidè perbreue est iter à Nerueâ eâdemque interiori *Vaginæ* membranâ ad dictos poros: vndè adeò liquet appulsis illuc miasmatis venenosis, quatenus ætheris consuetus fluxus intercipietur, eatenus colliquamenti in Ouulis contenti crassim inuertendam esse; fluidas nimirum moleculas secus quàm antea gyrandas, solidasque ita cum dictis miasmatis congressuras, ut sulphuribus eleuatis atque Quorum peripheriâ ampliata, sanguinei ductus prius ex-tenti, urgente post diutinâ fermentatione tandem àbscindantur, & inflammatione, parta Ouaria ipsa apostemate periclitentur. Quòd autem id materiæ nusquam abscedisse aduerterim, verum vlcere clauderetur, quod vel in prægrandis hemycicli formam attollebatur, vel in duos, tres, aut quatuor diui-

diuidebatur, in causam argui ipsius-met contenti puris inertiam, quòd nimirum mera esset corrupta lymphæ dictorum Ouulorum nutritioni & conseruationi dicata. Coeterò nullum aliud grauius symptoma foeminis hanc Vomicam patientibus obuénisse memini, præter febriculam; quæ ad annum, sæpè etià diutiùs continuata miseras exstinguebat. Propter quod sanè monere hìc teneor Medicos hoc genus morbi diligentèr inuestigent, cum primis saltim febrem illam palparint, cuius causam haud clarè elucescere comperient, de *Venereo* aliquo contagio interim suspiciosi: norintque protinùs talè morbum crebriùs contingere, quàm vt à Practicis atque ab Anatomicis animaduersum est, cachecticis nimirum foeminis, & grandioris æui.

Sed iam à diuerticulo in viam. Nota igitur, Palestricarum, quæ corpore quæstum faciunt, paucissimas cauere à fascinis inquinatorum, adeoque tum ex hoc omnes *Venerea* lue funestari, tum ex eo præsertim, quod illarum vlcera plerumque sint immedicabilia. Profectò namque, vndè, istorum sanationem speres, si hinc [nempè quoad interna] arteriæ ibidè desinèntes teretiores sunt, quàm vt remedia conuheat vel decuplo mino-

ra

IV.
Prognosis
vulcerum.

ra veneno contento. quamobrèm nihil aliud
 audent raro hoc salium medicatorum ag-
 mine, nisi vt vlcera exasperent, pus ingemi-
 nent, afflictisque afflictionem addant potius,
 quàm adimant: indè verò (externè) perindè
 est, atque (Ætiopè, vt aiunt, velle dealbare;
 cùm nimirùm viscatum altè in *Vagina* cel-
 lulis) tùm adiposis, tùm & membranosis su-
 pradiçtum pus, quasi Erycinum mel, neque
 omnibus, vt sic dicam, torcularibus ab eiuf-
 modi fauis exurgeri queat. Mihi certè foe-
 minarum, quas ista vlcera foetentes tam ali-
 bi, quàm in Archiospitali numerosissimo
 vltra mille licuit aduertisse, neminem inue-
 nisse vspiàm obtigit, quæ pro integrè sana,
 iure aliquandò fuerit renuncianda, remedijs
 quibuscunque ad hunc finem adhibitis non
 obstantibus, & si excipias aliquot, quæ per
 Os & Mammæ internè fuerant irrumatæ.
 Quippè istiusmodi vlcera recentia, vel su-
 perficiaria *Mercurio* internè quouis modo
 assumpto facilè obtemperabant: non sic inue-
 terata, aut ex coitu contracta. Quamobrèm
 ægrè ipse virulentam Gonorrhœam suscipe-
 rem extirpandam, saltém citrà vsum reme-
 diorum, quæ *Venerream* luem extinguunt.
 Etenim secus, idem est, atque aquam in mor-
 tario

Observa-
 tio.

tario, vt aiunt, tondere: quin imò aduerti
foepiùs, summis etiàm *Antiueneris* non obf-
tantibus, tandiù obsoleta vlcera ad cicatricē
perduci nunquàm potuisse; tantùm mitigata,
& siccata fuisse sic, vt Gonorrhoeâ parciùs plo-
rarent. Si verò vlcera (loquar cum doctissimo
Sennerto) diuitiùs protrahantur, aut negligentius
curentur, in fistulas abeunt, atque interdum
etiàm in gangrenam. *Vaginales* namque par-
tes, imprimis *Pudendi* Labia, laxæ sunt, seù
porosæ, ac minimi diametri arteriolis irri-
gantur. proptér quod facilè exeduntur, &
probo sanguine, competenti scilicèt nutri-
mento, seù anima carnis, destitutæ [quod ne-
cessū est contingat in vlceribus iàm antiquis]
flaccescere, marcescere ac mortificari debent.
Postremó *Verrucæ* & reliqua virulentæ Go-
norrhoeę proles, vt parens, firmæ sunt incor-
rigibiles. De sanie autèm, siue Gonorrhoeâ
quod in totum dixerim: alba & flaua non
ità infausti ominis sunt, atque viridis, liuida,
serosa. Quippè in illis sanguinea crasis lau-
dabilis est, in his virulentorum, seù vitrioli-
corum, aut acido-fixorum salium luxuries
arguitur.

I.
Indicati-
ones. cu-
ratiuæ
Gonor-
rhoeæ
simplicis

COLLIGE iccirco operæ præcium esse Muliebrem Gonorrhoeam nondum adultam in ipsis fascijs suffocare: pro quo Medicus ad duos scopos collimare debet; alterum, ut sanguinis ad *Vaginam* affluxum refrenet, sicque fermentationem placet, inflammationem impediat; alterum, ut iam factæ fibrarum lacerationi prouideat. Priori indicato satisfaciunt imprimis *Euacuãtia* vniuersalia, *(sanguinis nempe missio & purgantia)*, vtraque debito loco, modo, ac tempore administrata: scilicet quod primum: *V Sectio* in brachio celebranda venit ad maiorem revulsionem; quo nomine [ut hoc incidenter notem] non est profecto, cur me rideant *Hæmophobi* asserentes sanguinis motum ubique æqualem non posse aliquorsum magis, quam aliorsum determinari, idest ad brachia potius, quam ad pedes, Quandoquidem, missis experientis contrarium ostendentibus, de quibus fusè in nostrâ *Dis. A. 2.* patet hoc vel in siphonibus, per quos exsucto aere intus incluso, hauritur interdum totus humor in cupâ V. g. contentus: nec est, quod allegetur discrepantia inter fluida quæ mouentur, & fluida non mota, obyciaturque fortasse, quod in *V. Sec.* non atra-

atrahatur sanguis, idest exsugatur. Quippè, quod prius; tendentia liquoris ad siphonem non ex motu pendet, aut quiete; sed immediate potius ex dispositione successiva particularum ipsius liquidi, cuius adeò ratione aliæ alias sequi debent; mediatè verò à Pressione aliqua externa, vt ab aere in exemplo supracitato, quemadmodum nempè cum *Boyleo* norunt hodierni Physici omnes. Quamobrèm in nostro casu etñ sanguis à Corde quoquouersum æqualitèr didatur, quoniàm tamen idem integrantes partes habet seriatim, seù per columnas, dispositas, sequitur, vt quò aliquæ interdum vergere incipiunt, eò mòx aliæ anhelent, sicque in ea parte maior sanguinis occurfus fiat, hoc est maior deriuatio. Quod attinet suctionem: hàud opus est fluidis extrorsum motis huiusmodi attractione, cum nimirum ad illorum exitum sufficiat vasis apertura, vt est manifestum. Liquet totum hoc etiàm vulgari experimento in poculis amplioris orificij; quæ si ad amissim impleas, modò labra sicca sint, videbis affusum plus vnâ lineâ interdum superare altitudinem eiusmodi labrorum: humectatâ deindé istorum aliquâ parte, egredi, sic, vt iidem cyathi plus vna altera lineâ de-

pleantur : id videlicet , quod docere debet negantes particulas sanguinis sibi vicissim obsequi , eiusdemque columnas pergere iter sibi alicubi monstratum , quòcunque duxerit . Uerùm de his satis . *Purgantia* quod spectat & exhibendi modum ; non refert quà , & vndè euacues , per superiora ne , an per inferiora . Quippè , cùm materia *purgationis* plerùmque sint ferositates , hæ , quòcunque demùm adigantur , nec fermentationem stimulare , neque inflammationes parere valent . Sed oppones , in *Catharsi* saltèm determinari sanguinem ad ea loca , ad quæ serum declinat : nec renuo . impellitur namque is ad Intestina per arterias Meseraicas , quarum Superior , sicuti paulo suprà Emulgentes ab Aortâ egreditur , ità maiorem aliquandò sanguinis copiam nacta cœteras inferiores [quas intèr veniunt Hypogastricæ *Pudendis* consulentes] eodem liquido defraudat : atq; hæc profectò causa est , quòd à purgatione parciùs mingitur , segniùs errigitur , crura debilitantur &c. . Non ergó , inquam , refert vndè euacues . at , quoniám cum *Emeticis* cautè mercandum , maximè quùm ipsorum vsus nullatenùs est indicatus , præstat *Cathartica* vsurpare , imprimis verò validiora ob
tatio-

rationem iam allegatam. Vltimò, quoad tempus: non competunt hæc vniuersalia Grauidis, & quibus menstruus fluxus instat; id nimirum, quod vel ipse muliercule nouerunt. Iamque succedunt Generalibus particularia, idest Specifica, inter quæ primas obtinet *Mercurius*. Hoc enim firmiter tenendum, muliebrem Gonorrhœam, vtcunque simplicem, absque illius tamen interuentu nunquam cessare: & ratio est, quia cum morbus is sit lymphæ ad *Vaginales* Glandulas amandatæ, nisi iccirco aliquid superueniat, quod alkalico-fixum (cuius indolis perhibetur esse *Mercurius*) acido-fixas illius moleculas superet, frustra allaborabitur. Consultum propterea fuerit *Mercurium* [qui siue crudus, siue aliquo qualicunque modo præparatus sit, parum interest] ipso ab initio præscribere eundemque tam per se [interiectis tamen semper purgantibus] de quo modo alibi] quam ijs ipsis purgantibus maritatū, veluti sub hac formula.

4. *Mercur. crudi Succo Limon. & Theriebenth. extinct. a 3ss. Rhabarb. elect. puluer. & Scammon. præp. a 3iij. M. f. pilul. Dos. a 3ss. ad ʒj.*

Tertio loco veniunt *Diuretica*, ea videlicet, quæ, iuxta *Taury*, doiuent coaguler la,,

„partie fibreuse & ralētir le cours des humeurs ; suntque imprimis acida temperata, vt *Acidula : Decocta refrigerantia* ex herbis *Acetosa, Malua, Bismalua &c. Hordeata ; Emulsiones ; Succi Limonum, malorum Citriorum, Fragarum : fructus Alkekengi : Sallia Nitri, Saturni, Prunella, Christall. mineral : Spirit. Vitrioli & sexcenta alia. Vbi adeò licet aduertere acria omnia, vt Spirit. Therebentin., Cantharides, Millepedæ, Radices aperientes & his similia in vsum non esse vocanda proptèr nimirum fermentationis atque in glandulis *Vaginalibus* phlogoseos augmentationem, quæ nullo negotio succederet, sanguine ab eiusmodi acribus insolentiùs agitato. Quartò ad hæc etiàm offendicula vitanda faciunt *Narcotica* : nec referam quàm benè hæc sæpiùs mihi sunt lenocinata ad maiorem inflammationem indè compefcendam. Denique posteriorem scopum supradictum assequuntur *Balsamica* tam intrinsecè, quàm extrinsecè vsurpata, in quorum classe censentur *Colocynthis, Therebentina, Balsama de Perú, Copayua, & alia plura. Hæc enim intestinum sanguinis motum domare, fibrarum atoniam impedire apta sunt, vt & Incrassantia, nec non Ad-*
*strin.**

stringentia pleraque, & quorum sanè catalogum hic attexere non vacat. Locus nunc verò postularet, vt adducerem solemnes formulas, quibus recitata auxilia in vsum vocari consueuerunt. Verùm ex siquidè apud Authores vbique prostāt, cramben, vt in adagijs est, recoquere non iuuat. Quin etiā meliùs actum iri ducerem cum morbis *Veneris*, si minùs receptarum vulgi manibus teneretur. Harum etenim occasione factum est, vt Barbitonfores, Unguentarij Nugiuenduli, Agyrtæ omnes illorum curationem ducant suam, Medicis nihil interesse prædicantes externis defluxionibus prouidere, imò & in hac parte ignaros palam edicentes: ac neque interim tamèn aliud præstant, quàm vt exhaustis Penuarijs, crumenis emunctis, morbo exasperato, cadauera linguant Medico piè visitanda: insupèr & si hæc denique ad sepulturam deferantur, mortis causam in ipsum Medicum refundant. Præscriptionū ergo Medicarum si hic est exitus, expedit potius silere, quàm docere, Medico nihilominus quæ gerenda sint ex ijs, quæ diximus, facilè comprehensuro, interim, & nobis plura adhuc ad eandem rem sequenti capite allaturis.

Quod

II.
In Go-
norrhœa
virulenta

Quod Gonorrhœam virtulentā : hæc tametsi in Prognosi pro insanabili renunciata fuit, auspicijs tamen suis haud est derelinquenda. Metus namque foret, ne, hinc peierante ulcere, Gangræna; indè autèm vitiato Sanguine, Lues *Veneræ* ad fores esset. Quamobrèm ad vtrunque arcendum videntur mihi concurrere debere hæ duæ aliæ indicationes: sanguinis ab acido præservatio, &, per consequens, illius ulceris deterfio: quarum alteram exequabit *Mercurius* eo, quẽ attulimus, modo exhibitus, alteram *Iniectiones* de quibus vnum atque alterũ exemplum subijcimus. Nam initio, quùm pus loturæ carnium simile apparet, atque vredo *Vaginam* occupat, locum habet ista.

¶ *Hord. integr., Lenticul., Ros. rubr., Balau-
stiorum a. p. j., mellis parum Coq. in aqua
fontis.*

Colaturam iniice in *Vaginam* muliebrem, aut, si *Lacunis* opitulandum, in meatum vrinarium: immitti huc etiàm possunt *aqua hordei, Lactucę, Portulacę, Serum lactis acidulatum* atque id genus alia ad vrinæ ardorem indicata; *infusiones* itèm aliæ detergentes, mundificantes &c., quales proximè daturi sumus. Verùm pro *Clitoridis, Nympharum*

rum, totiusque exterioris *Pudendi* inflammatione, quæ in principio Gonorrhoeæ vel maxime contingit, sufficit foueatur ista pars vino, in quo furfuris *triticei*, & ligni *guaiacini* non nihil ebulliuerit; interim verò turunda linea sicca quotidie crassior facta in *Vuluam* immittatur, detracto etiam ex *Basilica* utrâque sanguine, si opus fuerit. Sedatâ inflammatione, quum pus serosum erit, sequens iniectio magis conferet.

℞ *Radic. Aristoloch. rotund. ʒi.*, *fol. cichor. cum toto*; *summitat. Absynth.*, *Centaur. min.*, *Hyperic.*, *Hyssop. a m.j.*, *fol. Marrub. Consolid. mai.*, *Ireos florent. Iacea*, *sinè herba trinitat.*, *Myrrha a m.j.*, *Mell. parum*
Coq. in vino rubro.

Sed quocunque iniiciantur hæc decocta, tam in *Vaginam*, quam in *Vrethram*, necessum est antea tepescant metu Gangræne, quæ in his partibus ultro excipi ab ulceribus solet. At si callosa fortè fuerint hæc ulcera, atque in loco ad quem sicca remedia insinuari queant, præstabit adhibere seq: puluerem.

℞ *Auripigment.*, *Tuthia*, *Mirra*, *florum Sulph.*, *Aloes a ʒj.*, *Virid. aris*, *Sarcocoll.*, *Calc. viua bis*, *aut ter lota & siccata*; *Alum. crud.*, *Rosar rubr.*, *Balausti.*

H

a. ʒ. j.

a. 3. j. m. & f. pulu. subtiliss.

cuius dimidia pars excipiatur balsā. *Sulphur. Therebent.*, *Succi Plantag.*, & olei *Hyperic.*
a 3 j. Therebent. laric. q.s. vt f. vnguent. Reliqua medietas inspergenda erit vlceri, & desupèr applicandum modò dictum vnguentum; cui etiā addi poterit parum *Mercurij* præcipitati, albi, aut rubri pro magnitudine affectus. Sic enim vlcera, quæ in loco humido [qualis est *Vagina* muliebris] aqueis vnctuosisque remedijs morem gerere non volunt, eiusmodi pulueris adspersione refrænabuntur planè. His non obstantibus, si Gangrænæ vel minima suspicio detur, consilium erit, ei opportunis auxilijs quā ocysimè prouidere.

III.
Cura accidentiū
eiusdem
Gonor-
rhœæ.

Quod remanet de Pruritu, Pustulis, & Furfuribus; his optimè succurrisse comperi sequentem iniectionem.

4. Mercurium dulcem; solve in aq. calcis, Plantag., Rosar. rubr. anat. quantitate ac vtere.

ac postremò Verrucæ, & Condylomata tam interna, quàm externa tangi poterunt spiritu aliquo acido, vt *Spiritu Nitri, Vitrioli, Sulphuris*, & quidem semel de die, donec eiusmodi tubercula corrofa fuerint, vel ceciderint exsiccata. Alitèr etiā curantur tales excre-

excreſcentiæ , per applicationem cerati de *Ranis* duplicato, triplicato aut quadruplicato *mercurio* . Enim verò! hæc Topica , qualia-
cunque ſint , minùs proderunt , niſi curatio
per interna inſtituatur , Vnicum enim mer-
curij granulum aſſumptũ plus faciet , quàm
centum Topicorum inutilis conatus.

His ſic , imò ad aliam quamlibet , etiàm
magis exactam , libellam adminiſtratis , ni
tamen victus ratio ſeruetur , factum infectũ
erit , Conſiſtit autèm talis ratio in Gonor-
rhœa ſimplici , ſiue recenti , vt res non natu-
rales ad eum finem ordinentur , ne ex ijs
ſanguinis motus excandeſcat . Quamobrèm
exercitia corporis paulo vehemētiora , equi-
tatio , ira , libido , aromatica , falſa : vina præ-
fertim generoſa , vigiliæ & alia id genus omni
ſtudio vitanda . è contra amplectenda alia ,
quæ eundem motum remorantur vt quies ,
modestia , acetofa , apozemata ex herbis re-
frigerantibus parata , ſomnus &c. in Gonor-
rhœa verò virulenta , vt praua ipſius ſangui-
nis diatheſis , videlicèt eiſdem condenſatio
à ſaniſſis miaſmatis in venas iàm introduc-
tis facta per ipſam diætam emendetur : vnde
eſt , quòd quæ conducere diximus in priori ,
in hac Gonorrhœa penitus ſint fugienda &

IV.
Cura di-
ætetica.

præsertim acida imprimis vitriolata, nitrata &c.. Quippè comperi ex istorum usu Gangrænam in *Pudendis* fuisse acceleratam: ex aduerso vinum, aromatica, ac præ cœteris diaphoretica ad ipsius mitigationem summo perè contulisse.



CAPVT TERTIVM

DE MENTVLARA

PROLVSIO.

I.
Argumē
tum.



ACTENVS de Morbis, qui Sexui sequiori contingunt ex Uirorum amplexibus iusto frequētioribus, aut aliundè pollutis: ordo nunc, postulat, vt alios expediamus, quotquot his vicissim obueniunt ex confortio Mulierum aliquo, vel pluribus é dictis Morbis infectarum. Sed hoc tamen commercium siquidè ab ijs Uiris vnico instrumento, quod voce tenùs *Mentula* est, exercetur, consentaneū fuerit, priusquàm de eodem differamus, aliquid circa istius fabricam præmittatur.

Diuidi-

Diuiditur *Mentula*, *Colis*, *Virile membrum*, *Penis*, aliquandò *Virga* &c. nuncupata in, *Externam* & *Internam*. Illa, pars est *Penis* membranosa, siue eiusdem *Capfula* cutanea, propter duplicaturam admodum volubilis, quæ dicitur *Præputium*: hæc reliquis particulis componitur, de quibus inferiùs. Ergò, quòd impræsentiarum; *Cutis* quota quanta *Penem* obtegit pervulgata vsurpatione *Præputium* est, quod in aliquibus protractum, in alijs tam curtum adspicitur, vt vix quidquã obseruare sit nomine *Præputij* dignum, *Penisque* semper *Glande* nudo subsistere debeat ex quo & *Apellæ* iidem nominantur. Constat hoc *Præputium* *Cuticulâ*, *Cute*, & *Panniculo* carnofo. Nam *Cutis* *Fibræ* vsque ad eiusdem *Præputij* extremum, vbi incuruantur, seu duplicantur, *Cuticulâ* tectæ sunt, adeoque sensu minús exquisito præditæ: vt verò introrsum, sicuti diximus, concesserunt, palam prostant spoliatae, videturque ibidem *Præputij* superficies quasi interior pars *Vaginae* muliebris. Vnde optimè *Craanen; Putamus*, inquit, *fæminam esse inuersum masculum*: *Scrotum masculi fieri Uterũ intus conuersum*; *primordia Penis sunt Clitoris* (addo ego) & *Præputiũ interius Vaginam simulat*. Reuera namque

Præputium quid est aliud, quàm *Uagina Peni* intùs absconditi, siuè eiusdem capsula, vt diximus? Coeterùm tales fibræ sese tandèm *Nervosis Corporibus* iuxta *Coronam* inferunt; atque vbi desinunt, exoritur membranula, quæ rara est, sed firmitèr admodùm *Glandē* protegit. Triplex itàque in *Pene* tunica inuenitur: vna ruida & spongiosa, quæ *Præputij* externam faciem præbet, densior altera, sub-rufa & complanata, quæ intrinsecam eformat: vltima tenuissima & æqualis, quæ propriè continuatio est fibrillarum *Præputium* componentium: dic alitèr; *Colis* vnicum esse tegmen, quod tribus in locis itidem trifor-me appareat.

III.
Usus hu-
iusmodi
Obser-
uationis

Idcirco autèm hanc locorum differentiam duximus adnotandam, quòd ex *Lucretio* — *Non omnis fert omnia tellus,* & iuxta *Theocritum*,

Illà quidèm præducit hyems, hæc educat æstas: hoc est, quia aliæ in *Præputio* fiunt labeles, aliæ extra *Præputiū*, & rursùs quædã gignuntur in *Glande*, quæ in ipsius *Corona*, aut *Freno* minimè germinascunt. Etenim præter structuræ varietatem adnotandi veniunt ductus roriferi, qui in ijs membranis aut exilimi sunt, vt in *Cute* externa, ibidemque transpirationis

nis materiam exonerant, aut crassiusculi, ut in interiori *Præputio*, ubi adeò olidam illam ferositatem deponunt, quæ mox in fumen quoddam, siue smorchiam tartarosam condensatur; suntque omnes arteriolarum capillarium ultimæ finitiones. Qui igitur neget ab huiusmodi differentijs multum etiã varietatis inter affectus prædictarum partium non allatum iri?

Quare ut hoc intimiùs pernoscat, operæ præcium est, missis, quæ circa internam *Colis* partem heic obseruanda forent, statim procedamus ad discussionem affectuum memoratorum, saltèm et ne centones, ut in adaggijs est, sarcire velle videamur nèue ordinem inuertamus Orationis, quem præfiximus. Sit itaque iam-

IV.
Diuisio
Capiti.

ARTICVLVS PRIOR

*De Affectibus Partium Obscænarum,
Siue
Genitalium Exteriorum in Viris.*

§. I.

Factâ igitur *Penis* in immundam *Vulvam* intromissione, si *Pus* externè *Præputium* suffuderit [quod nimirum eueniet potissimùm, quando

I.
Morbi
Præputio
extrinsecè
cōtingentes.

quandó id eijcietur è *Lacunis*] & suapte natura fixum. aut præ frigore, aliâue huiusmodi ratione tepefactum vltra Epidermida transire nō valuerit planū est ipsius scilia vbi post, iuvante calore *Penis* consueto. siue aliâs insolito (quemadmodum in Ereptione) in actum fuerint exerta, rotatura sese pedetentim per illius poros, lineasque exaratura esse, quæ Rhagades vocitantur, totam aliquando *Præputij* iuperficiē præfatā excoriaturæ. Quod si fuerit minús crassum, in tali casu quoniam rigidæ eiusdem moleculæ inferiùs in Mucosum Corpus descendunt, eæ propterea ab aqueis istius Mucci particulis dilutæ ac solutæ [quod actuari est] cum affluente vndique transpirationis materia vires experientur; atque adeò inflatis ab hac fermentatione talis mucci filamentis, perpendiculares, quæ Cuticulam Cuti annectunt, fibræ disrumpuntur, hisque abruptis Cystis efformabitur, quæ aperta in vlcus denique faceffet. Si verò, demùm fuerit ita volatile illud pus, vt gliscere valuerit in subiectam Cutim, liquet ipsius scilia mōx ad statutum tempus [nempè vt à *Venereo* Calore, aut ab alia quâuis causâ fuerint excitata] erosura protinùs illius fibras, aut ambientia duntaxat capilaria vasa:

&

& si primum; vlcus ibidè m necessario factum iri ; si alterum , aucto nutritij succi pro- uentu , tales fibras ità denique foecundandas esse , vt in tubercula duriuscula excrescant , idest in Verrucas .

Nunc ad interiorem *Præputij* superficiem descendenti redit in memoriam , quod suprà de analogiâ eiusdem partis cum *Vagina* muliebri latum est : parem nimirum esse vtri- usque substantiam ; internam quasi nerueam indèque sensu exquisito præditam , externã plerumque membranofam , raram , laxam , & fibris carneis secundum longitudinem ex- currentibus donatam : prætereà in internã facie glandulas extare minimas disgregatas è finibus arteriarum capillarium in dictam nerueam superficiem hiantium resultantes , à quibus etiã humor homogeneus vtrobi- que emanat &c. Quamobrè m non abs re di- xerim in Coitu *Præputiũ Præputio* indi , poros poris necti , oscula osculis ; quod non inele- gantè r *Scaliger* significauit hoc carmine:

*Corpore disiuncto totum est in corpore corpus ;
Ipsa anima insinuata anima : nec sola manere
Quit ; sed se applicat & cæcis compagibus hæret.*

Iamque in tali cohæsione solito magis di- latantur prædicti pori ; quatinus fibræ eodẽ

J

tem-

II.
Morbi
intrinse-
cùs affli-
gentes.

tempore rigescunt, siuè intenduntur magis: vnde adeò fit, quòd tùm etiàm latiùs alter alteri inspiret; & *Vagina*, Ex. gr., effluuia sua fusiùs *Præputio* communicet. Ad quod non parùm etiàm confert perspirantis materiæ subtilitas eo imprimis tempore, quo proptèr sanguinis accursum motumque insolentiorè *Vaginale* recrementum debet esse summè attenuatum. Haud refert tamen in nostro casu fixum ne sit, an volatile, quod virus à foemina emittitur in *Præputij* internam partē. Quodquidè scilicèt proportio pororū istius cum poris *Vaginæ* muliebris, eiusdem prætereà veneni homogeneitas ad humorem exsilientem è præfatis poris, calor denique *Præputij* in oestro *Venereo* ingens factus, humorum per consequens rarefactio, meatuum dilatatio &c. vltro inferuiunt ad memorati virus insinuationem. Adde nunc istius copiam è *Lacunis vaginalibus* præcipuè erumpentem, quæque rectâ in *Præputium* ferri solet; & cum istius plicæ scopis (vnde & Coire Italis *scopare* est) assimilentur, aut cutaneis circūuolutionibus *Vaginam* abstergentibus, vt patet. Quibus sicstantibus: qualiscunque muliebris Gonorrhoeæ portio intrinsecam *Præputij* faciem impetat, certum est ipsam facile

lè in istius glandulas penetraturam: vndè est porrò, quòd ab acidis eiusdem moleculis constricto isthuc appellente succo, sicuti serosæ partes postea dimissæ fibras relaxabunt, ita bullæ eleuabuntur diaphanæ, crySTALLINÆ dictæ, quæ in summâ metâ (quò videlicet idem serû longioribus ac proindè validioribus, quàm in latera, columnis arietabit) diffractæ in vlcera transibunt. Pangentur etiàm vlcera, si in dictis glandulis fixato tali recremento earundem peripheria sic postea ampliabitur, vt disruptis ambientibus tenellis vasculis phlogoses inducantur, atque ab his deniq; suppuratio, seu abscessus. Germinant in hac parte demùm etiàm Verrucæ, nec secus planè, quàm easdem produci in *Vagina* muliebri suprà, cap. 2. demonstratum est: vndè non libet hic ipsarum originem denuò præstolari.

Quod spectat *Frænum Glandis*, *Coronam*, atque ipsum *Glandem*: excoriatur illud, si proprio, quod nimirum pus ex *Urethrâ*, vt in *Gonorrhoeâ*, aut è *Præputio* alicubi cariato deciderit; exulceratur autèm, si alieno, hoc est muliebri, perfusum fuerit. Quippè in hoc casu, factâ in glandulis, quæ ipsum *Frænum*, vt & interiùs *Præputium*, humectant, affluentis liquidi condensatione, bullæ eleuabun-

III
Labes
Fræni,
Coronæ
& Glandis.

Obscenæ.

IV.
Acciden-
tia Veru-
carum, &
Excoria-
tionum.

tur illæ cryſtallinæ, quas ſuprà nouimus
vlcus poſt ſe traxiſſe. Similitèr *Corona Glandis*,
atque vltimò hic ipſe *Glans*, ſi extra-
rijs ſordibus fuerit delibutus. Aduerti autèm
crebrò in aliquibus, qui ob nimis citam ſe-
minis eiaculationem [quod vitium Italis
preſertim tribuit *Ettmullerus*] ſtatim retracto
Pene, cuius *Glandem* vix medium in *Wluam*
ſordidam introduxerant, obueniſſe nihilo-
minùs illi parti innumeras bullas diapha-
nas, paruas [etenim glandulæ in tali loco iti-
dèm puſillæ ſunt eòque minores, quò pro-
piùs culmini accedunt] & quæ poſteá eua-
cuato ſumine, quod liquidum & albeſcens
in maiori etiàm, quàm aliàs, copiâ redun-
dabat, ſenſim anihilabantur, *Glande* interim
ac *Præputio* tunc apprimè rubentibus; in re-
liquum autèm ne minimi quidèm vlcuſcu-
li veſtigio alicubi, ac neque ad *Frænum* [vbi
tamen ampullæ illæ depleri videbantur]
apparente.

Ultimò, quod *Scrotum* [hoc etenim quo-
què intèr *Obſcæna*, ideſt *Genitalia externa* ve-
nit computandum] quoniàm ſordibus ex
Vrethrà, aut aliundè deciduis foedatur non-
nunquàm, ſiue humectatur, abraditur idem
iccircò, & quandòque, excoriatur. Luri-
da

da quippè falia cùm iàm valdè tepeſcant vbi ad illud peruenerunt, non poſſunt ità exaltari, vt in ſubiectas tunicas penetrando vlcera inſtituere valeant, & cùm inſupèr deorſum tendant, neque demùm ibidèm humorem aliquem opperiant, à quo diſſoluantur.

§ 2

IAmque ob priorem cauſam, quòd nempè ſanies iugitèr per decliue feratur, huius qualifcunque portio ab excoriationibus exterioris *Præputij* dimanat, ſpiras deſcribere, aut rectas lineas conſueuit: vlcera itèm non multùm excauantur, neque callo denique obduci ſolent. Carnei quippè vuilli in eâ parte laxi impares ſunt nutritio ſucco coercendo. quamobrèm etſi deciſi tumeant extremis oris, interfluente nihilominùs iugitèr illo, nunquàm conniuebunt, ipſorum capita nunquàm conglutinabuntur, nunquàm obfirmabuntur, adeoque tandèm nunquàm occalleſcent, vlceribus nihilofeciùs, quod de profunditate demitur, latitudine (quam ſubindè indipiſcuntur) vltrò & cum foenore compenſantibus. At Verrucæ nodos in tali regione vtplurimùm æmulantur, tubercula nimirùm lata, rotunda, parùm eleuata, at-

J.
Acciden-
tia Vlce-
rũ in Præ-
putio ex-
terno.

que in tali demùm quantitate, vt *Mentulas* quasdam adspexerim Tyrſis æquiparandas, *Hæcſteteri* Bromijs vel monſtroſiores.

IJ.
In *Præpu*
tio inter-
no .

Sed ad Vlcera differentias reuertendo: eorum quotquot interiori *Præputio* adnaſcuntur, caua ſempér ſunt & calloſa, ob rationem ſcilicèt ſuperiori contrariam. Etenim eadem expurgari affatim nunquàm poſſunt. quia pellicula, ſub quâ bulla [vlceris parens] turgere incipit, vtpotè multo compactior Epidermide exterius *Præputium* amiciente, nonniſi ferò diſrumpitur: deindè etiã quia eadem cuticula duntaxat in medio, vbi puris columnæ cèu altiores itidèm magis cogunt, effringitur; quare vt pertuſi quaſi operculi vices repræſentat, ita exeundi copiam adimit puri ab intra ſalienti. Et proſectò: hoc amuſſatim [vt quod aduenit abeat] è foraminulo illo medio nunquàm exigeretur. Lacunatur iccirco interiùs, eroſiſque primoribus, ad intimiores fibras penetrat, ficque fermentando, turgendo, erodendo Scrobiculos denique ſuffodit profundos, adſpectu rubros, ſanioſos. Nunc, quod callum: huius ratio retorquenda venit rursùs in dictam, pelliculam, quam nimirùm nouimùs longè arctiori ſtructurâ præditam, quàm exterio-
rem

rem suprà citatam. Dic igitur de illo, quòd membranofæ, veriùs ligamentofæ [vt quæ carneas Panniculi *Præputium* componentis excipiunt] eiusdem cuticulæ fibræ, sicubi interdum fuerint arosæ, se se ibidèm, ceu fides, contrahant, contractę coesâ in parte tumeant, hinc aliæ alijs strictiùs hoereant, cutemque ipsam adhuc densiorem reddant: nutritivs autèm succus, quoniàm tali fibrillarum, aut saltim capitulorum eiusmodi cohæsione prohibebitur, ne vltra influat per illarum interstitia, quotus quantus eó proueniet, totus velut ad aggerem sistatur, viscidisque suis filamentis tales apices conferruminet, consolidet, conglutinet tanto firmitus, quòd inspiratus à proximè fermentante pure ac vitriolicis istius salibus impregnatus coaguli quandam, veluti glaredinis, speciem inducat. Hinc itaque turgescentiâ, illinc duritie comparatis ad extremum vlceri corona quædam quasi carthilaginea imponetur. Atque hæc quidèm corona, siuè callosus ambitus in causâ est plerùmque, cur vlcera talem interiorem *Præputij* tunicam occupantia phlogosim perpetuò faciant. Nàm, si profunda sunt, intèrque senescendum ligamentofas carneasque fibras terebrant quotidie magis, quid rema-

remanet, nisi ut nutritiuo succo, lymphæ, omnique omnino sanguini vijs interclusis, hunc è vasis suis depellant, nisi ut fibrarum interstitia oppleant, quid, inquam, superest, nisi ut *Præputium* inflent, inflamment, extendant, totique demùm *Glandi* superincumbere iubeant? Jàmque status hic *Præputij* præternaturalis Græcè Phymosin audit, ut & Paraphymosin alter oppositus, quùm videlicèt eadem vlcera, vtut minùs caua, callo nihilominùs obsepiuntur tam duro, ut *Præputium* adduci suprà *Glandem* minimè permittant, sicque complicatum magisque in dies tumefactum augeri idem debeat, crescenteque vltteriùs vasculorum ab vlcere excisorum numero, penitùs inflammari.

JII.
In Coro-
na & Glã
de.

Quanquàm (quòd Phymosin) hæc ab vlcere *Præputij* haud semper est; cùm non rarò à *Corona Glandis* etiàm habeatur, si videlicèt corrosiua miasmata in superiectũ illud auolent ab istius plagis. Quippè in tali casu, humores ibièdm ad fermentandum prouocati vascula disrumpent: hoc factò, *Præputium* intendatur necessum est, adeoque & ut *Glandi* hærescat, cum rubore, tumore, nec non aliquâ demùm pelluciditate. Sed nota in Recutitis, & quibus *Coronæ* vlcera infernè [quà
ver.

vergunt ad *Preputium*) crassiore callo septa sunt, Paraphymosin potius inferre. Quandoquidè *Coronæ* fibræ in eâ parte ligamentosæ sunt, ac propterea contextûs admodum compacti, sicque occallescere aptæ natæ: non sic aliæ carneæ, quæ *Glandem* inchoant. Dic igitur Phymosin gigni ab ulcere, cuius tamen callus ascensum *Preputij* ad *Glandem* minimè impediat. Generalitèr autem de callo summabis ista (& quæ nihilominus ex præmissis deduci potuissent) ulcera, prout intèr carneas, cutaneas, aut ligamentosas, siuè, quod idem est, intèr laxiores, arctioresue fibras locata sunt, callo etiâ intèr se plurimum differre: sicque exteriorem *Preputij* ambitum occupantia minimùm callosa perhiberi; é contrà alia in concavâ ipsius superficie posita: rursus, quæ *Glandis Coronam* obtinent, semicallosa, spectari, minùs adhuc, quæ *Glandem*, ac minimè omnium, quæ istius fastigium inuaserrunt. Ratio patet ex iam dictis. Nunc quod duritiem, spissitudinem & colorem eiusdem calli; hæc tametsi ex senio ulcerum apertè satis ab vnoquoque argui possint, nihilominus adhuc luculentiùs explicabuntur infrà. Summa ergo dēique, ulcera circūundiq; callosa minùs hiscere, seu latefcere ijs, quæ semicallosa,

aut *atilodeia* [sine calio] sunt . Siquidem duræ margines obstant , quominus sanies in confinia bachatum eat : quicquid infernè , ubi continuo cumulatur , ac neque interim ob paruum exitum præfatum , ritè emungi potest , suffossis pedetentim per echinatos suos ac diutina fermentatione percitos sales superincumbentis valli fundamentis , perindè quasi in infidijs ambulet , vlceris diametrum extendat , nec non profunditatem . E contra semicallosa : hæc enim uti effluxum puri alicubi concedunt , ità nullo sub aggeribus constructo fornice , tātum superficialitèr è regione marginis sese ampliant , maiore interim latitudinè compensando minori cavitare . Ac postremò quotquot nullo , ad summum tenuissimo , callo circundantur , in omnè dimensionem , exceptà profunditate , sese effundunt tantà voracitate , ut , nisi in officio [quod aiunt] contineantur , totam viciniam , idest *Glandem* populari pergant . Supereft Dolor , qui vlcera qualiacūque , præsertim antiquiora comitari solet . Eius tamen explicatio , etsi non sit huius loci (Nos etenim ipsam fusè dedimus in *Dissertat. nostrâ Anatomica* 3. ubi de humore *Glandularum Cerebri Corticalium* , deque *Spirituum Animalium falso commento* abundè actum est) paucis nihilo.

hilominùs heic perstringi potest sub his notis;
& 1. Mentem vnicum doloris capax subiec-
tum esse: quatinùs sola quid bonum, quidue
malum, sit nouit. 2. malorum omnium graui-
ssimum eidem compertum esse, materiæ ad se
attinentis solutionem; adeòque 3. quò intimi-
ùs exsolui percipit compagem corporis sibi
concreditæ, ipsam propterea tantò magis angir:
ac 4. denique, penitissimas solutiones Neruorū
esse; cum ab his organicarum corporis partiū
origo habeatur ac deriuetur. Vnde infer, quòd
fibræ omnes quò plus Nervosi habent eò
ampliùs corpori sunt essentielles, & si præ-
sertim crassitie fuerint insigniores. Infer, (in-
quam, quòd *Penis* vlcera dolorosa esse debēt,
utpotè solutiua; ac prætereà, huiusmodi solu-
tiones in *Præputij* superficie cauâ longè mo-
lestiores putandas esse factis in conuexâ. Ete-
nim porrò in hac raræ admodum, graciles ac
distortę neruorum finitiones: in illâ frequen-
tiores, crassioresque ac neque ità demùm ob-
liquæ perhibentur. Quæ causa est etiàm, cūr
Corona Glandis exquisitiore sensu polleat,
quàm ipse *Glans*, ut consideranti liquet. Infer
ultimò phymosin, istique oppositam *Præputij*
phlogosin, maximoperè urgere, & cum crassi-
usculos Neruorum ramos deglubant, pun-

gant, lancinent, indeque febrem cieant non rarò. Et quid mirum planè? Nonnè [prætereo coetera] solemne est Animoin vehementibus passionibus Cor & Sanguinem insolentiùs agitare? Mitto demùm phases illas Christal-
linarum, quæ Bullæ *Fræno* adnascuntur ac sæpè disparent improuisò; propterea nimirum, quòd talia Simioticen potiùs spectant, quàm hunc locum.

IV.
Acciden-
tia Ueru-
carum, &
Excoria-
tionum.

Succedunt Ulceribus Verruce. quarum primam differentiam suprà in Sessilibus *Præputio* extrinsecè obuenientibus indigitauimus: nota nunc, quod fiendi modum, cutim in eâ parte laxam poris etiàm plurimis scatere, qui fibras hinc indè aluunt: nutritiam ergò lympham, postquam à meretricio tabo, aut potiùs, acidis eiusdem salibus fuerit coagulata, serum emittere, quod dictorum Willorum laterales poros relaxando, sulphureis, oleosis, aut balsamicis particulis viam sternet, & quasi manuducet: vndè, ad extremum, saginati ac alti diametro augebuntur, iunctique vnà & conglutinati abibunt in magnas quasdam, veuti lentes, Verrucas nimirum latas ac depressas; Verùm in *Præputio* interno, vbi ligamentosæ fibræ naturâ inuicem cohærent, quoniàm præfatum serum non hinc indè, ast
subtùs

subtús tantùm irruit in easdem, laxatis adeò medioxumis ipforum poris, earundem paritèr meditullium duntaxat producendum esse atque arcuandum itá nempé, vt in vno puncto à rectâ suâ lineâ discedentes mòx in altero ad eandem reuertantur, sicque vtriculos constituent, qui vna cum contento nutritiuo succo ab ambiente aere, aut calore interno siccata ac indurata demùm faceissent in paruas Verrucas ex illarum genere, quas Groeci Achrocordones, Latini Pensiles vocant; suntque parte summâ latiores, imâ verò, quæ ad Cutem est, tenuiores, quâque porrò quasi pediculo, innituntur, vt patet. Nota hic rursum, fieri interdùm, vt liquor in eiusmodi folliculis contentus tametsi concretus humectetur maximè ab exuberante in vasis sero, inque eo casu ipsius salia in actum exerant [nàm, iuxta Chymicorum illud, *Salia non agunt nisi soluta*] ac propterea non tam erodi ab his talium vtriculorum superiorem partem; verùm etiàm fibras hinc inde à foraminulo illo medio relaxari, atque à nutritiuo rore protrahi debere ità, vt in nouum porum hæ denique concamerentur, videaturque hic porus priori infusus, aut adnatus. Nota demùm alteræ huic Verrucæ succrescere aliquandò etiàm tertiam

eo fermè pacto, quod modò enunciauimus: vnde curiosum fuit vidisse nonnunquàm huiusmodi excrescentias velut arte factas duplici interdum triplici quasi nodulo distinctas, vt diximus. Sed quæ *Glandi* superueniunt *Myrmoece* dictæ capulo magis lato sunt, vt & crusculo & vtroque tamen depresso, quàm superius dicta. Quippè nimirum *Glandis* fibræ laxiores ac molliores sunt existentibus in *Præputio* interno. Quì igitur, patescētibus hinc indè poris mediè extendantur, vt *Peniles Verrucas* gignant, potius quàm *Sessiles*? Utrumque autem hoc *Verrucarum* genus si paululum consenescat, eatenus saltim, vt liquato illo, quod sulphur in earum ventre condensari nouimus, salia in hoc, vt & in sero contenta fermentatum eant, planum est, fracto apice, eructaturum interdum saniem quandam aqueam ac inolidam, materiam scilicet minere suæ, hoc est lymphæ, redolentem. Foetor enim & puris crassities omnis à sanguineis globulis [dicam planius] à sanguinis portione rubrà ferè dependent. Remanent *Rhagades*: hæ, quęcunque à viru siuè muliebri, siuè aliàs vlceroso in *Obscænis* fiunt, pro eiusdem fixitate magis minúsue ampliant sese, præter nonnullas in

Corona Glandis, quæ cum breues sint, non multum dilatantur, vt neque aliæ inter membranofos constrictosque interioris *Præputij* vuillos constitutæ. Et quod numerum: alibi pauca, alibi plures; ferè tamen in eiusdem *Præputij* rugis frequentiores obseruantur, eò quod hæ vt rugosæ, ita & spongiosæ maiorem in coitu lingunt *venereæ* amurcæ quantitatē.

§. 3.

Diagnosis heic omnis linquenda foret (ecquis enim *Penis* *Ulceras*, *Verrucas* & reliqua superius recensita non agnoscit?) nisi ex alià parte obscura adhuc multis videretur; quæ versatur circa causas eiusmodi morborum. Præstantissimus *Sinapius* non muliebrem *Gonorrhoeam*; alia adducit, quæ tales affectus gignere posse autumat. *Constat siquidem* [sunt eius verba] *Et experientia Et ratione. quod non tantum à meretricibus prostitutis; Sed etiam à propria uxore honesta licet, similes morbi oriri possint. Si, inquam uxor cachexia aliqua Scorbatica plus iusto acris, salina, acida laboret, si eadem fluxum album, inordinatam Catemeniorum euacuationem Et stagnationem sentina Vteri à mordaci aliqua Et acris colluvie patiatur*

J.
Signa ca-
ularum
distincti-
ua.

tur. Tunc enim (pergit) accedente immoderatione in coitu & motu tali excessiuo, qui Vterum nimis exagitare, accendere & effervescentiam salium causare potest, hincque fermentationem eorundem salium, hinc affluente lymphæ acris & putrida ulcuscula Vaginæ uteri concitare; nonne inquam hæc causa erit marito inficiendo citrà ullum meretricium congressum, nonne aura illa contagiosa acris volatilis ex taliter constituta uxoris utero exhalans proflatas aliaque vasa spermatica inficere valebit? Sed hanc si in principalem assumpsisset, quam causam pro accessoriâ adhibuit, immoderationem nepè in Coitu, haud longè sanè à scopo aberrasset. Edixisset enim quod & nos suprâ in Theoriâ & experientiâ & ratione quòque firmavimus. Verùm quòd citrà hanc immoderationem Ulcera in Vethro, Verrucæ &c. haberi possint è congressu cum propriâ Vxore honesta & pudicâ corporis duntaxat cachectici, aut muliebri quidquam patientis, non credo. Nec vacat repetere quæ alibi (Cap. 2. §. 3.) narrauimus de Viris eiusmodi Mulierum, qui vitio aliquo Pudendi nunquam fuerunt attacti. Addam hic solùm, observasse Me etiàm alios qui diu copulam habuerant cū Coniugibus Phthisicis obindèque fluxu albo vexatis, itémque cum alijs

Observat.

alijs, quæ ex epotâ Cantharidum tinctura id morbi contraxerant, nec tamen eorum quempiam vel de minimâ *Pudendi* labe fuisse conquestum. Ratio autem huius rei videtur, quam etiâ ibidem attulimus; nimirum quia, utut Cachexia illa sit scorbutica, sit & Phtifica, sit denique & salina, acris, acida, austera & acerba; utut, inquam, adsit fluor albus, inordinata Catemeniorum euacuatio &c. quoniam tamen ij vel sanguinis morbi sunt, vel Vteri, quid sibi cum *Vagina*? Salia namquæ eiusmodi Visceris cum iam deferbuerint ubi ad hanc peruenerunt, nullam ipsi noxam inurere apta sunt. Sed regerit laudatus Author: *Dubitas vlcuscula oriri posse in Uagina fœminæ honestæ, quæ promiscuum non admittit coitum? Sed si datur Inflammatio, Tumor, Schirrus, Cancer Vteri etiam in honestis & maximè abstinentibus fœminis, & uel maximè illis, quæ Chlorosi, seu febre amatoria, vel quæ Pruritu muliebrium laborant, cur non & vlcuscula, quæ minus, vel saltem consequens horum omnium sunt, concedas? Deindè exagerat. Quot Maritos scio taliter infectos, eorumque nonnullos, qui tempore menstruum à proprijs vxoribus non abstinebant, & quidem domi suæ & non in castris ad Neapolin &c.?*

Obseru.

Dubito [inquis *Sinapi*] & quidni? Primò nā-
 que magna disparitas est intèr Vterum eiuf-
 que *Vaginam*: ille Neruis, ille copiosissimis
 donatur vasis, ille tandèm nunc contrahitur,
 nunc ampliatur. nunc siccescit. nunc hu-
 mescit, nunc denique meconijs impletur ac
 farcitur; *Vagina* verò nec Neruis, neque Ar-
 terijs, saltem considerabilibus, ditata est, ossi-
 bus atque adipe obsita ac munita, & lato de-
 mùm ore peruia perhibetur: quo fit, vt si
 Vterus Inflammationibus, Tumoribus, Sc-
 hirris obnoxius est, illa sit conditionis longè
 diuersæ. Deindè, datur Chlorosis, datur
 Pruritus Muliebrium, & vlcera tamen ex
 eādèm causâ non dantur. Et postremò, etsi
 darentur ista ab aliâ causa [non tamen *Ve-
 nerea*) putas ne iccirco ea fore contagiosa,
 ita vt *Penem* ulcerare, aut alitèr labefactare
 valerent? Falleris. Nam pus talium vicerum
 non esset eius indolis, vt sese *Preputij* poris
 applicaret, vt lympham rectâ appeteret &c.
 Capesit exemplum in Vino quod alitèr al-
 teratur per se, alitèr, interuentu Ignis, aut
 aliorum corporum extraneorum. Quamo-
 brem vlcus illud sponte ab internâ causa in-
 flictum, non esset eius diritatis, atque fa-
 ctum ab externâ, ex commixtione scilicèt semi-
 nis

nis virilis, ex *Agitationibus* immodicis & calore violento. Iunge, quòd cùm illud virus non esset ex succo *Vaginali*, sed ab alio humore, non haberet proindè illam analogiam ad glandulas interioris *Preputij* earumque succum, quæ requiritur ad Ulcera & Verrucas excitandas. Sic nitri Spiritus nunquàm se addicet solutioni Solis, nisi ex sale ammoniaco fuerit præparatus, Ad id postea, quod subiungit *Author* de Uiris, Menstruatarum consortio, in Pudendagram lapsis, piget fortis meæ; ipsum nempè tot, me ne vnum quidè ex ijs vnquàm obseruasse. Profectò si tàm frequentes ij sunt casus, præstat accessum omnem ad Mulieres prhoibere. Nàm, cùm hæ ludibria sua plerumq; taceant; ne idcirco in foueam incidamus aliquandò, tutius est cum ipsis nunquàm coniungi. Sed vah commentum! Quid enim *Peni* aliud affert tale coniugium, præter spurcitiam magis apparentem, siuè conspicuas in illius *Glande* suggillationes? Crediderim igitur potiùs *Sinapium* deceptum fuisse à quibusdam Foeminis, quibus mos esse solet, vt, cùm Gonorrhoeâ laborant (ne Amasijs iniuriam fecisse existimentur, quorum post ultionem metuunt] declarent coituræ, se

se euacuationes suas menstruas tunc temporis agere. Coeterum nil mali pertimescendum ex tali Coitu: & reuerá, quando hunc Antiqua illa damnauerat, nouissima Christiana lex ad summum veniale peccatum dixit, testibus *P. Ledesm, Henriquez, Sanchez, Filliuccio* & alijs apud *Bonacinam*. Iocis *Sinapi* sepositis, ad rem certè magis respondisse comperi nonnūquam Adolefcentes quosdam pecuarios Romanos, qui aliquo interdum è dictis morbis in Archiospitale nostrum adsportato candidè fatebantur se à Vaccinâ quadam (sic enim Itali Vaccas appellitare consueuerunt) in eâ parte læsos & commorfos fuisse. Ergó, quod feria; videntur aliquando Rhagades *Præputio, Coronæ & Glandi* posse contingere ex nisu in Coitu, aut calore *Wlua*, vt in Theoreticis enarrauimus. Sed eæ in tali casu non sunt *Veneræ* censibus adscribendæ, neque enim difficilè sanantur, aut incrudescunt paulo importuniùs; aut sponte suâ, ex se, absque aliquo, etiam Topico medicamento rescipiscunt: non sic aliæ, quas virus comitatur. Vlcera itè non semper ab eâdem *Veneræ* contagione sunt. Vidi ego complura *Glandem* infestantia, & quæ tamen à *Prostatibus* nondum viru depletis (ante bien-

biennium scilicet aliquando tandem, sed male curatis] fouebantur. Disparebant autem hæc rursùmque reeditabant parua, rotunda, minimè caua, prout nempè dolor in radice *Penis* intendebatur, aut remittebat. Uerùm de his *Artic.* sequen. Demùm neque *Phymosis* præsentiam vlcis denotat continuò: ex *Gonorrhoea* siquidem, & nonnunquam ex *Pano Inguinis* oriri solet, vt suis locis ostendetur: Quamobrèm an hæc ab vlcere pendeat, *Tactio*, & *Contrectatio* potius fidissimi tanquam iudices esse poterunt. Atque hæc quidem de causarum differentiis: scire postea si cupis an vlcus quodlibet *Virilis Membri* ex commercio cum impura foemina, aut aliundè processerit; obserua i locum. Quippe in *Præputio* nonnisi ab illo; idest foedo concubitu prouenire potest. 2. accidentia. Quandoquidem callositas, inflammatio, profunditas vlcis certam saluæ meretriciæ arguunt impressionem.

Prognostica si queras, adfunt en rursùm Tibi eadem vlcera *Præputij*! quæ quidem occasione felices in hac parte mihi veniunt nominandi *Hebræi*, *Turcæ*, *Apellæ* omnes: quod nimirum *Præputio* destituti neque ijs vlcibus obnoxij sint, neque itèm alijs affectibus

IJ.
Prognosis Vlc-
rum.

ctibus, quos posteriora hæc plerùmque man-
 uducunt; vt lues *Veneræ*, morbus nempè
 ijs multò infrequentior, quàm Nobis in-
 circumcisis. Eatinus autèm hæc contingit
 vlcus *Præputij* patientibus; quòd complura
 eademque satis capacia vasa sint, quæ *Præ-*
putium irrigant: quæ causa est profectò, cù
 illius virus à venis plenius absorbtum reli-
 quam massam postea infectum eat: iunge
 huic etiàm callum, qui cum reliqua in alijs
Mentula partibus constituta vlcera nec tam
 crassè, nec æquè ambitiosè, vallet, maiorem
 hinc puris quantitatem expurgari patitur,
 quàm illinc, vt nempè suprà §. 2. innotuit.
 Prætereà callus strangulatis vasculis sangui-
 feris ac nutritij roris intercepto cursu gan-
 grænâ intentat sæpenuerò, at nunquàm
 tamen æquè vlceris malignitatem portendit,
 atque vt est liuidus: ad minimùm enim luem
 tunc *Veneræ* auguratur, sanguine existen-
 te immundo, idest scepticis salibus impræ-
 gnato. Vt verò is in Phymosi ac Paraphi-
 mosi talis vt plurimùm apparet: sic causæ
 hæ potissimè sunt vel mutilationis *Membr-*
virilis, vel *Pudendagræ*. Quod superest de alijs
 vlceribus; callus in ijs pessimi ominis est,
 qui albidus; indicat enim coagulationis, vt

& Gallici mali, initium: melior, qui ruber, postremo loco est carneus, qui temperamenti bonitatem auguratur. Idem dic de eiusdem consistentia, maiore scilicet, aut minore; atque ultimò de pure ulceris: de quò siquidè iam plura alibi, cramben hìc [vt in adagijs est] recoquere non vacat. Accidit iam verò, vt *Glandis* ulcera maligna, phagedenica, seu disepulotica facta ipsum aliquandò penitus absumant: sicque Ego aduerti in nonnullis *Colem* ab iisdem omninò consumptum. Sed nec satis: contingunt in ijs erosionibus tam fatales hemorragiæ, vt pluriès meminerim, eæ quodocunque obuenissent, instantis lethi nuncios fuisse.

Obseru.

Deuoluimur nunc ad Verrucas: quarum prognosim unicuique obuiam nemo non dixerit, qui aduerterit genimina esse illa nutritiæ lymphæ inspissatæ, seu coagulatæ; ac propterèa nos, quoniàm coagulationem hanc affectum esse nouimus veneni in sanguine grassantis, indices iccirco illas appellabimus siuè, quasi tesseræ Gallicæ affectionis. Verrucis cognatæ sunt Bullæ, seu Ueiticæ Cristalloides, utpotè quæ idem serum [à quo nempe illæ exordiuntur] agnoscunt authorem. Harum igitur par est cum illis exitus, nisi quod

IIJ,
Verrucarum

quòd aliquæ suprà *Glandem* prouenientes; quúm recéns à coitu fiunt, breui disparent impunè: quemadmodùm etiám omnis malitiæ expers fuit illa notata à *Velfchio*, quæ in Muliere, ex apice *Clitoridis* enata fere ad pedes vsque propendebat; quamuis ego non vesiculam crediderim fuisse illam, sed tumorem, vtut diaphanum, vtut pellucidum, ex cachectico corporis habitu & dictæ partis arcto aliquo confictu prognatum, potiúsqvà ex Gallicà infectione. Sed hæc per transennam.

IV.
Exco-
riation-
um.

Postremò Rhagades, siuè Fissuræ, aut Excoriationes tùm *Mentule*, tùm *Scroti*, vtcunque mali moris existant, hàud sunt inauspicatæ. Vitium enim sanguinis supponunt magis, quàm inducunt, præsertim si solæ sint, hoc est nulli eiusmodi partium vlceri fuerint associatæ.

§. 4.

J.
Curatio
Vlcerum

AD Repellendam autèm Vlcera sæuitiam præstat Vesiculas [vnde illorum origo] statim atque apparent, lenceolâ aperire, planè iuxtà monitum illud *Maronianum*, quòd se habet hoc pacto.

Sed

*Sed non vlla magis præsens fortuna laborum, est
Quam si quis ferro potuit proscindere summum
Ulceris os. —*

Nàm (vt alio eiusdem Poætæ vtar carmine)

— Alitur vitium, vivitque tegendo,

Dùm Medicas adhibere manus ad vulnera

[Pastor

Abnegat —

Quamobrém apertas implebis protinùs em-
plastro aliquo suppurante, imprimis verò
Basilicon., cui granulum vnum aut alterum
Mercury Precipitati adieceris, pro magni-
tudine affectûs. Nàm, quod hunc *Mercuri-
um*, caue hàud ità indifferentèr adhibeas:
Fibras certè is siuè carneas siuè neruofas,
&c. valdoperè irritare solet. Quaproptèr
cùm metum incutiat sempèr maioris inflam-
mationis, cum cautelâ debet vsurpari. Vtè-
ris autèm illo prorsùs omni iure, si noueris i.
vlcus velût obsoletum ab omni prorsùs phlo-
goseos suspicione vacare: deindè si eius callus
plurimùm obduruerit, ac postremò, si *Glan-
dem* vlcus occuparit. Quippè in hisce casibus
non tàm album, quàm etiàm rubrum *præci-
pitatum* diligentèr administratum omne pun-
ctum ferre consuevit. Ac proptereá l'on doit
[si ità cum Gallis loqui licet] long tems me-

M

nager

nager ceremede, vt nimirum vber puris effluxus obtineatur. Vertitur namque in hoc totius curationis cardo, & ne scilicet, quod vlcus peperit, idem virus postea in venas repat. Suppuratio igitur diu diuque urgenda est, remedijs etiam in vsum vocatis, quæ tum illam promouere, tum sanguinem ab omni labe præseruare possunt, cuiusmodi sunt interna, quæ inter primum locum occupat V. S., si præcipue inflammatio instet. Sed oggeris, Phlebothomiam in *Veneræ* quauis ægritudine canepiùs & angue fugiendam: ad quod resp. non disputari hic à nobis nùm in *Veneris* conueniat, an non; commendari tantum in vlceribus vel inflammatis, vel proximè inflammandis (vlcera enim præfertim *Præputij* nunquam non inflammatione periclitantur) Quamobrè cum receptissimum sit apud omnes (quod & Nos authopticis legibus ostendemus in aduersarijs nostris Anatomicis, *Dissertat.* 2.) non dari præstantius magisque præsentaneum ad arcendam phlogosim remedium ipsa V. Sect., meritò intulimus hanc esse administrandam. Replicabis, attrahi hanc mediante *Venerem* pus in massam sanguinolentam, adeoque ex illa *Venerem* luem procurari; Sed resp., ægrè aucupari à venis salia præfertim
 fixa

fixa [quæ nimirum *Penis* vlcera producant] ubi altè fibris fuerint impacta; & prætereá, nonné optabilius aliquandò foret ipsa lues inflammatione *Præputij*, quæ præcipuè gangrenam minitetur? Iunge, quòd post V.S. in vsum vocanda veniunt alia auxilia, quæ sanguinem præseruare possunt á quâlibet attractione: videlicet *Mercuralia*, in quorum censum, præter allatas *cap. Superiore*, ponam hic alias pilulas, quas describere consueui sub hoc exemplo.

R̄. *mercur. crud. s. q. therebentin. extinct. 3. 6. senn. ʒ. rhabarbar. elect. puluer a 3. ii. ialap. pulu. 3. i trhocisc. alkandal. ʒ. precipit. alb. a ʒ. i. cum s. q. Syrup. de cichor. comp. f. S. A. Mass. pilul., de qua cap. M. ʒ. ii. superbibend. iuscul.*

mitto exhibendi modum, quòd de hoc penès Medicum deliberatio esse debet: Ego illas quartâ quâque die, vtplurimum, præstare soleo &c.; linquo itém alias receptas, quæ vel ipse mihi, vel alij sibi fingere, aut ex alijs transcribere consueuerunt. Neque enim centones farcire institui; Sed tantum ea promere, quæ mihi quotidiano vsu probata sunt, quale est etiàm sequens Topicum.

R̄. *cadmia fossil., siuè lapid. calaminar. 3. ʒ. sulphur.*

phur., argent. viui a 3.i. therebenth. q. s. M.
in formam unguent. addendo parum axun-
gia porci.

Habui autem hoc secretum ex Operibus *Hen-*
rici Regij: secretum, inquam, quia mirabi-
 le in vlceribus *Penis* omnibus extirpandis abs-
 que metu inflammationis, quæ per *mercu-*
rialia præcipitata cieri plerumque solet. Verum
 ni his alijsque *Digerentibus* morem gerat vl-
 cus; sicque istius labia aut liuescant, aut du-
 ritie adhuc maiore firmentur, inurenda-
 erunt hæc *Lapide caustico*, seu infernali; quo
 facto admouebis iterum supradictum *Suppu-*
ratorium Emplastrum, idest *Cerat. Basilicon.*
præcipitato rubro permixtum ad escharam ni-
 mirum eximendam. Porro hæc sublatâ, caute-
 riũ iterum appones, iterumq; exclusâ escharâ
 eundem lapidem tertio, quarto, & successi-
 ue quinto applicabis & donec vngulas, quæ
 callum constitvunt, omnes excluderis, non
 omissis tamen interim [vt hoc & nunc rur-
 sùs repetam] internis *Alterantibus*, quæ san-
 guinem à *Venerea* labe expurgare solent.

IJ.
 Phymo-
 feos, &
 Paraphy-
 moseos:

Enim verò siquandò hæc intendenda sunt
 in Phymosi & Paraphymosi intendi debent;
 quòd videlicet clauso vlcere pus in venas non
 desinat introduci. Et, quod externa, præmis-

sis V. Sectionibus largioribus pro magnitudine Affectionis, intrudat Chirurgus in Phymosi, intrudat, inquam, vlceri sub *Præputio Epispasticum* aliquod medicamentum [nam caue irriteris] quale imprimis est illud *Henrici Reggij* suprâ laudatum, alijs deindè ficis, seu nullo vngento delibutis, penicillis circâ *Glandem* positis. Hoc enim efficiet, ne vdor fordidus tam suprâ *Glandem*, quàm sub *Præputio* congregari solitus [quique in *Penis* inflammationibus copiosius, magisque viscidus prouenire consuevit] ambas illas partes glutinis more conglutinet, vtque *Præputium* sensim ducibilitati initietur. In quem finem utilis est paritèr fots ex vino, in quo fursur decoxerit, spongiâ exceptus, aut *Creta* sub aquatica *Pollionum* rotâ concrescens, imposita nempè loco extrinseco tumidiori. Coeterò, ni *Epispasticum* illud á Nobis expertum, vtpotè vnctuosum, minimè placuerit, substitui poterit in eius locum sequens balsamus.

℞ *Sachar. saturn.* ℥ *mercur. dulcific.* a ʒ. i.,
mastic., *myrbæ* ℥ *calc. viu. puluer.* a ʒ. ʒ., *turb.*
 ʒ. xv., *cum s. q. balsam. sulphur. thereben-*
tinath. misceantur exactè in formam lini-
 menti, quo *turunda* aliquot intingant; ℥

affecto admouebantur, cautela postea adhibita, quam supra diximus.

Ijs porrò sic administratis, si *Præputium* nihilominus restitet ac deduci non queat, ad Chirurgicam operationem confugiendum est. Sic autèm de hâc expressé *De la Charriere*: Le Chirurgien, inquit, dans ce moment tâche de débarasser les parties tirant à soy l'extrémité du *Prepuce*, & introduisant à côté de la *Verge* vn instrument en forme de ganif entre le *Gland* & la peau perce sans danger le *Prepuce*, & incise tout ce, qui est compris entre l'instrument & l'extrémité du *Gland*. Si vne incision ne suffit pas pour le decourir, on en peut hardiment faire vne autre du côté opposé. Au reste le seul mouvement de ces parties est capable d'étendre les fibres du *Prepuce*, de les rendre obeissantes, & de faire en sorte, que elles se referrent & se dilatent suiuant le besoin de la nature. Factâ autèm incisione (quæ in *Penis* medio, quâ *Venæ Pudendæ* propago reptat, minimè gentium celebrari debet) sanguinis effusio, si vberior fuerit, bolo armenâ; sin ità, solo carbaso, plumacceolis, filisue lineis excerptis [vulgo *sfilacci*] siccanda erit: mòx verò *Præputium* iterùm fouebitur vino calido supra-

supradicto, *Virgaque* porrò ad *Pubem* inclinata. *Æger* supinus dormire iubebitur: postridiè uerò *Præputium* sponte suâ apertum; sin itâ blanditèr elatum stuppis lineis emplastro aliquo suppurante delibutis impediatur, quominus postindè *Glandi* adhæreat, incisuris etiàm ad hunc finem probè stipatis. Cæterò suppuratorijs auxilijs iàm præscriptis addere nunc liceat & tertium, cuius hæc est formula.

R. butyr., vel liniment ex cera & ol. commun. ℥.ss., precipit. rubri optimè ac subtiliss. ℥.iii ss. Rite misceantur cultello super tabelam leuem. f. vng. ad us.

In isto quippè tantum fiduciæ collocavit eiusdem Author *Io. Bapt. Zapatta*, vt non dubitarit polliceri, sanaturum sese ex eo *Genitalium* vlcera omnia. modò à *Venereo* tabo sanguinem vniuersum inficiente non fuerint incubata,; blanditurque in hoc illi eiusdem *Scoliaſtes*, tale vnguentum propterea *Diuinum* vocans, totiusque *Artis admiratione dignissimum*, tracto in suas partes etiàm *Libanij* testimonio. Ego verò vt nolo probatissimorum Virorum Manibus molestiam faceſſere, sic malo mihi ipsi credere atque in propriâ confidere experientia: malo, inquam, *Arcanum de Cadmia*
primo

primo loco descriptum vsurpare, quàm aliorum promissis etiàm sesquipedalibus inhærere. Chirurgus nihilominus à successu discat eligere. Nám, monente prouerbio, Optimum omnium Res indicabit. Coeterò vulnus [seu incisio, de quâ suprâ] siuè vni siuè vtrique *Præputij* lateri inflictum fuerit, apertum, diù seruandum erit, seu donèc vlcus, quod huiusmodi inflàmationi ansam præbuit, ferè coaluerit, idest peruenerit ad cicatricem. In quem finem abstergentur quotidie eiusdem cefuræ labia vnguento de *Muccillaginibus*, cui tantundem cerati *Vigonis de Ranis cum mercurio* admixtum fueirit, imò anatina etiàm portio, si præfata labia nonnihil obduruerint: interim quòque, quòad phlogosis illa *Præputij* perdurauerit, minimè temperandum erit ab vsu fomenti præcitati, cautione paritèr sempèr adhibitâ, ne *Colis* incongruum situm teneat, hoc est, vt paruarum fasciolarum adminiculo ad Pubem continuò inclinetur. Moneo tandèm, circâ Chirurgicam operationem, ne in vetere Phymose præcisiones fiant, sed scarificationes. Etenim, ybi *Præputium* totum vlcus est, cum illis opera luditur, cum his, non ità. Quod Paraphymosin [tumorem scilicèt *Præputij* inuersi] hæc initio ac protinùs

extur-

exturbari debet, metu Strangulationis Vrethrae, quæ vtut accidat nonnunquam etiã in Phymose, plerumque tamen ab hac abesse non consuevit, quemadmodum & gangrena *Penem* in hoc statu facilius inuadente. Imprimis igitur tundetur Vena: fomentum deindé, ac *Suppurantia* auxilia demùm exhibebuntur, quæ porrò stylo suprà absconditum vlcus intrudes. Post hæc, adducetur *Preputium* suauitèr ac blandè suprà *Balanum* ità videlicet, ne compresso apice, istius *Corona* intumescat magis. Quippè sic, *Preputij* plicæ retrorsum potiùs, quàm antrorsum impellerentur, vt notare liberum est cuique pollicem *Glandis* vertici admouenti &c. Tali autèm operâ ni *Preputium* reduci poterit, lateralitèr probè, ac transuersim præcidetur, hinc nimirum, vt ab vlcere illinc, vt à *Coronâ* euadat, adhibito ad id prorsus eodem scalpro, quod in Phymose laudauit *De la Charriere*, scalprum inquã aduncum instar cultelli scriptorij, ac perexiguum: in reliquis verò procedetur deindè vti suprà narratum fuit de eiusdem Phymoseos operatione, incisionũ curam Naturæ, ceũ quæ ipsam pedetentim molitur, demùm remittendo. Coronidis gratiã dicam esse aliquot, qui ad dictas inflam-

mationes commendant plumbeas *Fallopij* canulas, itèm alias *Nicolai de Blegny*; sed Ego, præterquamquòd impendio superfluas, in eo etiàm noxias comperi, quòd, dùm tempus teritur in earum vfu, malum sæpè exasperatur, gangrænâ scilicèt nonnunquàm interueniente: dicam rursús, Tumores *Præputij* aqueos à *Gonorrhæâ* & *Veneræ* Bubone pendentes peculiarem non admittere curationem; fouendos duntaxât esse cum vino tepido toties laudato, interim verò & causas omni studio remouendas. Coeterùm aquei vocantur ij tumores, cùm tamen rubicundi sint iisque similes, qui *Phymosin* & *Paraphymosin* comitantur: cenfeo nihilominus sic dictos, quòd adiunctam habeant notabilem pelluciditatem, cuius causæ ostendentur infra; dicam denique, quòd *Phymosin*, hanc biduo præter proptèr, triduo etiàm, aut aliquanto plùs interdùm disparère, spretâ nimirùm illius sanatione, errore aliquo in vfu rerum non naturalium commisso, Chirurgi segnitie, aut postremò ex delectu remediorum inconsiderantiùs habito. Quippè ex hinc cruore, præsertim qui maximè inquinatus fuerit, in venas absorpto, nil ampliùs superest ad *Præputium* inflammandum. Væ nihilominus Ægroto!

Nam

Nàm multa ipsum post errores eiusmodi expectat pœnitentia. Sic vidi non paucos iam de tali euentu loetantes, & qui postmodum Articulorum doloribus, Pustulis, alijsque *Morbi Gallici* Satellitibus circumuenti, gaudia in luctus commutarunt.

Ad verbum. *Tumores* ergò *aqueos* appellauero ego potiùs *Vesiculas* *crystalloides* in vniuerso *Pene*, præcipuè verò ad *Frænum Glændis* prouenientes, & quæ heic ideò frequentius contingunt, quàm in alijs locis, propterea quòd neruee eiusdem partis fibræ tam validæ sunt, tamque strictim vnâ coherent, vt serositati à nutritio succo separatæ coercendæ sufficiant; non sic alibi, vbi nimirum infirmiores citius franguntur, atque vlcus adstruunt vtplurimum. Sed, quòd concernit curam; spectatas porrò eiusmodi bullas *Lanfranci* collyrio [cuius nos descriptionem hic non damus, quia notissima] aut alio simili remedio exsiccare, sicque extirpare decet: quod nisi succedat, perforabis eas aciculâ delicatè, siuè ita bellè, nè subiectas fibras pungas ob plura incommoda, imprimis autem ob gangrenâ, quæ in tali casu facili negotio contingeret. Iàmque transfixas, ac perforatas imbues protinùs aliquo ex vnguen-

II J.
Crystal-
linarum

tis *Suppuratorijs* suprà descriptis, diùque id præstabis, vsquedùm tandèm ipsas puluere *cerusse*, aut *Tuthie* cicatrizare conueniat. Quòd si proptèr aliquam implicantiam, aut accidens improuisum, gangræna fortè oborta fuerit, ad sequens auxilium confugietur, cuius opem & in alijs consimilibus circumstantijs implorare poteris, nimirùm

Rx. lixiuij ex cineribus fermentor. ℥. viij. fol. thym. , roris marin. & absynt. a. q. s. Coq. simul spat. quadrantis horæ. Colat. adhuc calenti, add. sal. armoniac. ʒ. ij. ; sublimat. corrosiu. ʒ. j. frigid. verò adde myrh. & aloes subtilis. puluer. a ʒ. j. f. foment.

IV.
Verrucarum, &
Excoriationum.

Accedunt vltimò *Verrucæ*; pro quarum expugnatione nisi machinas *Gallicam* repercutientes adhibeas, frustrà allaborabis: illas inquam machinas sine quibus quamlibet *Penis* infectionem, hoc est à meretricio viru contractam ægritudinē, nunquàm perfectè satis euinci posse diximus, ac nunc iterùm admonemus. Coeterùm *Excoriationes*, siue *Rhagades*, cessant causâ paritèr cessante: interim ne inualecant, vel ipsis pulueribus suprà adnotatis poterunt impediri.

ARTICVLVS POSTERIOR

De interiori Virilitate laesa.

§ I.

SVprá in præfatione ea, quæ poteramus meminisse de externâ *Mentula* structurâ, enarrauimus. Reliquum est igitur, vt hoc conuenienti Instituto nostro loco de Internâ, quantum de hac habemus exponamus. Videtur namque mihi conuenienter satis disputatum non fuisse ab Anatomicis de lymphæductibus, qui *Penem* peragrant, imò ne verbum quidem ab aliquibus fuisse factum. Quamobrè hoc saltim heic abs me non est prætermittendum, cui scilicet tales rivulos sæpenumero aduertisse contigit. Uidi quippè in Viris Bubone *Venereo* ulcerato, iamque adeò ablatis Integumentis *Inguen* longè latèque depascente, vexatis Glandulas huiusce nominis Vesiculosas, quæque ibidem palàm prostabant inflatæ, emisisse inferiùs, nempe ad Cutem Os *Pubis* inuestientem, tres eiusmodi furculos, imò & plures aliquandò, crassos, albo colore saturos propter nimirum lympham ab acido *Venereo* in iisdem coagulata[m]] & qui obindè primâ facie Neruorum similitudine imponebant : extare interim in

J.
Observa-
tio Anato-
mica de
Lymphæ-
ductibus
Penis.

Præputio tumorem aqueum in Phymosi apparere solitum, circa tamen vllum eiusdē vlcus. Ob quàm causam arbitratus sum denique lympham illam acidam motui ineptā stagnasse protinùs in dicta cute ibique sanguinem infecisse &c. Nàm de his alibi. Ergò, quod impresentiarum: mihi certè pró irrefragabili est dari in *Pene* vascula lymphatica: nec quifquam paritèr refragabitur, qui nouerit eadem in alijs corporis partibus vbique reperiri, circa membranas præsertim, ligamenta, & nervos. Qui igitur, & cum illud *Membrum*, si quod aliud, hisce tribus constet instrumentis, vasculis tamen illis penitùs destituatur? Sed, vti clarè adspexeram tales canaliculos à Glandulis *Inguinalibus* ad *Penem* procedere, ità nondum adhuc liquidò innotuit, an lymphæ in hoc expansa in illis recolligatur [vt vulgaris de vsù glandularum Vesciculosarum fert opinio] aut ab yisdem protinùs in *Penem* distribuatur. Etenim id ligaturis euincere nunquàm datum fuit: pressio autem vasculorum ob coagulata in ijs lympham non succedebat. Dicam itaque potiùs, quòd, sicuti talem succum vidi oppidò è glandulis Jugularibus in Oesophagum defluxisse [vti nempe suo loco ostensum est, *Dissert. Anatom. 1.*]

com-

comperique aliàs é glandulis Meseraicis ad Intestina deuolutum [vt fusè demonstrabitur *Difertat. 2.*] ità ab Inguinalibus, quæ mòx recensitis congeneres sunt, glandulis, lymphæ procedat. Nèc vacat coniectura; nam, quemadmodum alibi Oesophagi ac Intestinarum interiori linitioni dicata est lymphæ, cùm non etiam heic Urethræ lubricationi? Profectò si hanc compares humori in dictam Urethram transfudanti per minimas glandulas, seu potius canaliculos, à *Laurentio Terraneo* nostro anaglypticè delineatos, dices neutrum ab altero differre. Prætereà, nonnè liquor, seu crassamentum illud sordidum intra *Glandem & Præputium* exsudans prouentus est lymphæ potius, quàm sanguinis? Cor certè irà mihi succenditur [vt Poëticè sic aliquandò loquar] quotiès audio Anatomicos reticulata quædam, ab ijs tamèn nunquàm spectata opera effingentes initio cuiusque glandulæ [etiàm Miliaris] quorum ratione recrementa segregari volunt. Uerùm vt non est præsentis loci hanc Diatribam instituere [nimirum in aliud tempus, *Difertat. 2.* suprà enunciata, verbo reseruato] ità dicam nunc, videri magis rationi consentaneum, quòd lymphæ ab *Inguinalibus* glandulis deriuata Urethram

thram, *Glandem* ac *Præputium* interiùs oblinire pergat, minimè verò sanguis ab arterijs proficiscens, vt qui succum nutritium potius suppeditat: de monstrare id prætereà ipsam glandularum *Vrethræ* Disgregatarum Structuram vtpotè oblongam, idest ductibus lymphæ continuam; ac denique Situm. Quandoquidè eæ mediam solummodò *Vrethræ* partem, idest anteriorem muniunt, posteriore hinc ab *Adstitibus* glandulosis à laudato *Teraneo* nostro inuentis, indè verò à *Parastatis* irrigatâ.

II.
Sydenami
opinio de
Sede Gon-
orrhœæ.

Atque hæc quidè prælibanda erant ad maiorem etiàm dilucidationem Historiæ, quam in sequentibus daturi sumus, de *Gonorrhœa Virili*. Nàm clarissimus *Sydenham* censet morbum illum in *Penis* glandulis miliaribus suprâ citatis stabulari: *Contagio hæc* [loquitur de *Pellicum* venenoso vdore] *carnosam Virgæ substantiam*, quantum ego iudico, primùm adurit; quam quidè corrumpens, ydemque primò inflammationem, mox *ulcerosam diathesin* sensim inducens efficit, vt sanies, qualem in *Gonorrhœa* cernimus, in *Vrethra* lentè extillet: quod vt credam hac ratione promoueor. Ipse scilicet vidi virulentam huiusmodi materiam per substantiam *Glandis* porosam exsudare, non
per

per Urethram eiectam, nulloque ulcere vel Glandem occupante vel Præputium. Sed an ritè censuerit, videant Anatomici! Ego certè comprehendere non possum quomodo *carnosa Virgæ substantia corrumpi* queat, absque quòd humores ibidè exsistentes paritèr corrumpantur, idèst fermententur; et si hoc, nil mirum si solito vberior foetidi tomenti prouentus ad *Glandem* fiat aliquandò ex concubitu cum muliere pollutâ. Memini ego etiàm plurimorum, qui *Membro* in eiusmodi latrinis solùm leuitèr intincto, albâ sanie postmodùm plorant per *substantiam Glandis porosam*, etiàm *circà ullum vlcus* [quod & *Artic. superiore*, ni fallor, adnotaui] Verùm ploratus ille non erat effectus *corruptionis in carnosa Virgæ substantia*; sed fermentationis in eiusdem succis; cuius quidè fermentationis argumentum est semper maior prædicti tomenti fluxilitas; quâ occasione licet rursus aduertere, quòd Adolescentum, quotquot id contigisse comperi neminem obseruavi qui aliquam *Pudendorum* labem fuerit expertus, veneno nimirum sic ex illâ fermentatione attenuato, ac per *Penis Glandem* expurgato. Vbi adeo paritèr est adnotandum, sedimentum illud, toties nominatum, sobolem esse lymphæ à glandulis In-

guinalibus prouenientis, vt suprâ docui. Cœteró etenim non sic fuisset emunctum, sed potius à venis interiùs adsportatum.

IIJ.
Vera ei-
usdem
sedes.

Quærenda igitur alibi Gonorrhœæ fedes: atque hanc quidém esse glandulas vulgato nomine *Prostatas* dictas tam receptum est, quàm quod maximè. Ambigitur nihilominus adhuc vel ab omnibus, quonã tramite meretricium pus eó feratur? Generosus *Et. tmullerus* putat id post excretionem seminis virilis se insinuare in Vrethram *Penis*, ibique se affigere, ac per meatus à modò excreto femine patentes in *Prostatas* predictas se inferre. Verùm, quàm valdè à viâ, vt aiunt, aberraret, indicio est hoc, quòd nempè emissio masculino femine muliebri itém iàm effusū est; Vrethra autem *Penis*, quandiū illius eiectioni incumbit, posterius admittere non potest. Quamobrè & hoc eo interim frigescat decet, ac propterea impar euadat cœcis Vrethre meatibus permeandis. Quid! quòd hæc interdum etiàm educto è *Vagina Pene* femine stillare solet! Qui igitur aliud liquidum admittat? Linquo, quòd tubuli ab Vrethrà in *Prostatas* transeuntes valvulis ditati sunt, adeoque extranei cuiusvis corporis intrusioni resistunt. *Archiatři Monspellienses*

ses [saltém à quibus hoc audiui] in eâ sunt fir-
missimi sententiâ, vt existiment dictum pus
primò se intrudere in Corpora Neruosa; tùm
verò motu corporis impudico propelli ad *Pro-*
statas penès illorum fibras. Contrà quos ta-
men clamat experientia. Qui enim corporis
gyrationibus atque occurribus infandis mobi-
les veneni particule in Neruosa corpora intro-
ductæ cōpellantur ad ipsorum basin, si influen-
te tùm alacritèr cruento spiritu pro *Penis* ere-
ctione indè potiùs repelli debēt? et quid præte-
reà, si *Bromium* [comico vocabulo] in *Cavita-*
te verè *naviculari* innatet potiùs, quàm vt
pressuram sustineat? Iunge, quòd Neruosa
Corpora ad *Pubem* desinunt, inque istius os
inferuntur, non ad *Prostatas*; ad quas adeò
nullæ *Penis* fibræ [si demas, quæ *Urethr-*
am constitvunt] ultimò terminantur. De-
nique non desunt, qui Venas auocent in cau-
sâ eiusmodi transmissionis. Sed, quoniàm
venæ [*Hypogastrica* & *Pudenda*, quæ duæ
Peni vnicè consulunt, atque altera qui-
dè per interiora eiusdem expatiatur, alte-
ra per exteriora] rectà Iliacam internam
ineunt, videretur sanguinem antè contami-
nandum esse [vnde & non rarò aliqui absque
prægressâ vel minimâ *Pudendi* labe in luem

præfocantur] quàm vt Prostata ad Gonorrhoeam disponantur . Loquar itaque cum *Blancardo*: Via, per quas humor iste, seu potius venenum (meretricium audit) in Prostatas ducitur, non adeo sunt manifesta, ideoque res hic accuratè rimari oportet. Per arterias, adduci nequit, quia vasa hæc sanguinem quidem adducunt, sed nunquam versùs superiora reducunt; neque venæ esse possunt, quoniam illæ ex omnibus partibus sanguinem superfluum ex tenuioribus vasculis ad maiora & ampliora reuehunt: neque nervi, neque vasa lymphatica sunt. Quales itaque vias demonstrabo? &c. Dico me peculiare ignorare vias. Quod si nihilominus in re dubiâ coniecturis uti licet, dicam hoc saltem à nemine contendì, virus nempe illud à pellice eiectum è *Lacunis Vaginalibus* propudij tempore descendere in magnâ copiâ per complures foraminulos circâ *Glandem Clitoridis* existentes, parique impetu irruere ad radicem *Penis* tunc in *Vulvam* intromissi. Quo stante hæud improbabile videtur posse eiusdè salia, præsertim volatilia, & quæ dicto tempore adhuc magis fuerint attenuata: posse, inquam, penetrare in substantiam *Penis* spongiosam tum etiâ apprimè rarefactam, beneficio imprimis serosæ partis sibi prouehiculo inferu-

feruientis, nec nisi à *Prostatis* medioxumam
eiusdem *Penis* regionem occupantibus vlti-
mò remorari. Quibus si adiungas analogi-
am, quæ est inter *Lacunas* muliebres & *Pro-
statas*, ambarumque humores, concludes ad
extremum, virus suprà enunciatum has
nullo negotio debere impetere. Posset et-
iam dici, quòd, penetratâ carneâ *Penis*
substantiâ, etsi *Vrethre* exteriorē partem
inuasurum esset duntaxat; nihilominus ta-
men, quoniam hæc continua est cum *Pro-
statarum* parenchymate, pedetentim, vt scin-
tilla in escam, ita idem virus in illud se se
insinuet, & cum maximè perbreue sit iter
è radice *Penis*, quò nimirum id eiaculari di-
ximus ad *Prostatas* præfatas. Quid? quòd é
ratione minimè videtur, si vtrumque ac-
cidat, præcipuè cum venenum illud par-
tes, quascunque lymphæ proluit, impe-
tere consueuerit ob analogiam originis; sic-
que tum *Vrethre* spongiosæ parti, tum & *Pro-
statis* adhærescere. Quicquid sit: sufficit inda-
gasse quamobrè id ad *Astites* eiusmodi peru-
eniat in quo iterum non audiendi sunt, qui
autumant has non esse virilis Gonorrhoeæ
fedes. Quippè licèt in cadaueribus hoc morbo
infectorum obseruatæ fuerint à nonnullis

Prostata benè habentes, quid mirum? Fermentando etenim non corrodendo, Gonorrhoeam agit virus totiès deprædicatum. Quæ res est, vt solide illarum partes non nisi à longo temporis tractu labem contrahant vt in sequentibus ostensuri sumus.

IV.
Et Pro-
cessus
Morbo-
sus.

Ergò virulenta salia lymphæ *Prostatarum* nupta, mediantibus videlicet oleosis hamis consimilibus, idest à *Prostatis*, siuè *Lacunis* muliebribus [vt dictum fuit] elaboratis, quoniam post cum eiusdem moleculis, vtpotè acidulis, non autem acribus, congruere non poterunt, intercepto iccirco etheræ materiæ per has influxu, planum est rotatura se se circum istarum angulos, obuersantesque oleosos flocos ità inflatura, vt, cum in consueto carcere consistere amplius nequeant, foras, tanquam ebulliendo, ij exspumare cogantur. Atque hæc quidè ratio est, cù in principio tenuis apparet Gonorrhœa. Processu namque fermentationis, quando virulenta salia vnà quòque eructantur, filamenta illa lucem reflectunt, vt coctum quid, siuè albedinem repræsentent. Haud ità tamen eructantur præfata salia, quin aliqua ipforum pars in *Prostatis* sempèr restitet, vt fermentum, quod lympham deinceps pro-
uen-

uenturam in sui similem fingat, sicque diu fluxum cieat illum, qui *præternaturalis*, *involuntarius*, *intempestivus* materia cuiusdam, vulgo, *excrementitia* & *corrupta*, propterea appellatur, *Galeno*, etiam *perpetuus*. Quo ita se habente, non renuo, inuentum iri nunquam ab aliquo vestigiū vlcis in *Prostatitis* eius, qui ab vno, aut altero mense *Gonorrhoeicus* factus sit, adeoque fidem in hac parte promereri *Blancardi* testimonium, qui nempe in duobus cadaueribus illud non reperit; sed nec propterea censeo detrahendum quidquam *Virsiugo*, qui idem observauit in tribus, ob nimirum diuersam, seu diuerso à *Gonorrhoeæ* exordio, tempore celebratam cadauerum sectionem. Sanè quippè ineunte morbo aper- iuntur vascula sanguifera, quæ interiorem *Prostatarum* ambitum peruadunt: quòd videlicet perseverante fermentatione ac inclu- si humoris turgescentiâ sicuti is extenditur, ita illa denique disrumpi debent. Indicium profectò huiusmodi rupturæ est flauedo, quâ *Gonorrhoea* tingitur tunc temporis: ac tunc porro nulli dubium fuerit, quin vlcus in *Prostatitis* inchoetur. Verum quòd & ab initio hoc fiat, non credam. Lacerantur equi- dè ab initio sphincteres, seu fibræ con-
strin-

stringentes ostiola meatuum, per quos *Prostata* hiscunt in Urethram, proptēr scilicet affrictum acris materiæ incessantēr pręterlabentis; minimē verō tubulata portio, aut granula glandulosa, quæ medullam earundem compingunt. Hæc etenim, nisi ab ulcerofo miasmate extrinsecus fuerint adorta, nil perferunt: laniata verò, & vasis sanguineis, lymphaticis, roriferis vnà discriptis, Gonorrhoeam dant Protheiformem, seu mille coloribus præditam.

§. 2.

Jàm verò modò indicatam Sphincterum diuisionem plures argvunt in causâ Dyssuriæ quæ ipsi Gonorrhoeæ primordijs intervenire solet: quòd videlicet non attenderint vti illa, vel antè, quàm hæc incipiat, præsto sit. Quippè alitèr, erosionem lentam, seu quæ nonnisi à longo tempore contingit, tam immeritò non inculparent. Sciscitaberis iccirco, vnde-nam igitur talis ardor cieatur? Resp. ex Urethrâ congruè satis à proprio humore non oblinitâ, imò & ab eodem persæpè vellicatâ. Nouimus etenim istum, vt & succum *Preputij* & *Glandis*, foetus esse, veluti gemellos, lymphæ ab *Inguinalibus* glandu-

J.
A Gonorrhoeâ incommoda in Prostatis.

dulis emanantis. Hoc posito, certum est quòd infectum liquamen muliebre, sicque, ut iam alibi dictum est, volatile redditum & aquosum, in secessu suo in *Penem* impingere debet in lymphæ-ductûs à nupèr memoratis glandulis procedentes, seque adeo cum eadem lymphâ commiscere: quo facto, ut hæc fermentet necessum est, ita acido-volatilibus particulis exaltatis, oleosisque staminibus ex-tentis [hoc est ex hamatis in filamentosas moleculas conuersis] humor postea ad Urethram transiens solito tenuior nec non magis fluxilis habendus erit. Iamque ex hac fluxibilitate quoniam præfata stamina oleosa interstitijs fibrarum, quæ telam eiusmodi meatum [scilicet vrinarium] inuestientem, contexunt, adhærere nequeunt, fiet, ut ab-lato, veluti munimento, vrina porro armoniaca sua salia exerceat in dictam telam, ad-eoque intèr mingendum cruciatum excitet illum, qui à calore Vrinæ Ardor appellatur. Quamquam, circa huius causas dici etiam potest quòd exaltata salia lymphæ supra-dictæ, rursusque ab interueniente lotio magis acuata & in actum exerta ardorem illum augeant, ut est manifestum; ac denique quòd *Prostatis* ad fermentationem dispositis, vri-

na proximè tranfiens calefiat, quò magis inermem, fiuè potiùs dilutam, quàm delinitam Vrethram perfodiat. Verùm quicquid de his fit; lympham certè initio Gonorrhoeæ fermentefcere in *Mentulâ* declarat iterùm. Urethræ mucus, vt qui dicto tempore limpidus inftar aquæ, ac tenuis labitur ex eiusmodi canale, ficque fordidæ ægritudini præludit: declarat, inquam, vltèrius alter humor lymphaticus, nimirùm *priapina* smorchia, tunc etiàm folito liberaliore prouentu exundans; ac tandèm rubedo *Glandis* ex virulentis fermentantibusque falibus eius fibras crispantibus, inque iftarum interitijs sanguinem remorantibus, vt consideranti patefcit. Hâc occasione non fimulabo dubitare me, an aliquis è ductibus lymphaticis fupradictis è *Pube*, atque è radice *Penis* refleâat ad *Proftatas*: in quo casu liquidò conftaret via venenati miasmatis ad has glandulas. Sed oppones quòd, quemadmodùm fluxio humoris Vrethram oblinientis, alteriusque intrâ *Glandem* & *Præputium* transfudantis breuî ceffat [lymphâ videlicèt, quæ infecta fuerit, expurgatâ] fic in tali casu parùm Gonorrhoea perduraret. Ad quod resp. venenum ad *Proftatas* deriuatum in datâ occasione eterna

erna femina iacturum: quandoquidem illarum vesliculę, ambages, sinus &c. hæc diu asseruare & multiplicare valent. Postremo dari tales lymphæ-ductus à glandulis *Inguinalibus* ad *Prostatas*, ostendit *Bubo Venerens*, qui *Gonorrhoeæ* aliquadò superuenit propter impeditum scilicet lymphæ accursum ad hæc *promptuaria*, factamque ideo stagnantis huiusmodi liquoris in iisdem ductibus coagulationem &c., vt ostendetur suo loco.

Nunc reuertendo ad Sphincteres per vlorū per quos vlgo *Prostatarum* transilit in *Vrethram*, liquet abradi hos pedetentim ex discessu salium successiuo, eorum nempe, quæ nouimus echinatham formam induxisse. Quippè illorum angulis contrā tales fibras deuolutis hæ tandem exscalpantur necessum est. Sed exemptę non tam liberum concedunt exitum recremento in *Prostatis* ebullienti; verum prætereā eleuantur ac producuntur sic, vt in tubercula molestissima excrescant. Fiunt etiā hæ caruncule in reliquis *Urethre* partibus, vbi nimirum constrictorias glandularum disgregatarum fibras lacerari contingit: quanquam, vt plurimum, imprimuntur ibidem vlcuscula, quæ mingendi molestiam hæud parū adaugent. Et quòd hanc

IJ.
In Vre-
thra

molestiam siue ardorem ; persentitur iste
vel maximè ad culmum *Penis* , propterea
quòd nerveæ Vrethræ fibræ initio exili-
mæ , neque ita atque in alijs partibus simul
compactæ sunt. Quocircà vt in excretionem
feminis voluptate Animum afficiebant, nunc
intèr vrinandum affligunt acriter. Cœte-
rùm acrimonia salium prædictorum , quæ
videlicèt insunt mucco è *Prostatitis* in Vrethrâ
salienti tempore Gonorrhœæ , vel hinc ar-
guenda venit, quòd obseruauerim in nonnul-
lis Vesiculas ibidem excitasse ijs consimiles,
quæ vel igne, aut Causticis producuntur; ple-
rùmque tamèn eæ vesiculæ humore vacuæ
inueniebantur. Ex eo itidèm deprehenditur
quòd in exitu suo ab Vrethrâ sic *Præputium*
proritat nonnunquàm, vt impedito sangui-
nis regressu phymosin pariat. Mitto excor-
iationes , quæ in *Glandis Fræno* ac per totum
Vrethræ ductum ab ijsdem salibus patrari
consueuerunt. Interea, crescente in *Prostatitis*
fermentatione, harum peripheria ampliatur
quæ res est , vt, cùm venæ ac arteriæ iuxtà
transeant , sanguis hinc impenfé rarefactus
influat in *Penem*, indè verò magis condensa-
tus fursùm remeare nequeat ad Cor, impe-
diente nimirum etiàm venarum strangula-
tione

tione: ex quo tandèm sequitur, vt idem *Penis*, ac ptesertim ipsius *Glans*, infletur valdoperè ac rubescat, concurrente ad hoc etiàm multùm situ istius *Membrì*, quod incline se habere solet. Nàmque vt errigitur, dolorem intensissimum affert; & ratio est, quia sanguis, cùm refluere non possit, Neruosa corpora valdoperè extendit: Intendit autèm interdùm sic, vt illius erectio longùm perseueret: qui morbus propriè Satyriasin audit, seu Priapismvm; neque aliam, in nostro casu, agnoscit causam, præter extraordinariam illam *Prostatarum* intumescentiam, cuius ratione sanguis in Neruosa Corpora se diffundere coactus horum fibras ampliat, nonnullas verò etiàm disrumpit, Quid? quòd & aliquandò inæqualis est eiusmodi turgescencia; quandò scilicèt talium *receptaculorum* alterum inflatur, altero in statu suo naturali permanente: ac tùm porrò *Mentula* iàm erecta in partem inflatæ oppositam ferri debet, hoc est, si dextera Ex. gr. intumuerit, in sinistram torqueri, indito proin nomine huic morbo Chordatæ Gonorrhœæ. Nec satis. Nàmque eadem, *Virga* si Vrethræ vuilli aliquibi discissi fuerint, intenta quidèm, ast submissè, tanquàm pudibunda, solum contuebi-

tur. Comitatur autem continuó hos affectus, imò & licet defint, vel ipsam exorientem Gonorrhoeam tensio per totam Vrethrae longitudinem, quæ sané nihil aliud est, meo videri, quàm effectus præcitatae *Prostatarum* inflationis: qualis est prætereà [et quam immerentér ultimo loco recensemus] Vrethrae angustia; vtpote quæ mictûs difficultatem dolorificam ante alia inuehit. Atque tam fastidium istud quã dolores prænarrati interdiù minùs, noctu verò magis intendi cõsueverunt, proptereà quòd lymphæ [in quâ & Gonorrhoeam & coetera *Veneræ* radicalitèr sisti docuimus] cessante luminis actione egriùs mouetur, salibusque instruitur magis fixis: id nimirum, quòd & Podagra, & reliquæ defluxiones abundè commonstrant. Sed quandoquidè de doloribus sermo incidit, non posthabenda hic est Lumbago, seu Renum dolor, quæ Gonorrhoeam sempèr excipit, fitque (ait eximius Præceptor meus *D. Petrus Chirac* Professor Monspelliensis) 1. aut vellatione quùm salia sanguinis inuolucro sulphureo destituta, qualia sunt, aspera ac laterosa per Renes excernuntur. 2. aut distensione proueniente ab iisdem salibus magis fixis, seu grandiori mole amplificatis. Vndè est
pro-

profectò, quòd Renum elices vel carpi, vel extendi debent; vtrumlibet verò in nostro casu. Siquidem in Gonorrhoeâ dispendium est maximum partium sulphurearum: ex quo licet conycere salia sanguinis nullo, adsummum crasso, tanquam tomentoso, sulphure amicta esse: et, si posterius, tensionem in Renibus augeri debere: si prius, punctoria tela. Tales quippè moleculæ nullo discrimine rotabuntur per illorum tubulos membranosos, tumque suas cuspides adhuc fortius impingent in horum fibras, vbi ab vrinoso phlegmate per intervalla recurrente fuerint dissolutæ. Quamobrèm tot iniurijs monitus eò se conuertet Animus; et sicuti ignavus est Autopsiæ Corporis sibi in carcerem concessi, ita dolores illos referet in lumbos qui contrà Renes, gerebantur. Hæc ni tamèn placent in explicatione doloris memorati, dici quoque poterit quòd *Prostatis* vel seorsim, vel vnà cum *Vesiculis seminalibus* per vehementem fermentationem turgefactis, contrahuntur nerui, qui à Renum pelui, medio inter ipsas *Vesiculas* & *Vasa deferentia* loco se in priorum substantiam ingerunt, à quibus postea ad *Prostatas* propagantur. Hac etenim ratione facilè intelligitur, cùr ille.

Ren.

Renum dolor tensivus plerùmque fit, quasi nempè in eo Renes tanquàm per funiculum intendi videantur ad Os Sacrum. Remanent pauca de solutâ Vrethre vnitate: nec vacat loqui de Ulcusculis, ni fortè monere hìc deceat, ipforum ambitum semper esse callosum proptèr membranæ dictam. Vrethram inuestientis structuram callos in vlceribus gignere aptam, vt significauimus; de Thymis & Verrucis etiàm pauca fabimur: quòd nimirùm è genere Pensilium hæ semper sint ob ipsam modò allegatam fabricam tunicæ prædictæ. Tantùm sermocinabimur de Carunculis, quas gigni nouimus erosæ fibræ, & quæ in cincinnum postea reuolutæ sic à nutritio succo fuerant conglutinatæ. Animus quippè in eo est maximè, vt examinem ferocem illam Hyperfarcosin, quæ in Gonorrhæâ vt plurimum vel non sanatur vel etiàm curata multa postindè linoquit incommoda. Pro quo ideò iuuat recordari eminere in Vrethra proxime, atque è regione orificij Vessicæ urinariæ paruum *Septum* ita comparatum, ne semen ab vno latere erumpens in osculum alteriùs lateris impingat [*Vesicula* enim *seminales* vtrimque desinunt, ibidèmq; per geminum orificium exonerantur

tur] circa quod adstant vbique excernicula Prostatarum. Quo stante, planum videtur infectam istarum muccaginem, diuque illac præterlabentẽ debere abradere pedetentim illius fibras; hæc autem abrasio contingere nequit, absquequod vuilli disrupti fursum attollantur. Quamobrẽm accedentibus á tergo humoribus simul incrustati denique in Carunculam abire debent. Hæc itaque communis est opinio de prædicti *Septi*, sèu *Verru-Montani*, aut *Capitis Galli Gallinacei* [sic etenim etiã appellari consuevit illud *Septum*] *Carunculâ Venerea*; verum an hæc crebrius contingat, an illa *Valvularum*, quæ vtrique oculo eiusdem *Capitis Galli Gallinacei* præpositæ sunt (ne videlicet semen in *Vrethram* iugiter emanet] hoc est, quod non credo. Siquidẽ constat has longè inferiùs collocatas esse á *Cristâ* nominati *Capitis*, adeoque magis obnoxias incursionibus veneni *Prostatarum*, quàm ipsum *Caput*: ac propterea existimauerim caruncularum, quæ *Verru-Montani* attribvuntur, maiorem partem esse eiusmodi *Valvularum*; quod vt credam facit hæc observatio. Ipse namque noui complures, qui ab *Hyperfarcosi* in *Vrethrà* probè sanati: eo nihilominus calamitatis adacti fuerant, vt

Observat.

Q non

non ampliùs intèr coeundum semen emitterent; verùm hoc tantùm peractâ re, ac desidente iàm *Priapo* sine delectu & eiaculatione prodigerent: id nimirùm, quod tùm in augmentum & decrementum dictarum Valvularum iàm antea stupratarum diuerso tempore factam repetebam. Sed quicquid sit de sede: Carunculæ eæ certè meiendi negocium non parùm facessunt. quandoquidém Vrethram vel omninò, vel partiatim tantùm, constipando, accedente iugitèr *Prostatarum* turgescenciâ [quâ nempè tubum illũ vel à primordijs Gonorrhoeæ angustari nouimus] Stranguriam pariunt, aut adminimũ vrine stillicidiũ symptomatibus grauissimis stipatum. Etenim primò Dolor acerbus est; quòd vrinosa salia adhuc frequentia è Vellicæ orificio statim irruant in dictos obices. Deindè vlcus gignitur. Nam vellicatis fibris stagnat sanguis illuc transiens vt tandem vascula disrumpat; vel his à circumfluente sanie excisis inflammatio pangi debet, atque abscessus. Tandem verò superuenit & Gangrænosus, deturpato iàm sanguine, aut post prauam curationem.

Relabimur nunc autem tertio ad Sphincteres *Prostatarum* [& ne scilicet obliuiscaris aliquandò, Gonorrhoeam iunctosque morbos ab eius-

eiufmodi laticibus hauriri] Diximus enim illos à prætereunte acrilymphâ fenſim abliguriri, ſicque breuî denique diſiectos liberum exitum eidem linquere. Succedunt nûnc ergò valvulæ, quæ ſunt quædam velut apiculæ appoſitæ ſingulę cuiſibet excretorio poro, impediuntque quominus hi obturentur, nèue extrarium quid in *Proſtatas* gliſcat. Ut conſtrictorijs fibris ſupradictis præſunt, ità vtplurimū earundem fortem ſeqvuntur, niſi quòd ſæpenumerò in Carunculas abeunt, de quibus iam atis. Reſectamus itaque nûnc parumpèr Animum ad inuoluntariam illam ac perpetuam materiæ corruptæ è *Proſtatis* deſpumationem: certum eſt hoc pacto ipſam regurgitare debere aliquandò in bina oſtola, quę oculos *Capitis Galli Gallinacei* ſimulant, & ſic in *Veſſiculas ſeminales* demùm migrare: quòd vt contingat facit etiàm iſtarum cum *Proſtatis* affinitas. Quippè hæ illarum peniculamentis accumbunt, ſua iſdem vaſa concedunt, ac mutua per fibrarum intercape-
dines commercia exercent. Quid igitur mirum, ſi virulentum miasma tranſuolet in ſemen? Jamque infectum tali modo iſtud, nempe ſemen, turgere incipiet ac fermentare, ſicque tandèm foràs ſcaturiet ad eum mo-
dum

Observat.

dum, quem diximus de succo *Prostatarum*: Argumentum profectò eiusmodi turgescentiæ hoc est, quod nempè inuenerim sæpiusculè *Vesiculas seminales* præfatas vltra modum tumidas (quasi nimirum vento fuissent inflatæ) adeoque vacuas. Interea semine vna cum reliquis *membris* virilis recrementis sponte ac perpetuò labente augetur talitèr Gonorrhoea, vt interdum miraculo fuerit: sic copiosissima fuit illa apud *Mellebrök* in *Ephemer. German.&c.* Miratus ego sum magis, quòd non obstante *Vesicularum* turgescentiâ prædictâ nūquam deprehenderim in ijs aliquam vel inflammationem, vel erosionem: quod profectò indè euenisse putavi, quoniam liquor seminalis regiâ veluti continuò erupisset in *Vrethram*; prætereà quia nil anfractuosum, nihil glandulosum in memoratis *Sacculis* continetur, cuius ratione femini mora aliqua prætendi possit; ac postremò, quia nullum sanguiferum vas ad interiorem eorundem membranam penetrat, vt à fermentantibus acrimoniis salibus deglubatur; è contrà semper mucillaginosâ crustâ muniatur. Quocircà si quis nihilominus asserat, contingere nonnunquam in Gonorrhoeâ, vt *Vesiculae seminales* exulcerentur [vt *De Blegny*, qui etiâ *Thierry Hery* allegat

legat auctoritatem] respondebo vlcus illud non nisi ex suppressione eiusmodi fluxionis produci posse: quando scilicet, via seminis impedita, vel occlusa, corrosivæ particulæ gyratæ in *Vesicularum* parietes retorqueri debent.

Rursus ex tali suppressione *Deferentia Vasa* sic interdum eodem semine farciuntur, ut funiculos satis crassos æmulentur; atque eodem pacto *Testes* denique tumescunt. Nam ubi semē indè egredi non potest, obstaculo farcimine præfato, illorum tubuli plus solito ampliandi sunt, eoque magis, si contracto virulento miasmate fermentationem intus perferre cogantur. In hoc quippè casu vi ambientibus vasculis illata, atque inflammatione parta, Tumor in abscessum verget lethalibus accidentibus, ut pluriès memini, coniunctum. Quanquàm hic Tumor, *Hernia Veneris* appellata, indè etiàm sæpius fit, quòd acido-fixa salia acquisito in sanguine quodam prædominio semen postea grumefactum eant, quemadmodum elucescet *cap. sequent.* Sed ad Gonorrhoeæ suppressionem revertendo, diximus suprà, fisti corrupti seminis effluxum, occlusis vijs ob sarcosin quandam, vel propter acidas iniectiones à Barbitonforibus malè ad-

IV.
In Testibus
& Perineo.

hibitas; addo nunc, accidere aliquandò & ab acidis salibus prædictis per lymphæ-ductus, aut per arterias in *seminales Vessiculas* adspertatis planè, vt & Herniam *Veneris* fieri suprà nouimus. Hinc etenim, sicuti præ fermentatione eadem *promptuaria* tumescunt, ità præ hac intumescencia contractis fibris illorum orificia obfignentur oportet. In *Prostatitis* verò suppressâ Gonorrhoeâ, imò & citrà hanc suppressionem, si vlcus ibidèm à viru factum consenuerit, venenosum pus postquàm interiorem substantiam effoderit, terebratis carnibus, pinguedine abliguritâ, fistulas in Perinæo (adde nonnunquàm, & *Scrotum* & *Anum*) denique excauabit, vndè lotium & sanies communibus quasi cuniculis factis continentèr extillent. Interim in Gonorrhoeâ tam *Prostatarum*, quàm *seminaliū Vessicularum* ardore mucus *Recti Intestini* exsiccat. Quamobrèm aqueis auaporatis, terrestres, crassæue eiusdem succi partes tam tenacitèr hærebunt *Ani* parietibus, vt fœces nec vermicularem eiusdem canalis motum stimulare, neque per tam salebrosam viam descensuræ sint deinceps; adeò, inquam, quòd, si demas mulieres, reliqui non nisi exercitati, aut clysteribus inuitati secedat. Excipiuntur autèm foeminæ, quod

Va.

Vagina substantia gracilior est substantiâ Vir-
ilium *Prostatarum*, adeoque minùs subiecta
inflammationi. cum è contrà hæ, vt huic ma-
ximè subiacent, sic intestinum Rectum for-
tius torrere soleant. Iungitur, quòd breuius
est iter ab hoc Intestino ad *Prostatas*, quàm
ab eòdem ad *Lacunas Vaginales* (vbi scilicèt
muliebrem Gonorrhoeam stabulari alibi iam
ostensum est) proptèr interpositum nempe Vte-
rum, cuius orificium interiùs, utpotè crassum
velut in clypeum est intestino ad retunden-
da effluvia è *Lacunis* præfatis emanantia, vt
patet. Itaque superest Marcor[potius Phthy-
sis *Riccardo Morton*, qui ideò conferatur] eius-
modi Catharros sequi solitus ex eo nempe,
quod in ijs non ingens modò sit sanguinis iact-
ura; verum auertitur etiam succus ab alen-
dis membris. Patet hoc planè in Dissente-
ria, Fluore albo, Hæmoragijs &c. ceu in qui-
bus dum humor artuum nutritioni dicatus
ruit, quâ data porta, in malâm frugem, mi-
sellum corpus languet flaccescit, arefcit mor-
iens. Hinc igitur in Gonorrhoeâ cum dispen-
dium sit maximum tam sanguinis (in vlcer-
ibus) quàm & feminis & præsertim lymphæ
(qui ros est verus fibras humani corporis ir-
rigans) necessum est, iis profusis, artus &
mem-

membra marcescant. Atque hoc quidem, senescente iam morbo. Quippè in nòndum antiquo sola virium imbecillitas adest, veluti in ieiunantibus quibus exinanitis vasculis artus non benè sustinent; siue quòd raræ sanguinis columnæ lacertos faciunt debiliores. Ueruntamen in iam prouectâ, siquidè euacuat, quæcumque firmam sanguini conciliare solent crasin, videlicèt balsamicis, siue sulphureis particulis, vapidus is inutilis atque iners remanet in aeterioso genere, sequitur, vt neque globulorum rubellorum compages stricta sit, & succus nutritius minimè cohærescat. Ex illo itaque imbecillitas, ex hoc macilentia subrepet. Hinc ægrotis pallor, facies exanguis, oculi caui, frons contracta, infirmus gressus ac vacillans.

§. 3.

I.
Diagno-
sis Gon-
orrhœæ Si-
mplicis,

TOT de Gonorrhœâ phasibus enarratis, si quis nihilominus ad eiusdem primordia solummodò respiciat, ambiget adhuc de ipsius origine. Noui ego certè [quod & initio Operis testatus sum *Propos. 1.*] Iuuenes alioqui probos paulo post nuptias cum Uirginibus paritèr honestissimis celebratas id morbi genus cotraxisse ex *Venere* nimirum intem-

temperantèr repetitâ , vt ibidèm quòque docebamus. *Aliquandò* (inquit *Georg. Baglivus*) *vt sæpè vidi*, Gonorrhœa corripuntur etiàm homines cum muliere non infectâ coeuntes. Id autem contingit in eis, quorum sanguis particulis acribus, salinis, scorbuticis, vel alterius generis abundat; unde nimio concubitus æstu uniuersa penè liquida in motum concitatiores posita, undulando inclinant ad locum, in quo maior est oscillatio: quæ quoniam est circa vasa seminalia in inguine; si concubitus vehemens fuerit, ac sæpè repetitus, singulæ partes acres salinæq; tunc excitatæ & in motum posita deponi circa Pudenda incipient, semelque incepta depositione, veluti unda sequente undam, aliæ, quæ remanent in liquidis, circulando ibidèm deponentur & sic fluxus perennitatem producent, quæ Gonorrhœa gallica videtur esse, sed reuera non est, quia cum muliere non infectâ supponitur concubitus &c. Verùm eæ Gonorrhœæ erant semper albæ; seu nullo vnquàm flauore tinctæ; prætereà fluidæ, absque Glandis aliquo rubore, & quæ facillè sanabantur: atque vltimò vrina in iisdem etiàm sine insolentiori vredine, & conatibus emittebatur. Discernere itaque si cupis an Gonorrhœa Gallica sit, vel alterius cuiusvis indolis, obserua i. an vrina prætermodùm cruciet

R

ac

accū labore excernatur 2. an decidua materia è limpidò colore candidum perbreuī inducat; 3. demūm (quòd palmarium est) an quotidie augeatur fluxio & semp̄r vergat in deterius. Character namque hic est *Prostatarum* inflammationis, cui si addes post, ruborem *apinæ Glandis*, sordidique eiusdem fuci copiam & liquiditatem, conuenienter satis de *Veneræ* causâ certus esse poteris. Quamuis nihilominus superat hæc, imò & indicia omnia ipsa, Ægri confessio; si videlicet cum muliere suspectâ fuerit conuersatus; quam tamen, si mittendâ duxeris, æquabit animaduertere seriem inuasionis suprâ à nobis prolata. Etenim recensita mala nunquā omnia omnino irrumpunt; sed partim tantū, initio; sub finem verò, toto etiā agmine concurritur. Quod ergò augmentum: nil æquē melius Gonorrhœæ gradus monstrat, ac varius eiusdem color. Quippè hic fermentationis, siue motus particularum lymphæ in *Prostatis* segregatę conditiones indicat, adeoque & Gonorrhœæ vices. Hinc igitur subalbedo eiusdem principium ostendit, siue incipere aliquot sulphurea filamenta ad lymphæ prædictæ superficiem attolli, reliquis sub iugum adhuc remanentibus; albedo dein morbi progressionem

nem denotat, quatinus candor nonnisi ex sulphurum vnitate, idest, à iam concretâ illâ, scilicet lymphâ dependet: ac postremo flauor indicium est effusi sanguinis, siue iam factæ in *Prostatitis* inflammationis. Quâ occasione aperiam hic ego candidè sensus meos, non intelligere me celebrem illam Gonorrhœæ diuisionem in simplicem & Uirulentam. Quandoquidè hæ Gonorrhœæ (sunt *Sinapij* verba) tantum gradu, non specie, siue secundum magis & minus differunt. Sicuti febris à febre (pergit) gradu tantum acrimonia & viscositatis differt, sic & Gonorrhœa una ab altera. Est enim eadem utriusque cura, est idem utriusque, si perduret diutius, pro ratione subiecti & humoris peccantis periculum. Et, si quod causas talis diuisio facta est, non placet. Debuerat potius distingui in *Veneream* & non *Venereâ*. Simplicitas enim nec morbus, nec morbi causa esse potest. Quod si nihilominus illa nomina retinere libet, cenſeo Gonorrhœam, appellari posse Simplicem, quoad in fluxu lymphæ *Prostatarum* continetur; processu verò temporis, ut quandò abscissis vasculis sanguiferis rubella portio vnâ elabi incipit, et sic flauedinem (de quâ suprâ dictum est) ostendit, tunc jure & complicatam, & purulentam, aut, si mauis,

virulentam primitùs esse nominandam.

Deuenimus itáque núnc ad posteriorem; hoc est ad Gonorrhœam virulentam; cuius primus gradus & modò modò ex colore adnotatus est. Sequuntur alij, qui ex colore itidèm, odore, consistentiâ & quantitate paritèr deprhehendi queunt, vt si Gonorrhœa porracea, grisæa, liuida fuerit, itèmque vel sanguinolenta, vel serosa &c. vt quæ vlceris incrementa significant ad amissim vel absquequòd ipse de illorum importantia diù contendam. Percunctabor duntaxat, an Gonorrhœa sit contagiosa, vt nimirum, si quis cum Gonorrhœico dormiat, huius ægritudinem possit attrahere. Affirmat *De Blegnij*, inducitque exemplum pueri nouennis, cui id vitij contingerat ex accubitu supèr genua Patris dicto morbo laborantis. Verùm Ego, nisi interuenerit immediatus contactus fordescentis liquidi cum *Inguine* sani hominis, vt, si subucula, vel aliud linteum illo adhuc calente madidum circà huius femora fuerit prouolutum, non credam Gonorrhœam ab aliquo susceptum iri, Etenim alitèr, virulenta salia vtpotè frigescentia inepta sunt ad qualecunque *Internum* impetendum. Quamobrèm in dato casu censeo, si id ex volatilitate & cal-

efa-

efactione infecti miasmatis factum non fuerit, ex analogiâ saltim humorum, quæ intèr patrem & filium non deficit, prouenisse. Quid nihilominus fauere debet opinioni nostræ, vt qui nouimus Gonorrhoeam in Viris præ volatilitate atque incalescentiâ salium muliebrium accidere. Cæterum [vt hoc quòque notem) opinor etiâ Gonorrhoeam puelli supradicti fortè non fuisse *Veneream*. Quippè adentur in Talibus eiusmodi Gonorrhoeæ, præter *Ballonium* & *Cnoeseliurn*, videatur instar omnium *Laurentius Terraneus* toties laudatus. Quæres denuò ac tandèm, an quis Gonorrhoeicus ex accessu ad mulierem integram, siuè virium firmitiorum se (vti suadetur plebecula) ab eodem morbo sit liberaturus. Respondet *Synapius*: *Plerique* (sunt eius verba) *expleto adhuc & repetito si fieri potest licite) coitu cum femina vigorosa & sana, à Gonorrhoea liberantur*; calculumque addit *Musitanus* narrans de Amico suo, qui re cum Scorto habitâ, eâ que mox cum alienâ, tamen benè moratâ coniuge (et quàm iamdiù impudicè deperierat) repetita, sanus ipse huic è contrâ Gonorrhoeam in præmium corrupti maritalis thalami sit impertitus. Sed quandoquidem iste - met Author fatetur Amicum illum & Amicam Gon-

orrhoeâ non fuisse vexatos, inducor saltem, ut existimem venenata effluvia in *Penem* ex priori coitu contracta vasis lymphaticis inhoesisse eo tempore, quo reccurrens post, in nouo congressu auidissimè lymphæ, illa tandèm in malè-suasæ mulieris *Vaginam* intruderit, sicque hæc fuerit infecta. Aliàs namque si dicta effluvia ad *Prostatas* peruenissent, depleri hæc ità nunquàm potuissent, quin aliqua sempèr veneni particula ibidèm pro noui morbi seminio restitasset; sicque Amicus ille frustra *Venerem* Medicam implo-
rauisset. Sed ad rem.

JII.
Prognosis
Pioris

Prædicturus ergò quidquam de Gonorrhoeâ cogita ante alia, intèr eiusdem species optimam ac mitissimam asse inchoantè, proximè Simplicem, tertio loco Virulentam; et primam quidèm facilè proptereâ curari, difficiliùs alteram, egerrimè omnium postremam: *Quò recentior fuerit Gonorrhoea*, (inquit *Dolæus*) *eo curatu facilius erit*, *Difficiliùs quòque hoc malum eradicator in corporibus pituitosis, aut melencholicis, aut valde plethoricis, quàm alijs*: Faciliùs itidèm in sanis, quàm debilioribus, valetudinarijs, aliquòue morbo deprehensis; et ratio est, quòd ij omnes plurimâ scatent lymphâ, nec non serositate, quibus

bus á Natura *Venerum* tabum hoerescere confueuit. Ob id rursúm, senes & valdè adulti magis periclitantur, quàm iuuenes; Autumno & Hyeme, quàm Vere & Estate: in regionibus demùm frigidis atque humidis, quàm in calidioribus, vt in Galliâ, Italiâ, Hispaniâ &c. Atque hæc generalitèr de Gonorrhoeâ. Nàm quod particularia; Simplex vacat omine, nisi quòd neglecta in Virulentam transit.

IV.
& Post-
erioris.

Virulenta verò vt plurimum est incurabilis præcipuè si *Vesficulae feminales* iam infectæ sint, vt in casu Bergomensis illius apud *Thom. Bartholinum*; ac tùm planè hàud ambigendum, quin fistulæ, Tabes, ac Lues denique *Veneræ* in procinctu sint. Quandoquidèm virulentis salibus sanguini per venas largitèr suppeditatis, vt tota ferè subuertitur Hematosis, ità in corpore nihil linquitur ad vitam. Arguit hoc imprimis liuidus [et qui adeò vtpotè pessimus, postremus esse consuevit] eiusdem virulentæ Gonorrhoeæ color. Hic etenim non nisi a vitriolo in sanguine prædominante pendere solet, siuè ab affectorum locorum gangrænosì: deindè grisæus, qui incipere denotat vniuersalem labem; tùm viridis, qui vlcera malignitatem auspicatur, atque ità successiue, donec ad colores Simplicis Gon-

or-

orrhoeæ iam suprâ designatos perueneris. Vltimò in Gonorrhoeâ languente seminis eiaculatione, eiusdemque robore eneruato, ac seminali denique fermento depauperato sterilitas accidit. Conspiciuntur etiâ in eo vermes, vt cum *Borello* plures meminerunt &c. Insanabiles sunt quòque interdum Fistulæ in *Perinao*; sed non ità infestæ, quin[non absque tamen maximo viuendi incommodo] ægrum vtutivuenem diutiùs senescere permetterent. Tandem sicuti ex Vrethræ hyperæreosi metuenda venit insanabilitas Gonorrhoeæ, sic ex hernia *Veneræ* huius etiâ lues nonnunquàm auguranda.

§ 4.

I,
Cura Si-
mplicis
Gonor-
rhoeæ.

QVOD Concernit Curam; non ablandiri hìc. Ego possum communi Practicorum opinioni, qua asserunt Gonorrhoeam initio nunquàm; sed postquàm *Venerèum* miasma susceptum conuenientèr satis expurgatum fuerit, esse snandam. Quippè (vt & refractariam & temerè audacem indolem Ingenij mei manifestem] fateor me non paucos ab eiusmodi morbo liberaffe ipsis primis ab inuassione diebus, & quidem citius, quàm aliàs post commentitiam illam expurgationem fieri potuisset.

tuisset: nimirum solâ interdum V. *Sectione*,
dieta humectante, cathartico, usu balnearum tem-
 peratarum &c: cum secus id neque primipi-
 laribus, vt sic dicam, auxilijs euicissem. Nec
 dissuadebat ratio. nam, quod *Phlebotomiam*:
 nonnè impeditâ phlogosi *Prostatatarum* ab ei-
 usmodi defluxione eluctari postea dabatur, cū
 videlicet hæc ab illa procedat? C' est là donc
 [ait *Remifort*] qu'il la faut combattre en epui-
 sant les fucs qu'il commence à corrompre, &
 aux quels il s'attache auant que d'attaquer
 les parties solides, & c' est alors, qu'il faut
 auoir recours à la *Saignée* sur tout dans la
 Gonorrhœe pour eteindre l'inflammation
 & ostant la cause, qui la foment. Iungitur
 quod V.S. celebrari debet supradicto tempore
 etiâ ad vrinæ ardorem compescendū. Quod
 victum *humidum*: confert hic in catharris om-
 nibus & in Rhumatismo, hoc est in omnibus
 lymphæ morbis; quos mehercle *diluyente* vi-
 ctu meliùs domari vidi, quàm omnium Pra-
 cticorum frustraneis Receptis; et patet ratio.
 Siquidem *diluentia* serositatem lymphæ con-
 ciliando salinas particulas eliquant, disper-
 dunt, inhabilesque reddunt ad fermenta-
 tionem. Caue tamen frigida [quod pleri-
 que facere consueuerunt] admisceas ijs dil.

uentibus, vt *vitriolata*, & similia fixa; quatinùs lympham condensando, hoc est sulphureas eiusdem strias constringendo interposita deindè veneni salia crescere faciunt, & magis figunt. Quamobrèm de repente interdùm, nec sine magno ægri periculo Gonorrhœam sistunt, id, quod multiplici experienciâ mihi compertum est. Hæc itèm, est quæ me docuit, cùr Gonorrhœa veì solo *cathartico* elidi in ipsa infantiâ possit: Sic *Forestus* curauit *Iuuenem Gonorrhœa, & Testiculi inflatione laborantem cum suspitione luis Venerea* solis *Purgantibus* diuersimodè adhibitis: *Omni die* [sunt eius verba] *ter quaterue secessus habebat cum tanto successu, vt non opus fuerit accedere ad decoctum ligni guaiaci; &*, quod dictu mirum est, nō solùm à *Gonorrhœa* sed, & alijs symptomatis curtus fuit. Conferatur ad hanc rem etiàm *Riuery Cent. 1. Obs. 25.* quâ scilicèt non tam recentē, quàm & antiquam Gonorrhœam *Catharticis* præcipuè remedijs sanari patet. Ratio si quæ- ratur, habetur ex *Syluio de le Boè: hæc* [loquitur de iisdem *Purgantibus*] *si ritè, hoc est, quantitate tempore, modoque conuenientibus exhibeantur, semper conducent, nunquàm nocebunt Ægris, quamuis mōx nihil expurgant humorum peccantium, quippè quos tunc alterant, corrigunt, & ad*
secu-

secuturam postea euacuationem blandam preparant: dicam planius; quia sanguinis particulas agitando, humorumque motum inuertendo, *venereum* miasma à *Prostatis* seducunt. Tandem quod *Balnea & Thermales aquas*: conuenire illa in omnibus *Vrethrae* inflammationibus, *Vrinae* ardore, *Stranguria* similibusque morbis tam in comperto est, vt probatione non egeat; has verò incipientem *Gonorrhoeam* penitus eximere declarant *Acidulae*, quarum efficaciam in tali morbo *Romae* abs me pluries obseruatam hic ideò cum elogio duxi praelegendam. Audio verba tamen increpantium hanc *Gonorrhoeae* sanationem praecocem tanquam incubam mali teterioris: Quid enim [aiunt] retentum in corpore virus annihilabitur? Nonnè solo eoque iugi stillicidio subducitur, hoc supresso intus in malorum fomitem alitur? Praepostera sanè cautio est post receptum hostem fores occludere. Nonnè venenata sunt euomenda? Ad isthæc tam strepera tam rationi sensuique aduersa nemo veniret qui nosset *Gonorrhoeam*, prout senescit, iuxta peierare nihil proficiente continuâ defluxione. Profectò *Prostata* ita nunquam viru depelleri possunt, quin aliqua istius pars in earundem anfractibus sempèr lateat. Et si hoc, cù

ipsum non extinguas priùsquàm ibidém im-
plantetur? Certum est enim vel paucissima
virulenta salia sicuti cum aduentante iugitèr
lymphâ perpetuò fermentabunt, itá novum
virus quotidie productura, vtque quò longiùs
in illis, nempé *Prostatis*, stabulabuntur, sic
eó altiùs ingessura sese in ipsarum poros, in-
uentisq; iccirco vasis capacioribus sanguinem
ad extremum infectura esse, quod est Luem
Veneream gignere. Proptèr quod adéo si initijs
fuerit obstitum, & fermentatio auersa, nullæ
in *Prostatis* incisuræ, nullibi *Venerea* inquin-
amenta manebunt. Quippè penitus attrita in
vasorum cauitatibus nabunt, seque lymphæ
rursùs intermiscébunt. Hinc igitur omninò
disperibunt, & ne hilum quidém detrimenti
afferent sanguini, cuius tamèn globuli inte-
merati tùm primitùs venenum fuerint exper-
ti (etenim exercitus viru sanguis facilè cor-
rumpitur, vt vinum, quod semel contrax-
erit acorem) Quæ igitur vtilitas in mora?
Nonnè, vt coetera mala, sic & Gonorrhœam
præcauere melius, quàm exspectare? Sentiat
nihilominùs quisquis prout vult: Ego certè
in hâc Praxi multum commodi percepi, nec
iucunditatis minus. Conquerebantur scilicèt
Infirmi de Vrinæ ardore, mingendi molestiâ,
Colis

Colis tensione, rubedine & calore; aliqui eti-
 àm humiditatem quandam ex *Vrethra* efflue-
 re denunciabant. Ad hæc propterea *Sanguis*
missionem, *cassiam* cum *cremore tartari*,
Emulsiones, aliaque *humectantia* præscribe-
 bam, indictâ paritèr in rebus non naturali-
 bus *seuera temperantia*; quo factum fuit, vt
 quotquot iussibus eiusmodi steterint, pauci
 ex post *Gonorrhœâ* plorarint. Replicabis pr-
 opterea, & cur non etià *Adstringentia* vsur-
 parim, cum hæc citiùs reliquis medicamen-
 tis negocium expedire potuissent. Resp. quia
 eadem secùs, quam vt *Venerèum* virus eliquent,
 euacuent, aut disperdant, istud potiùs in *Pr-*
ostatis figunt, quo videlicet tandem Gang-
 ræna, aut Sphacelus ibidè innaſcatur: &
 proindè horum metu factum fuisse existimo,
 cur Medici se temperarint à *Gonorrhœâ* ini-
 tio sistenda, proptèr nimirum accidentia ex
Adstringentibus obseruata, id tamen, quod ve-
 tare non debet, quominùs eadem aliundè co-
 hibeatur. Sic *Dolaus* *Diaphoreticorum* vsum
 quòque commendat in dicto casu, ineunte
 videlicet *Gonorrhœâ* formulamque tradit,
 quæ hîc sequitur.

Rx. *Mitrhidat.* 3. j., *bezoard. mineral.* ʒ. iiij.
vel Antimon. diaphoret. ʒ. j. *campher.* ʒ. iij.

*tinetur. ros. rubr. 3. ij. Syrup. granator. 3. iij.
m. f. haustus.*

Sic etiàm Ego *Acidulas* Romanorum aquas (vulgo *l' Aqua acetosa*) nisi vel largis calicibus ebibantur, aut fontanâ diluantur, noxias iudico, quamuis suprà, sèd cum hac tamen exceptione laudatas. experto crede. Interim ni cesset Gonorrhœa, metusque sit, an phlogosis in *Prostatis* iàm peruenerit ad suppurationem expectari hæc debet, abstinendumque ab omni auxilio, quòad abscessus fuerit euacuatus [id nimirum, quod ex flauo eiusdem Gonorrhœæ colore dignoscetur] ac tùm porrò adhuc largiùs quàm in principio Venâ sectâ [nunc enim vberior, quàm dudum puris prouentus est pertimescendus] ad *humectantia & digerentia* procedetur. Huiusmodi processum habet *Spleissius*, cuius hæc sunt verba; Sic *Patavij* studiorum gratia cum essem, vidisse memini Gonorrhœam ex impuro coitu contractam sine ullo sequentis morbi Gallici metu quatruiduo sublatam usu boli ex *Cassia recent.* & *pulu.* *Liquirit. parati*; & *Syrupi ex Emuls. sem.* 4 *frig. mai.*, *lalap.* *Viol.* & *Syrup. de Ibisc.* alternatim sumtis: quæ laudato cum successu per aliquot dies indè sequebantur aut pilulæ ex *Theribenthina confectæ*, vel *Rx. pulu. Charabes ad 3j.*
cum

cum bol. armen. orient. 3. s. in aq. ros. aut plantag. assumpta. Ratio huius processûs patet ex iam dictis. In hoc enim casu *Prostatarum* intumescencia, *Vrinæ* ardor, & putredo ab iisdem *Prostatibus* percelli debent. Quamobrè priori utrique scopo satisfaciunt V. S. et blanda purgatio. Nàm caue irriteris [hoc enim fieret, ut adauctâ sanguinis serositate venefica salia in *Prostatibus* fixiora euaderent, earundè lympharudius fermentaret, & inflammatio denique exacerbaretur] Idcirco præter *Cassiam* supradictam & *Mannam* coetera purgantia suspecta esse debent: *Clisteres* etiâ, imprimis emollientes, vulgo *Lauativi* nuncupati licèt quotidie impositi non parùm conferre consueuerunt: Conducunt etiâ plurimùm humectantia, ut *Balnea aquæ dulcis*. Nam humectant [inquit diligentissimus *Thermarum* obseruator *Andreas Baccius*] & calefaciunt blandissimè: mox aperiunt, leniunt, attenuant, digerunt, reuellunt maximè tepidiora. Deindè *urinam*, & *aluum* cient, sudores atque halitus insensibiles excitant, dolores mitigant, *urinæ* ardores tollunt, somnum conciliant, bonas coctiones moliuntur & vires corroborant. Hinc plures ego noui, qui *Gonorrhœam* ingruere certam ex doloroso mictu præferant, balneis iuxtâ præposita adhibitis

● *observat.*

bitis fuisse liberatos: Et quod Interna, scilicet Emulfiones, Serapia, Ptisanas, & similia, *Aquosa* diuretica, audiatur præclarissimus *Desse*, qui sic loquitur: Dans les vlcères des „ parties honteuses & dans les Gonorrhées vi- „ rulentes l'usage des diuretiques aqueux & „ peu acides est tres necessaire pour deterger „ & euacuer par la meme route les parties qui „ ont etè les premieres infectées. Posterio- rem denique, hoc est detergendi indicationem, complet *Therebenthina* non ita tamen, uti mos tulit, abluenda, seu lauanda; quod proiectione tali operâ salino-sulphureis & maximè volatilibus particulis reliquæ crassiores minùs aptæ sint ad solidas vlceratas fibras defendendas, quo nimirum crescere atque indè augeri queant. Sed delicatulis, & quibus alia exhibere licet, *detersivo* illi pharmaco substitui potest hoc aliud.

Rx. Balsam. de copaiua gut. x. ad xv. dentur cum potu calido. Vel.

Rx. Balsam. Peruvian gut. iij., ol. therebenthin. gut. v., ol. succini destil. gut. x., cum vino cal. saccharato fiat haustus sumendus matutino tempore.

Nàm vespere sequentes pilulæ, tametsi *Adstringentes*, purgato corpore nō erunt inutiles.

Rx.

R̄. Pulu. ofsis sepiæ d. s., corall. rubr. pp. ℥ la-
pid. hematit. a. gra. v. laudan. opiat. ad g. ij.,
cum s. q. ol. calam. aromatic. f. S. A. pilula
sumenda h. s.

Alia demum his similia in hos usus trahi
possunt, quæ sua cuique prudentia, vel alio-
rum maximè pericula suggerent. ac tantum
innuam circa usum *laudani opiat*, constare
in hoc, vel præcipuè, Medici gloriam, si op-
portunè ac scientificè ab eodè administretur

Rapimur nunc verò ad medicationem Go-
norrhoeæ inueteratæ, siue, quam suprà malui
appellare Virulentam: quando nempe vlcus
in *Prostatis*, quumque in vicinas partes, vt *Ves-
siculas seminales*, virus iam repsit. Ad id prop-
tereà nitendum præcipuè, ne hoc ipsum vir-
us vigeat, sed vt omnino deleatur: deindè, vt
idem vlcus abstergatur, & consolidetur; ac
postremò vt pristinus fibrarum tonus parti-
bus restituatur. Primum certè non aliter ob-
tinebitur, quàm *Mercurialia* porrigendo; nec
credamus Antiquæ Scholæ, & Tonforibus, qui
putant extingui sufficientèr posse incendium
Venerereum decoctis suis sudorificis ex *Guaiaco*,
Sarsaparilla &c. compositis Sic enim *Sydenham*:
Nec minore cum fructu [loquitur comparatiuè
ad *Adstringentia*, quorū abusum & nos in prin-
cipio

II.
Et Com-
plicatæ,
seu Inue-
teratæ.

cipio Gonorrhœæ paulo ante damnavimus I
licet periculo minore decoctum lignorum exsiccanti-
um usurpatum comperi; quo scilicet sub pretextu
Specificorum tum uniuersum Aegri corpus,
tum præ cæteris affecta pars iam pridem nimis in-
calescentia ulterius adhuc inflammabuntur; no-
nunquam etiam Gonorrhœa, quæ paulo ante
evanuerat, quod me observasse memini, denuò
in conspectum prodijt. Et ratio est, quam affert
Taury, cuius hic est Textus: L'Antiquité,,
raccommendoit les ptisanes sudorifiques au-,,
ec le Gaiac, l'esquine, la Salse-parille, le Saf-,,
safras, qui sont de bois sudorifiques. A cause,,
des fels volatils, qu'ils contiennent, ils font,,
fortir les parties les plus volatiles du venin,,
par l'insensible transpiration, ils peuuent,,
rompre les pointes fixes de ces acides: mais,,
s'il à des parties grossieres, elles restent; vn,,
corps se trovue desseché; les parties du ve-,,
nin font plus de corrosion, parce qu'elles,,
font moins ecartées; en fin le mal s'augme-,,
nte, & quelque fois le rend incurable. Mer-
curius igitur inuocandus; & primò quidè
præscribi debet sub hoc exemplo.

Rx. therebenth. Venet. ʒ. ʒ. ; mercur. dulc. ʒ. ʒ. ex-
tract. rhabarb. gra. viij. diagrid. sulphur. gra.
iij. cum s. q. pulu. ocul. cancr. præp. f. S. A.
pilu-

pilula in nebulis inuoluenda & sumenda mane; quæ subindè reiterari poterunt cùm occasio tulerit.

In fortioribus itè vnum, aut alterum granum *Mercurij vitæ* adiungi poterit, vt & *purgantium* dosin adaugeri. Siquidè, si alibi, heic in *Gonorrhoeâ* inueteratâ, vbi humores procul dubio infecti sunt, locum habet Methodicorum illud: *Qui benè purgat, benè sanat; & ratio dabitur cap. seq.* Sed neque ob eiusmodi infectionem omninò, verùm eatenùs etiàm repetenda veniunt *cathartica*, quatenùs, vti cõplurimis continuis diebus certa quædam *mercurij* dulcificati portio exhiberi debet, eademque aut minui, vel augeri, prout solerti Medico videbitur, itâ, ne is ptyalismum cieat aliquandò, consultum est lympham sanguineam mediantibus *catharticis* prædictis ad Intestina identidè deriuare. Alterum deindè intentum, hoc est vlceris mundificationem, quod attinet; *therebinthinatis balsamicis*que auxilijs satis euinci id potest. Ego verò in tali occasione balsamum hunc parare soleo, qui me expectatione meâ nunquàm fraudauit.

Rx flor. sulphur. ; radic. aristoloch. rotund. in lamell. tenuiss. dissecta a 3 ij. ; summitat. Centaur. min., Absynth., Hypericon. a. M. j.,
T 2 *sal.*

sal. armoniac. , myrb. , croc. oriental. a. 3 j. camphor. 3. s. ol. therebenthin. ad eminent. 3. digit. digere in vase hermet. clauso super ciner. calid. diebus xv., xx. Decanta ad Us. Dosis à gutt. v. ad xv. agris obasioribus in liquore calido, ut in potu Coffè, aqua Thè, lacte, amygdalato, vino &c. idque sublecti ingressum.

Nàm matutinum tempus *mercurialibus* est cōcedendum, ut diximus; Quod *Narcotica*: hęc nunc minus conuenire videntur: Dùm enim puris efluxum coercent, vlcus ad corruptionem disponunt. Ni itaque Gonorrhœa in magnâ copiâ instet, abstinendum: & si vnicum duntaxat granulum *laudani opiatci* identidem admiscebis præfato balsamo, modò tamen alvus fluat, nil referet. Referet autem maximè ut *Diuretica acria*, Ex. gr. vinum in quo *Cantharides* fuerint affusæ omninò deuities. Quippè ut ut lympham sanguinis corrigere videantur, fermentationem tamen augendo virus alliciunt ad corrosionem. Quamobrém nescio quo titulo illa, & præcipuè vinum prædictum laudarit *Waldschmit*, & cum eó alij: quicquid (ut verum fatear) in præuentione hac mea fortassis decipi possem. Quandoquidè talia nunquàm volui experiri. Tandèm absterfo
&

& mundificato vlcere, quod consistentia, & puris color laudabilis indicabunt, postremum Scopum, qui de Atoniâ partium emendanda est, assequeris per *Adstringentia*; quorum vsus tunc non erit inutilis, sanguine videlicet purgato, & viru, prout decebat, ritè euacuato. Formulas, si piget alibi, vnicam saltem reperisti supra. His non desultoriè utcunque peractis contingit nihilominus aliquandò, vt Gonorrhœa perseueret; fitque id vel ob vitiatam chylosin, quandò nempe ex vsu *Purgantium* assiduo Venter ita proprijs fraudatur fermentis, vt chymum indigestum adhuc transmittat ad Cor, & sic ab acidâ lymphâ virus *Venerèum* magis fixatur; vel ex abusu in rebus nonnaturalibus eidem veneno quotidie classicum canente, ut est manifestum. Quare monitum hic vellem Medicum, respiciat semper ad præfatum viscus, inque eius gratiam modò Stomachica præsidia, modò diætam præscribat: modò denique in Animi pathemata inueheat: *Rhabarbarum* videlicet *Purgantibus* semper admisceat, tabellas diarhodon Abatis & similia, sæpiusculè indulgeat. Aer deinde (inquit *Dolens* imprimis siccus non sit oportet; Cibus sit liquidus, eu-chymus, eupeptus, gratus & suavis, Profunt iuscula

cula carniū cum pane parata Gallorum & Germanorum more, ova forbilia, itēque Elixā omnia: non sic Affata, Acetaria, Conditanea & Infumata. Potus non sit frigidus, aut valdē incrassans, ni fortē Ager ex ijs sit, de quibus *Hippocrates: Victus frigidi*, inquit, *conferunt in his, quibus sanguis erumpit, aut erupturus est, in flammeis ardoribus, ad ruborem & similia*. Caueat nimirū à rebus spiritu vitrioli, aliōue huiusmodi stiptico acidulatas: è contrā verò vtatur *diureticis aquosis* iām suprà laudatis, v.g. miti limonata, emulsionibus parū crassis, atque imprimis aquā fontanā leui neutiquā malitiosā, propinato interdū, seū viciatim, leui etiā aliquo oligophoro. Somnus sit moderatus: vitetur situs supinus, ne vasa circā lumborum regionem incalescant. ob quam causam optimum est in Gonorrhoeā elato capite decumbere, ne videlicet in dorsum contingat resupinari, & quo propterea pacto plures nouimus ab hoc malo fuisse seruatos. Vigiliæ nihilominus nimiae compescendæ sunt. Spiritosiores enim sanguinis particulas turbant, debilitant, dissipant, doloresque in *Pene* adaugent. Motu nimio ac frequenti se egri non defatigent, sed placidē agant. Nocent quippē equitatio, & salta-

saltatio; indèque æger inquietus coercendus
 & vt tranquillus sit admoneri debet. Excre-
 ta & Retenta Naturę normam sequantur. Al-
 vus quotidie officij sui sit memor. Nàm ab
 Aluo durâ ob vicinitatem comprimuntur vasa
 spermatica; vndè aliàs & Gonorrhoeę & Pol-
 lutioni nocturnæ anfa præberi solet. Quamo-
 brèm si subsideat, alio scilicèt, quàm tempore
 curationis, *Suppositoriis* & præcipuè *Clysteribus*
 [qui ideò à nobis, & vt alibi dictum est, *La-*
uativi appellantur] ex aquâ hordei, similibus-
 que *diluentibus* subducatur: et sic etiàm quod
 reliquas naturales euacuationes procedendū
 est. Quod verò spectat Animi pathemata:
 hæc rectis Ægri moderentur habenis: grauior-
 es curę & Affectus, quos intèr primas tenent
 Amor, et *Libido*, absolutè eijciantur. Nàm
 obscenæ cogitationes vltro nec vocatam illā
 (vndè ei nomen) *Venerem* ad nos venientem
 alliciunt, *Penem* sanguine inflant, ex quo de-
 mum *Prostata* inflammatione turgescunt. Vl-
 timò ad veneni fixitatem eneruandā sequens
 Opiata nonnullis est in vsu.

Rx. extract. heder. terrestr. ʒ. j. theriac. Venet.

3. ʒ. resin. Gaiac. 3. ij. sal. volat. succin. 3. j.

Campbor ʒ. j. ol. iuniper gut. xv. M. f. Opiac.

de qua sumantur 3. ʒ. singuli. matut. hor. su-

perbib

perbib. iuscul., vel aquæ fontana haustum, in quo nodul. antimon. crud. parum ebullierit.

Alij in Viperinis iusculis magis confidunt, eademque continuis 20. diebus præbent Infirmis. Verùm Ego neutrum huiusmodi remedium diutiùs protrahendum censeo; ne videlicet tot sudationibus humores in sicco linquantur, convulsioneshque inde oboriantur & læsiones, quæ naturæ functionibus accedunt arefactis recrementis: prætereà, & ne virulenta salia crassis aliòqui indaginibus præpedita ab iisdem sic postea adglutinentur, ut in libertatē afferi deinceps non valeant. Quocirca mallet in tali casu redire iterum ad *humectantia*: quandoquidem 1. quod ab vno non euincitur, extorquetur ab alio, & contrariorum, ut plurimum, alterius vis alterius insufficientiam exequat. Deindè, quia *diluentium* palmarium est salia quælibet extenuare & crassa omnia emollire; ac 3. demùm quia extirpatâ licet Gonorrhoeâ adhuc nihilominus usurpari debent illa ad restituendam, coenoso & sicco sanguini fluiditatem. Quamobrem lactabunt Ægri, tepidâ corpus abluent, serum lactis, acidulata mitissima, aut similia aquea aliquòusque potabunt, seu donèc visum erit denique ad *purgantia* reditare, quæ
etiàm

etiàm esse poterunt huiusmodi.

Rx. mass. pilul. aloephangin. 3. s. extract. enul. campan. 5 mercur dulc: a 3. j. trhocisc. al- kandal 3. j. resin. turbit. 3. ij. ocul. cancr. præp. 3. j. s. ; sal. volat. succin. 3. iiij. cum s. q. syr. de cich. Gul. f. s. A. pil., de quibus cap. Eger. 3. s. ad 3. j. altern. diebus m. superbib. iusculum.

Diebus autèm intercalaribus vtatur sequent. Elixirio.

Rx. tinctur. verm. maial. cum sal. tart. extrac. 3. s. ; ol. tbererbenth. 3. ij., ol. succin. 3. s. bal- sam. peruvian. 3. ij. m. atq. agita exactè Dos. a gutt. xx. ad gut. xxx. & ultra in haust- ulo vini calidi saccharati.

Potissimum tamèn ad Gonorrhœæ sanatio- nem impedimentum est ferè sempèr Hyper- sarcosis Vrethræ. Hæc etenim vti vel vlce- rata est, vel facilè in vlcus abit, sic proximis vel non longinquè hoerentibus *Vesficularum se- minalium* ostiolis saniem influendo, aut alitèr transmittendo fermentationem ibidèm, vel in *Prostatis*, perpetuò alit, recrementa corrup- pit, extemporaneum denique istorum exitum stimulat. Quocircà summo studio caueri de- bet talis Caruncula; et antè tamen inuestigan- dum, an ulcerosa sit, vel fungosa: cuius in-

III.
Curatio
Hyper-
sarcosis
Venerea
seu Car-
unculae
Meatus
Vrinarij

dicium est, si vrina in proportionē debita non excernitur, atque in *Vrethra* impedimentum persētitur; et cūm prētereā in vlcerosā ingens adsit prāfertim in mingendo molestia. Si itaque haud vlcerata sit illa, mittendus primò sanguis ex basilicā; tūm Balnea instituenta, in quibus æger, prout maior, aut minor erit lotij suppressio, se se crebrius aut rariùs [noui, qui ferè singulis horis] demerget; et si vrina demùm penitus intercepta fuerit, Canula, siuè Catheter imponendus, imò & Lithotomia nonnunquā celebranda, vt in *Gallo* quodam ex vrinę suppressione iam perdeliro factō vidisse memini. Quamuis nihilominus haud opus tantā prācipitantiā, si vrina etsi tenuitèr, manet tamèn. quandoquidē tempus vltro dabitur pro Carunculæ extirpatione, nullum videlicet morā periculum minitante. His non desultoriè peractis extirpatio eiusmodi Fungi auspicanda erit vsu Topicorum, ad eum nempè modum, quem docet *Hartmannus*, vel qualem proponit *Sener-tus* itēmque omnium optimè, *Henrycus Regius*, ab ipsius *Scholiaste Ioan. Broen.* ad incudem postea reuocatum; qui quidē curandi modi, cūm apud prēfatos Authores prostant, inutile est hic transcribere. Auctarij gratia tan-

Obferuat.

tantum pauca circa illos adnotabo i. scilicet, ne
candelæ in id operis infumendæ ex sola cerâ
conflentur. Aliter enim frangerentur, & frustra
in *Virga* permanerent herentia [de quorum
extractione exemplū ponit *Molinet.*] Melius
itaque fabricabuntur ad hunc modum.

Rx. ceræ albæ lb. j therebent. 3. ij; quæ cerâ lique-
facta immitatur, & hac mixturâ intingantur
elynychia, sicque fiant ex ijs candelæ parvæ.

Harum defectum suppleant turundæ lineæ ce-
râ ad rigiditatem obduktæ, aut styli ex bar-
bâ balenæ. 2. vt medicamenta huiusmodi in-
strumentorum apicibus inungenda corrosiva
quidem sint, sed non ita, vt ex nimia corro-
sione (vticaueit *Ettmullerus*] gangrænam in-
ducant: quale exemplum infauftum prostat
in *Henrico à Moinichen.* Omnium propterea
corrodentium vices implere poterit emplastrū
Vigonis duplicato triplicato, aut etiā quadru-
plicato mercurio, quod me nunquam fefellit vel
externè duntaxat ad radicem *Penis* applicitū
3. et vt, quicquid in *Vrethram* introduxeris
non finas ibidem diū persistere, ne dolore sci-
licet nimis acerbo [monente *Broen.*] confi-
ciatur æger, & pars affecta inflammetur vltè-
riùs: sed candelæ illa, turunda, aut stylus
corrosivus remoueri debet prout vrget neces-

Observat.

fitas, & vnguentum aliquod leniens eodem modo est intrudendum, sicque pedetentim aliquid consumendum est, donèc aduertatur impedimentum Carunculæ esse omnino ablatum: postmodum verò ad deterfionem, exsiccationem, & consolidationem vlceris procedendum erit mediantibus iniectionibus mòx describendis, aut alijs, quas ex *Vulnerarijs* confeceris; quibus tandèm suppraddetur candela vnguento camphorato inuncta. hæc namque consolidat. Et quod iniectiones; hæc sub Gonorrhoeæ initium ad glabram Vrethrae superficiem lubricandam adhiberi possunt, ex lacte tepido, aut hordeacea *Pari ratione*, inquit *Schmitzius*, si inter meendum intolerabilis sit ardor, urinam reddat eger demersa *Mentula* in matulam lacte, vel aqua tepente plenam; quibus etiàm illam, si acerbius doleat, fouere poterit. Quodsi Vrethra fuerit excoriata.

Rx. aq. calc. viu. tenuior 3. viij. aq. plantag. 3. iij; flor. Zinci 3. ij.

Mixtura hæc [et remedium est *Iosephi Ianchison*] lauentur vlcera in *Pudendis*, vel alijs partibus flabulantia, & ope fyringæ tenuioris iniiciatur; sed leni & constanti manu ducatur. Vel.

Rx. aq.

℞. aq. calc. viii. ℥. j. lythargir argent, ceruss.,
tuth. a 3. j. camphor. 3. ℞. Inijciatur iter de die.

Postremum autem ad vlcerum in meatu vrinario, ad Carunculas etiam vlceratas, de quibus supra, atque ad Sphincterum ab Emunctorjis illic hiantiū scissuras respicit hec alia.

℞. aq. ros., plantag. a 3. iiij., trochisc. alb. Rhas.
3. ℞. bol. armen. 3. ℞. m.

Huiusmodi quippè iniectione mūdificat eadem, & cicatrice firmat. Si veró vlcerum diutius persistant, quasi altas egerint radices, ac Luem sint manu ductura; si, iterum, perdura sint & callosa, nec laudabile pus suppeditare videantur: in tali casu non nisi ab *Escharoticis* ac *Suppurantibus* auxilijs, de quib. *superior. Artic.* tractauimus, leuamen aliquod sperari debet; salusque omnis propterea in appropriatâ Luis curatione ponenda. Hâc occasione: Solent Barbitonfores in Gonorrhoeâ indiscriminatim, & quocunque tempore Iniectionibus maximam partem Stipticis, siue *Adstringentibus* vti. Ego contrâ petulantem huiusmodi methodum quam ad Amiciss. Virum *Laurentium Terraneum* iamdiu scripseram inuectiuam Legentium oculis iterum subiiciam. Deus bonè! hac Reipublica pestis promissis tantum diues & sordida, è *Tonstrina*, ubi coquebas

Observat.

in olla Sparadrappum similesque vernices, in Lares ornatissimos penetrat ad Nobiles ad Plebeios ad quoslibet deceptu faciles, ibidemque, dum manu syringam admouet, altera loculos emungit, Gonorrhœa interim quotidie magis incrudescente. Et nec immeritò fanè. Siquidem Stiptica illa remedia virus coagulare, aut vias Glandularum obstruere debent. Quamobrèm noui aliquot ob peruersas eiusmodi curas Gangrenâ affectos [& quam proinde Membri paralyfis sequebatur] ad extremum isto fuisse mutilatos. Eijciamus igitur Promissores illos, & Vitriolum, Alumen, & similia eorundem pigmenta Sutoribus ipsis aut Cerdonibus vsurpanda linquamus!

IV.
& dem-
um, her-
niæ Ve-
neris

Intèr communes tamen *Adstringentium* effectus non incelebris est *Testium* tumor; qui vbi imminet *Scrotum* imprimis obtusè pungitur Dartos vritac rubescit, æger denique febre corripitur, inque ijs sedibus metuenda inflammatione. Ad hanc auertendam Vena bis, terue, quaterue tundi debet, & prout casus feret, aut æger poterit tolerare. Mox verò tota inugetur regio *Perinæ* inter *Scrotum* & *Anum*, ipsumque etiam *Scrotum* hoc balsamo:

Rx. ol. *Masticin.*, *rutbac.*, *menthac.* a ʒ ij. sem.
rut. & *urtic.* a ʒ i. *cariophyl.* ʒ. ʒ. *cera* q. s. pul-

uc-

uerifat. puluerisand. f. ungu.

Hoc enim resoluisse vel prægandes *Testium* hernias author ipse sum, & quicquid olea pro salium retibus hodièque à Medicis reputentur. Aliàs in minori inflammatione sufficit terra sub Pollionum rotâ concrescens alibi laudata; commendabatque hanc sæpè eximius Præcep. meus *D. Petrus Chirac.* ex eo, quòd scobe ferreâ imprægnata istius volatilitate discutit, digerit, idest sanguinem attenuat, expansumue in vasa debita reducit. *Omnia tamen Topica (Schmitzium audis) ità applicentur, ut Testes minùs dependeant; intercipientes ad latus Pubis accomodetur.* Si verò *Testium* tumor non fuerit inflammatorius, tantùm duritie valeat, tùm fiat inunctio ex balsamo sulphuris succinato [*Doleo* suadente] aut lintea oleo Guaiaci iuncta adhibeantur, quòd citissimè ac potentissimè penetrat. Verùm non est, cùr hic alia apud alios inuestigem, cùm eorundem in libris infinitus sit numerus. Sufficit igitur adijciam, quòd si talibus non obstantibus Tumor in immoto persistit, *Emollientia* tentanda veniunt, ut Cataplasma de mica panis, cui post aliquot dies subrogabitur alterum *Vigonis*, quod dicitur ex quadruplicato *mercurio*. Hinc enim, quod supradicta

dicta olea discutere non potuerunt, semen
scilicet in *Testibus* grumefactum, *Mercuriali*
penetrantiâ resolutum iri spero: et si hoc vnus,
vel alterius mensis spatio continuò adhibitū
non profecerit, denuncio *Veneream* luem altè
iàm ossium medullis insidere, sicque illum,
idest Tumorem nonnisi remedijs hanc Luem
profligantibus expugnatum iri. De *Fistulis* in
Perineo è suppressâ Gonorrhœâ, vel &c. pro-
uenientibus nihil habeo, quod reponam. Signi-
ficabo tantū, cedere has interdum *Antive-*
nereis pharmacis, quemadmodum nempè &
alij quivis *Pudendorum* morbi cedere consue-
uerunt. Denique Gonorrhœa sæpius, inter-
dum quòque initio & inopportunè disparet;
quod si malè moratis, quive vitæ solutioris
sunt, accidat, metuendum planè; non sic, si
abstemijs, & qui vitæ sunt continentioris. Ar-
guit namque ea fuga exquisitam Veneni *Ve-*
nerei volatilitatem in his ægris; denotat in
alijs maximam fixitatem. Sed quicquid port-
endat euasio hæc, immaturè fugientj ne credas
vnquam; vrge pharmaca, absolute victoriam.
Fortassis etenim ex vno miasmate corporis
cuiuspiam angulo infixio ingens populatio seq-
uetur, quemadmodum ex parua scintillulâ
magnum incendium. Accedit, quòd eiusmodi
di

di fluxio recurrit, pausat, languet, definit absque lege, ob excessum nempe in rebus non naturalibus, vti nouimus; vel potissimum, quum peruersa confessione Medicum & adhuc magis semetipsum fallunt Aegroti. Pro Colophone queritur quibusnam amuletis praemunire se quis valeat contra hos morbos. Sed indignatur *Waldschmidt*, increpatque *Magninum*, tanquam parum Christiane scripserit, quod impune quis & securè cum infecta concumbere posset. Neque enim opus est [inquit] ut agatur de praeservatione istorum affectuum, ne maior occasio praebeatur peccandi. Pace nihilominus tanti Viri, non sunt haec scripta, quae ansam flagitijs porrigunt; aut nostra inconsiderantia; aut syus cuiusque stimulus iuxta illud

— *Trahit sua quemque libido.*

Propter quod huic affectui medicaturus *Virgilius* sic loquitur in *Georgicis*:

*Sed non vlla magis vires industria firmat,
Quàm Venerem, & caeci stimulos auertere*

[*Amoris.*

Fugiamus scilicet [inclamat Scaliger] fugiamus pocillatricem illam [Venerem] et ne illud sitiamus,

— — — *unde laboris*

Plus haurire mali est, quàm ex re decerpere fructus.

Quod.

Quod si tamèn Animo non possumus, cùr iniquum erit Corpori mederi? sique illud præferuare non valemus á peccato, istud saltèm liberemus á supplicio. Quamobrèm mitior *Et-mullerus*, misericordiâ, atque in Proximum maiori charitate præditus mentē suam aperire non dubitauit his verbis. *Si cui libeat præseruare se ab hac Gonorrhœa, quam nempe Venus vexat, interim tamen non certus esse potest an cum infecta coeat; is præseruationis loco, mox ante, aut post coitum assumat spiritus, seu olei Therebent. vol. gut. vj., vij., vel viij. in haustu vini generosi; huius enim abstersoria vis meatum urinarium, eiusque sal volatile oleosum abstergit, ac corrigit contagium virulentum forsitan haustum. Nescio nihilòminus, an probatissimus Author de hoc remedio experimentum fecerit: cum viris Septentrionalibus (Deo sit laus) talia experiundi minor occasio adsit, testante Spleissio. Hac in parte, nos Germani feliciores, á iusto Deo, si Venere peccauerimus, temporalis Iudici mulctandi relinquamur, interim alie tam fœda ut plurimum immunes. Vtut verò expertus fuerit; non facile comparatu est plerisque illud oleum, & cùm libido antidotum, aliquandò nolit vel exspectare, vel audire. Dabo igitur aliud remedium expertissimum,*

&

& vbiq̃ue obuium, tametsi terminis parum ænigmaticis: *Accipe* videlicet *Sinceram* post coitum, & *marita*. Sed libet loqui planius, ne fortè censeas approbare me iamdiù reiectam *Synapij* ac *Musitani* opinionem, quã volunt coitu cum sanã muliere repetito virus ex priori susceptum atrahi ab hac, tanquàm à viperæ capite, aut scorpio contuso, quæ proprium venenum resumere existimantur. *Accipe* igitur aquam fontanam, siuè putealem qualemcunque, & benè *Inguen* prolue; sed debet ea esse tepida, seu, ad minimum, non frigida. Hæc enim crebrâ experientia teste plures à Scortorum maleficijs liberauit; et ratio est, quam totiès de *humectantibus*, siuè *diluentibus* tradidimus, adeò vt nosse possis *Ratio-* nem & *Experientiam* in *Praxi* nostra sibi mutuò correspondere.





CAPVT QVARTVM

DE MORBIS VTRIVSQUE SEXVS,

ET

De Affectibus Totius;

Ubi

DE LVE VENEREA

ARTICVLVS I.

De Pano Inguinis.

§ I

I.
Bubonis
Nomen-
claruræ,



ARRAT *Plutarchus* vicum fuisse quendam Atticæ regionis, cuius incolæ Placiadæ vocabantur; apud quos moris erat, vt qui fuisset in Adulterio deprehensus ignominiofas poenas daret impactis in *Pudendam* corporis partem raphanis, qui apud illos miræ magnitudinis reperiiebantur. Hoc tempore si existerent Placiadæ id genus multæ superuacaneum

caneum ducerent. quandoquidē viderent longè acriores raphanos sponte, ex se, crescere in *Inguine* Adulterorum; viderent, inquam, Tumores magnos, dolorificos, duos, rebelles, malignos inuadere præfatam partem, ibidēque præ ferociā itā debachari, vt postquā lentam veluti carnificinam exercuerint, ad extremum Ægros Libithinæ deuoeant. Tumores profectō hos Groeci *Phygethlo-*
nes vocant, Latini *Panos*, (ob similitudinem scilicet, quam habent cum tramæ inuolucris, teste *Nonio*) atque ex *Fernelio* *Phlegmones* sunt in *Adenum* locis emergentes, vt in *Ceruice*, maximè verò in *Alis* & in *Inguinibus*: quamuis alij in his postremis sedibus duntaxat germinari perhibent, vtque rursus ad olera alludant, pro magnis bulbis *Bubones* audiunt.

Comparere solēt hi cum, vel sine *Gonorrhoeā* [quapropter hic etiā a nobis fuerunt describendi] seque inuicem causant, & causantur mutuò. Causa tamen illorum frequentior est, quæ & coeteras *Pudendorum* parit affectiones: muliebre nimirum pus in *Viris*, & *Virile* in foeminis, quæ tali supplicio damnantur. Sed ambiges confestim, quomodò tam foemineum, quā masculinum virus remotum illud, nempè *Inguen* adoriri valeat? *Missā Veterum*

IJ.
Causæ,

sententia Tuathologica nimis & vanâ Recen-
tiores in hoc sunt, vt velint muliebres fordes
(vt nempè á causâ Virilium Bubonum exor-
diar] gliscere iuxtâ *Colem* per externam istius
superficiem vsque ad dictam partem: masculi-
nas autem suffundi foeminis in tali loco, quod
est earundem *Inguina* irrumare. In vtroque ta-
mén decipiuntur. Quatinus in turpi ample-
xu nec foeminina sanies labi ad *Inguen* Viri, nec
Virilis irrumare, seú fucare potest *Inguen* foe-
minæ. Obstant enim ad illud, Maris incuba-
tus: pro hoc, introductio masculinis *membrum* in
Intercapedinem muliebrem: post educationem
autem, neutri Sexui laterales hypogastricæ re-
gionis partes maduisse viru vnquam comper-
tæ sunt, & ni fortè de industria vter alteri
confricuiisset. Insupèr foemininum semen (vt
ad istud redeam) quotiescunque excernitur,
non supernè ad *Clitoridem*, neque lateralitèr
propè *Nymphas*; verùm infernè versùs *Fræ-
num Vulvæ*, adeoque, in congressu maris, suprà
dorsum *Penis* iaculatur; quæ res est vt idem
introrsum potiùs, quàm extrorsum relabatur.
Ad quod faciunt itidem *Labia* eiusdem *Rimæ*
& circumfusi pili, qui omnem illi aditum ad
Uiri *Inguen* prohibent. Sed quicquid de his
sit [pudet enim talia memorare, uolunt postea
ijdem

ijdem Practici, quód, quomodocúnque eò peruenerit siuè muliebri, siuè masculinum. virus, & siuè alterutrum, siuè vtrumque *Inguen* fuerit affecutum, protinús per apertam cutim atque hiantia præ *Venereo* oestro venularum ora ibidém concedat in subiectas glandulas. Quid verò? si nulla eiusmodi vasa ad istas transeant, vt suadere videtur autopsia[neque enim glandulæ imprimis Vesiculosæ suscipiendo sanguini dicatæ sunt), monetque Anatome interdictum esse quodlibet cõmercium vasorum exteriorum cum ijs glandulis mediante Peritonæo, quod eminet superextensum. Nec vacat confugere ad porositates. Quandoquidém nequè hæc tam rectè, nec suffusum pus in tantâ copiâ esse potest, vt perindè, ceú fomenti vires exerat. Iunge, quòd hoc fixum est, eòque magis, vbi ad *Inguen* peruenerit. Qui igitur penetret ad dictas glandulas? Sciturus nihilominus quo pacto menstruum illud venenatum huc irrumpat, reducin memoriam, quæ suprâ, *Artic. de Gonorrhoeâ*, narrauimus de lympheductibus ad *Præputium* descendentibus ex ijsdem glandulis: dices protinús manifestum esse, quamòbrèm tale fermentum á foeminâ eiectum coitûs tempore, si paulò fixius sit, adeò vt ulterius

terius non queat excurrere, vel proptèr aliam quamlibèt rationem in eodem *Præputio* pau-
 fare debeat, supradicta emunctoria dicto ci-
 tius aggrediatur. Constat ettenim, quòd im-
 prægnata isto, & ab austeris menstrui eiusdem
 partibus coagulata lymphæ in citatis vascu-
 lis contenta, vti glandulæ ob impedimentum
 suppeditare aliam postea non valebunt, ita
 retenta hæc & lacunata illarum molem au-
 ctura sit: ac præsertim, quia virus tales du-
 ctus ingressum nullo negotio euaporabit in
 dictas sedes, per communicationem scilicèt fi-
 lamentorum præfatæ lymphæ, non secus pla-
 nè, quàm vt modicum fermenti ingentem
 pastæ massam in sui similem conuertere con-
 suevit. De Foeminis idem censerì debet. qua-
 muìs enim lymphæ vascula in ijs nondùm
 animaduenterim; ob consimilem tamen me-
 chanicem, quam deteximus in Viris, credibi-
 le est illos, idest lymphæ ductus, etiàm in foe-
 minis transire è glandulis *Inguinalibus* ad *Va-*
ginam, sicque aditum præbere halitibus vene-
 nofis à spurco Masculo communicatis. Assen-
 titur *Hippocrates*: *Quibus*, inquit, *ulcus factum*
fuerit in Utero (qui indifferenter ab eodem
 & pro Matrice accipitur & pro *Vagina* [his
febres & Inguinum tumores succedere necesse est,
& dolo-

dolores in his locis ; quibus verbis expresse denotat consensum Muliebrium cum Inguinibus.

Verum cuiusvis demum *Inguen* impetierit idem virus, siue Maris, siue Foeminae, & siue alterutrum, siue vtrumque, nonne patet ibidem existentes glandulas [quæ in vnoquoque quatuor vtplurimum reperiuntur] vel seorsim, vel coniunctim inflandas esse ex stagnatione nimirum lymphæ, quæ indè abire in posterum non valebit, quæque mox à virulentis salibus exaltata turgescere incipiet, ac veluti despumare? Non renuis! En igitur exordia Bubonis *Veneriei Inguinalis*!

Tractu quippè temporis, vti ex tali turgescentiâ vis inferitur membranis tales glandulas occingentibus, ità disrumpuntur vasorum Curalium propagines, quæ ad ipsas metunicas deriuantur: atque hinc porro sanguis, quoniàm extravasatus antiquum partium ordinem ac dispositionem amittit, in fermentationem iccirco raptus superstantes musculos lædit, hoc est, immixtis huc acribus ac volatilibus particulis fluentem in ijs sanguinem contaminat, siue attenuat, alterat ac fermentat adeò, quòd hic è vasis suis eductus externâ inflammatione intrinsecæ respondere pergit. Facit ad huiusmodi inflammationem

IIJ.
Ortus,

IV.
Incrementum;

Y

etiàm

etiam fibrarum Musculorum Abdominis prædictorum [vnum si demas Rectum, vtpotè magis remotum] curuatura, quæ accidit inquantum, quòd subiectæ glandulæ iàm tumefactæ extrorsum superstratas partes cogunt, idest Musculos præfatos. Hinc ettenim vasa sanguifera disrumpi, adminimum sanguinis circuitus in dictis partibus impediri debet.

§. 2.

J.
Matura-
tio,

QVo facto, præter Tumorem, rubedo insolens in *fringine* apparebit: dolor etiam ob distorsionem & fibrarum ex fermentante sanguine vellicationem interueniet; qui hinc adurens [vtpotè Animo sensationem illam ferè ad ambusta comparante] indè punctorius videbitur: quando siuè sinceri, siuè iàm in pus conuersi cruoris moleculæ acicularum specie perstrinxerint Musculorum fibras; ac simul denique profundè lancinans: vbi scilicet in glandulis existens venenata lymphæ aut ob moram exaltata, vel abientem calorem fuerit experta, vel postremò, cum affuso pure in harenam veluti descenderit. Tunc enim glanduloso parenchymate concusso dolebit Animus; et vti carne molliore sunt eedem glandulæ, ita sensum reddent hebetiorem. Comitatur

mitatur intereâ hæc Incessus deprauatus .
Quandoquidẽ ex vna parte, contractis præ-
tumore, qui secus *Inguina* exoriuntur, Cru-
rum Musculis, intendi illa, rigere ac vara fieri
debent: ex aliâ, quoniã maior arcuatarum
in eodem *Inguine* fibrarum contractio fit de-
ductis Femoribus, ne idcirco indẽ augeatur
dolor, Animus vt hæc cautẽ moueat, inces-
sum vitiat. Iungitur, quod turgentes Glandulæ,
dum Femoribus superponderant, re-
ducemque per venas sanguinem deorsum co-
gunt, ampliatis vasculis fartisque Musculis
horum motui frænum iniiciunt. Et hæc equi-
dẽ causa est, cûr in Bubone *Veneræ* Coxæ
turgescunt. Vt enim sanguis infrâ *Inguen* reti-
netur, ita eẽ humore saginentur necessum
est. Replentur autẽ imprimis fero, quod hoc
facile cûm per vasorum poros transudat, tûm
ab eorundem oscillis exigitur. Quaproptẽr
oedematosæ euadunt pedetentim; et, si veno-
sum aliquid fortẽ disrumpatur, etiã erisy-
pellatosæ. Quamuis hæc inflammatio misce-
ri oedemati nunquã consuevit, nisi quũ
Bubo suppurationi maturus est, in quo casu
idem sæpenuerò euanescit; quotiẽs nempẽ
sanies iã confecta nec tamẽ euacuata per
constantem adhuc fermentationem attenua-

Obseru.

Observat.

tur sic ut denique in vasa sanguinea se recipiat. Vidi crebrò illius apertura à Chirurgo interdum procrastinata, mane sequente Panum amplius non fuisse inuentum; sed eius loco aut vestigia Luis, aut Tumorem erysipellosidem de quibus agemus in Prognosticis. Alij è conuerso ad maturationem ægrè perducuntur, vel quod parua salium venenatorum manus ad *Inguinales* glandulas accesserit; vel, quòd singulæ quatuor glandulæ vnitim à viru haud fuerint occupatæ [Duabus etenim aut vna tantum prehensâ, vti lymphæ exindè ad alias minimè infectas subrepat, ita subducto pariter venenoso menstruo minuitur in illis fermentatio, à quâ porrò sanies conficitur] Vel denique impeditur maturatio ex eo, quòd eadem glandulæ non derepente, ast sensim, eâ nimirum ratione fuerint infectæ, ut aliquibus lymphæ flocis primitus coagulatis ceteri subindè nonnisi per successiuam ante strictorum compressionem coaluerint. Quo fit, ut virus glandularum medullarum quàm lentissimè affectum ægrè itidem in fermentationem irrumpat, ut acceleret suppurationem. Atque hoc quidem phenomenon mente nonnunquam recolenti mihi motiua adijcebantur ad credendum lympham è di-

è dictis glandulis, videlicet *Inguinalibus* diffundi in *Penem*, ac per consequens Bubonem Gallicum fieri modo à nobis suprà descripto, planè, vt & ex postrema modo allegatarum, rationum de lenta illius suppuratione colligi abundè potest. Jámq̃ue proximè suppuraturus Bubo, siquidè Corpus quiete, Animum patientiâ orbauerit, fressò idcirco ob diutinas agitationes, præsertim ex fermentantibus in venas quotidie repentibus particulis cruoris massâ febrilis diathesis in hanc inducetur, seu febris illa Suppuratoria vulgò nuncupata, vt est manifestum.

Licet autem ritè suppurauerit ille Tumor, sponte suâ tamen nunquàm aperietur; quòd in partibus longè á Cute positis existente sanie, hæc, potius quàm extrorsum, intrà corpus iter quærat. Perforatur itaque; & si probè successerit maturatio, pus flauum redditur ac saniosum: copia itidè est sufficiens, & laudabilis consistentia; non sic, si illa velut fuerit extorta. Siquidè in tali casu serosum apparet illud, nempe pus, tenue, inolidum, & in paucâ demùm quantitate.

Ulcus deindè, quod Abscessum sequitur, arefcit, ac labia ostendit alba, sicca, & per consequens duriuscula, alio interim, quod tur-

II.
Abscessus.

IIJ.
Ulcus.

gentem exceperit Abscessum, floridis humen-
tibusque obfeto, & quæ demùm vel suapte sp-
onte ad cicatricem perducuntur. Quò minus
igitur periculi in hoc est, eò magis crescere in
nobis debet obligatio de illo edisserendi; vt-
que oris aliquantulum glabris, siuè siccis, ad-
eòque duris reliquimus, sic inspiciamus nunc
præditum etiàm callofis. Calli huiusce causa
à nobis alibi iam lata est; nihilominus com-
pendij ergò hic adiiciemus: quòd decisis are-
scentibus tum Cutaneis, tum Musculosis fib-
ris, ac propterea valdoperè contractis, succi
nutritij elices inter binas quotlibet existentes
obstipantur. Quocircà is ibidem coercitus si-
cuti gliscente postmodum hinc nitro aereo,
indè autem alio Acido-fixo ab infectis glan-
dulis exhalante condensari debet, ita glutinis
formam nactus talia capita [idest coësarum,
fibrarum iam contractas extremitates] ita
conferruminet necessum est, vt margo quæ-
dam, siuè vallum durissimum circa prædictū
vltus excitetur. Nec tam ambitus, quàm si-
nus vlcis præ duritie riget. siquidem distra-
cto in alias partes nutrimento [dicam planius]
Quippè sanguine in Arterijs condensato *Ingui-*
nales glandulæ fraudantur humore suo, pro-
indèque sitiunt continuo ac durescunt. Hinc
itaque

itàque albidus interdum ichor, sed in paucissima quantitate, ac rursum tam viscidus, ut nec abstergi aliquando possit.

Verum non procedente nutrimento Gangræna exoritur, liuent labia, concedunt mortificata: virus etiam ab his in sanas partes raptum fermentatione iugi carnes deuorat, vlcus ampliat. Vidi ego sæpius huiusmodi vlcera phagædenica, depascentia maligna eò seuitiæ deuenisse, ut erosio Umbilico tenus Abdominis Musculis, Pyramidales ipsos è confinijs diremerint, Peritonæum terebrarint. Quocircà inductâ hinc in *Penem* virulentâ lymphâ Phymoses & Gonorrhoeæ, indè verò contaminato Sanguine Februm exacerbationes, Appetitûs deiectiones, ac Diarrhoeæ demum (ut quæ instantis Fatî non æquiucæ indicinæ erant] nascebantur. Quod Phymosin & Gonorrhoeam; hæc erant, quæ me plene persuasum fecerant de influxu lymphæ à glandulis *Inguinalibus* in *Preputium*, *Prostatas* & *Urethram*. Qui enim, aliter, tales morbi euenire potuissent? Coeterò Febris oritur in tali casu ex eo quòd retractum in venas pus, quoniàm ægrè ob molem ibidè circulari, atque ob diuersam partium dispositionem cum sanguine conuenire nequit, Ætereæ materiæ

per

IV
Gangræna.

Observat.

Observat.

per hunc influxu passim ideò intercluso tumultus miscere debet, hoc est fermentationes excitare, siuè Febres: quæ accessione nouæ materiæ exacerbantur potissimum é primis vijs, vt videre est in vlceribus Pulmorum, Intestinatorum &c. Ut verò iterùm in præfatis vlceribus Pulmonum, alijsque morbis ex vitiosa lymphâ, in fine languet Appetentia; ità in Bubonibus vlceratis, febre præsertim adstante. Nàm sulphureis eiusdem lymphæ moleculis constrictis, salinis autèm attritis nonnisi serosum quid labitur cùm ad OEsophagoeas Nostras, tùm ad alias glandulas digestivum menstruum elaborantes, iners profectò stimulus titillandis nervis, siuè, ad Famis sensum inducendum. Sequitur Diarrhoea, & Tragœdiam claudit. Incipit hæc ab irritatione Intestinatorum Ilei & Colon, quâ parte sub *Inguine* obuolvuntur; finitque vt plurimum ex humorum colliquatione, vel priuatione Intestinalis mucci, vt ostendemus *Artic. 4.* Mitto crebras hæmorrhagias Bubonibus vlceratis familiares, vt quæ Prognosin potius spectant quàm hunc locum. Denique Gangræna, si diutius protrahatur, partesque sibi coniunctas in affectionis consortium pertrahat, partemque magnam, ex toto, vita, sensu, motuque priuet, in

Spha-

Sphacelum, hoc est perfectam necrosim degenerat. Sic nimirum partes carnosae magna inflammatione tentata in necrosim incidunt, si huiusmodi inflammatio nec digeri, neque in pus mutari propter suam magnitudinem, calorisque nativi infirmitatem possit (ait *Liebanti*)

§. 3.

Porrò hucusque dicta Diagnoseos loco esse possent *Bubonis Venerei* ab alio nō ipso. Sed permittamus nihilominus adhuc aliquid *Rudioribus*. Ergo *Intertrigo*, qui Tumor similis est *Buboni*, quæque ab exercitio aliquo violento, deambulatione præsertim in aprico facta ut plurimum procedit, ijs nunquam stipatur accidentibus, quæ suprà numeravimus: tantum molestè vrget, hincque paucorum dierum interuallo desinit congruâ refrigeratione; Victu nimirum humido, Resolvente aliquo Topico, ut *Vrinâ*, & Corpori tandem, Animi-que tranquillitate. Pani verò in *Inguinibus* *Mulierum* plerumque à suppressis menstruis aut ex Abortu (quales tamen Ego novi nunquam, neque adeo fieri posse censeo, non obstante *Hippocrat.* decreto, aliorumque prisci cui *Med. Antistitum*, de quo suo loco) ex suis-met causis [si tamèn verè tales sint) elucescunt; ac postre-

I.
SignaDi-
agnost.

stremó Bubones pestilentes nil commune habent cū *Venereis*, vti ex Antecedentibus symptomatibus atque ex Cōuinctis rimari faciliè quivis potest. Superfunt ergo Gallici, quorum promiscua signa esse possunt siuè á Lue dependeāt, siuè à coitu cū muliere immundā. Nihilominus tamen nisi alia adsint, quæ eiusdem Luis præsentiam denotent, obvium est cuilibet de istius exortu deliberare. Quippè ijs absentibus etiamsi durus, etiamsi contumax, parvus, pallidus, rebellis sit Tumor, comprehendet nihilosecius quilibet ipsum à viru foemineo originem traxisse, prognosi intereā in aliud tempus delatā. Generaliter autem Ægri confessio de Bubonis specie decidet; quæ propterea ni spontanea sit, omni arte extorqueri debet; arte, inquam, prudentiæ. Quandoquidē, [redeunt hic mihi in memoriam verba *D. Bartholomæi Torini* quondam Archiatri Pedemontani celeberrimi] *Medicina vel Prudentia est, vel quid affine Prudentiæ*: et ne id tibi contingat, quod ignaris Barbitonforibus; qui dūm Infirmis faciliè aures præbent, horumquæ mendacijs occipiuntur, Bubones porró Phlegmonum aut Furunculorum in morem pertractant, sicque eosdem Ægros tandē in discrimen adducunt, à quo recedere aliquando

dò non datur.

Prognostica facturus obserua suppurantem: videas, an hæc mutatio citò, plenè, rubicundè, viuידè fiat! et dic porró, huiusmodi Tumorem omnis propemodùm periculi esse, expertem adeò nimirùm, vt intèr *Veneræa* pro inculpatissimo reputetur Bubo, modò circumstantijs nupèr allegatis concomitetur: nec abest ratio. Ettenim virulenta salia sicubi fermentent, vbi ad *Inguina* descenderunt; mutata protinùs figurâ nullam organicis fluidisue partibus labem imprimere apta sunt: non sic tamen, postquàm alibi, in corpore, latibula, quæsierint. Postulabis idcirco cùr alij ferotini, alij ad maturationem præcoces Bubones habeantur? Resp. quia (missâ Corporum constitutione, alijsque impedimentis, de quibus fusiùs in Therapeuticis) consueuere interdùm venenosi echini paruo examine conuenire in dictis glandulis; ac propterea, cùm ægrè ibidèm tumultus sint concitaturi, maturationē profectò pigrè sollicitare: non sic verò vbi facto quasi exercitu concurrerint. Verùm enim verò licèt rarum sit, quod agmen eò confluerit, raritas tamen illa lympham ibidèm inquinare capax est, ac pedetentim protinùs in venas repere: è contrà illud, quod nem-

IJ.
Prgnosti-
ca Bubo-
ais non
aperti,

pè fuerit benè condensatum . Tametsi quid-
 èm maius lymphæ inquinamentum [Luem
 scilicèt *Veneream*] ocyùs portendit Bubo retr-
 ocedens , idque siuè è lymphę fermentatione
 nimia , siuè ex alià qualibet causâ contingat.
 Relapsum etenim in venas virus quid, nisi sã-
 guineam diathesin, subuertat? Obseruavi ego
 plurimos eiusmodi Tumorum, ex quo eua-
 nuerant, Luem illam statim auocasse : effu-
 gisse autem plerùmque ferè cùm essent abscef-
 suri . Quaproptèr in quibusdam procrastina-
 ta forte illorum incisione , alterà die Bubonē
 in Erysipella conuersum vidi, quo Abdomen
 confestim circa *Inguen* inflammabatur, & ru-
 bor viuidissimus apparebat cum tumore nul-
 lo, febre interim validè excandescente, ac Le-
 tho demùm consequente . Porro huiusce Er-
 isypellatis si rationem exposcas, tene, que-
 madmodum intèr maturescendum confertà
 fortè sanguinem intèr & virus feruidissimâ ali-
 quâ luctâ indè resultans ichor eatenùs atten-
 uari debuit, vt venas inire potuerit, vapor-
 isque in morem superaxtantem cutem imbi-
 bere . Quocircà extenuato Bubone miliares
 glandulæ obstruendæ fuerunt, abscissisque,
 vasculis circùm repentibus ità inflammande,
 vt hypogastricæ regionis superficiem lam-
 ben.

obseruat.

bente flammâ, vnâque inflatâ glandulâ aliam coarctante, & sic deinceps, ignis ille inualuerit, totam Abdominis inferiorem partem occupauerit &c. His non obstantibus, si, priusquam percrebuerit, elabatur, ac tùm quidèmmollis, albus, indolens fuerit Bubo, minimèmetuendus. Indicat namque se à viru admodū volatile pependisse: quamobrèmet si lymphæ se se immiscuerit, idemque repserit in venas, illic nihilominus nullam coagulationem in hoc nullam malignam diathesin inducturum. Jam verò *Bubones molles boni, crudi verò mali*; quem *Hippocratis* locum sic commentatur *Hollerius*: Per molles Tumores intelligit eos, qui vergunt ad suppurationem, si verò duri sunt, indicant cruditatem materie, & contumaciam, de qua *Poeta*.

— *Latet anguis in herba.*

Quamobrè boni etiàm sunt, qui aspectu sunt sanguinolenti: è contrà verò liuidi, pallidi, aridi, parui; vt qui sanguinem denotant iam esse contaminatum; vel, quòd lymphæ tenuiori parte reasumpta, seu venis confusa, aut aliò sufflaminatâ virus ibidèmm quasi viscatum exerere se se amplius nequeat, ac fermentare; id, quod in Febribus, in Sudationibus, inque alijs huiusmodi euacuationibus ac-

Observas.

cidisse non semel comperi. Rursus, ex eodem *Hippocrate*, Suppuratio, quæ foras vertitur optima est si parua, maximèque egreditur, & in sublime resurgit si verò magna est & lata, minimèque in mucronem subducitur, pessima. Et *Galenus* in Commentario ait: *Constat ut in Suppurationibus indulgentior habeatur, quæ foras, non intrò tendit, atque ex his ipsis, quæ non ampliore prehendit sedem in latitudinem extenta; si verò in sublime feratur Coni formulam reddens, foras expellentis robur indicat facultatis, & iam non magnam erumpit sedem corporis, quod erodit. Quæcumque verò retrocedit (sequor hic ego Hippocratis textum, vtpotè cum meâ, cum aliorum quorumcunque Medicorum experientia sacrum) optima est, si cum exteriori sede nihil communicat; sed adducta est, nec dolet & omnis exterior locus unicolor apparet. Miror, cur non dixerit etiâ mollem; cum Ego retrocedentem huiusmodi Bubonem observaerim nullius malitiæ fuisse, ob virus nimirum in fluxili humiditate veluti suffocatum; et quod propterea supra adnotare non desij. Verum [subdit Hippocrates] si abscessus deletus fuerit nequaquam secreta sanie, difficilis morbus est. periculum enim delirij mortisque imminet: prout nempe in inflammationibus Erisypellatosis*
hâud

haud ità dudùm à nobis animaduersum est. Denique, dum pus conficitur dolores & febres accidunt: et hæc nisi concingāt, Bubo nunquàm suppurabit, siuè maturus erit: prout quisuis etiàm triseclis Chirurgus nouit.

Abscessu facto spes erit multa (inquit Holle-
rij Scoliaſtes) *si pus quod erumpit purum sit, vi-*
delicet vnius formæ, non ex diuerſis naturis com-
mixtum: album, ab ea albedine, quam fibrarum
membranarum & corporum ſpermaticorum inte-
gritas (dixiſſem potiùs exquisitam ſalium iàm
fermentatorum præcipitationem) *inducit, æq-*
uale, ea equalitate materiæ, quæ eſt vniuſmodi
in craſſitie, tenuitate, colore, coctione: leue,
eo lauore quem vis caloris natui [hoc eſt, ſan-
guinis ritè fermentantis) *ſe ſe in omnem par-*
tem inſinuantis proſert; denique minimè fœti-
dum, ideſt ingrati quodamodo odoris, qui eſt con-
ditione materiæ puris optimi pendet (veriùs à ſa-
linis particulis ritè ſubactis]. Quod autèm,
huic contrarium eſt [reſcribit Diuinus Sen-
ex) peſſimum cenſeri debet; & ſi præte-
reà liuidum, cænoſum, fæculentum fluat, aut
qualis amurca. Quandoquidèm talis rivus
fontis inquinamenta teſtatur. Et alibi; *Vl-*
cera, inquit, *ſi repurgantur pure albo, celerem*
curationem indicant: ſi verò in ſanioſos humo-

III.
Vlcerati,

mores transmutentur, maligna fiunt. Prisci nàmque ità *Pus, Saniem, Ichorem* distinguebant, vt *Pus ex sanguine solo suppurato* (quemadmodum apud *Celsum* legitur) aut *carne contusa fiat: Sanies* excrementum tenue & aquosum extrà corpus, quod emanat ex vlcere malo, maximè, vbi neruo læso inflammatio sequitur; *Ichor* aquosa, vel serosa humiditas intrà corpus siuè sanguinis, siuè alterius humoris. Quæ tria tamen post decretam sanguinis circulationem non amplius locum habent: cum à sanguine ipso vnicè deriuentur, & reapse vnum sint pro diuersa eiusdem constitutione duntaxat distinctum. Quocirca indiscriminatim dicere solemus *Pus tenue aquosum, serosum, humidum &c.* Et aquosum quidè pus, saniesue, aut ichor fit, quotiescūque ab acido fixatum fuerit, U. caus. quandò uenenum gallicum constrictis sulphureis illius filamentis serosas intermixtas partes exprimit; aut, quandò sanguinea in vasis condensatâ lymphâ nonnisi serum labitur ad vlcus: in quibus proptereà casibus hoc ipsum vlcus prætumidam oram gerit, siuè callosam, liuidam. Quicquid ex alia parte talia euadere etiàm possunt labia vlceris, quæ albam vtcūque saniem expu-

unt

unt, si modó hæc paulo spissior & iusto viscidior sit, & in pauca demúm quantitate. Quatenús ex hac, siccescere debent dicta Labia; ex illo, decifarum fibrarum capitibus veluti conglutinatis, durescere ac tumere.

Porro callus huiuscemodi in Bubonibus infestus sempèr est. Gangrænam quippè, impeditâ partium nutritione, sempèr manuducit, vt & vlceris grandescentiam, sanie coercita. Mitto Luem *Veneream*, vt quæ subintelligi ex posteriore causâ potest. Coeterû periculosa est illa, scilicèt Gangræna, si adijciatur vel febris aliqua periodica, vel Diarrhœa, vel denique Hæmorrhagia, vt sepe nũero abs me animaduersũ fuisse supra retuli. Et quod hæmorrhagiã: hæc proficua & salutaris pluriès spectata est, ante videlicèt sanguinis infectionem: non sic, vlcere iam inueterato. Quippè illo tẽpore humoris afluxum puris, acrimoniam, fibrarum rigiditatem compescebat; aliàs verò exanthlatis volatiliorum ac maximè balsamicorum salinum reliquijs non nisi vires deijciebat, Gangrænam ac partium mortificationem augebat, vt est manifestũ. Denique (concludit Hippocrates) *ulcus ante mortem, si periturus est homo, lividum ac siccum erit*. Vidi ego prætereà, in quibus etiã pallidum: & profectó, *Pallida mors*.

IV.
Gangræ-
noli.

Observat.

§ 4.

J.
Cura Bu-
bonis Ve-
neris be-
nigi;

EX his collige, Bubonis Suppurationem. omni studio promouendam, & ni spon-
te contingat, Arte extorquendam esse. Spon-
te autem occurret, vt Febris quædam laxa-
toria, dolor bullicans, saturus rubor: figu-
ra item idonea, mollities ac magnitudo iux-
tâ conuenient. In quo casu nullâ interpositâ
morâ ferrum adhibebitur, sectio instituetur ob-
liquè, siuè deorsum ad *Inguinis* commissuram,
vt videlicet pus commodè exanthletur, vtque
iterum sic dissectæ fibræ minùs renuant con-
solidationem. Hoc facto euacuandus, mox-
que abstergendus, mundificandus, ac demùm
cicatrizandus est Bubo ijs penè remediis, quæ
in Phlegmonibus alijs benignis vel ipsi Ton-
fores vsurpare sciunt.

IJ.
Maligni,
siuè non
suppura-
ntis

Sed, si Arte opus, cura, simulac Tumor
urgere incipit, obducas ipsum pulte lacteâ,
seu Emplastro de mica panis, Vnguento de
muccillaginibus, aut alio quolibet *suppurato-*
rio hisce genuino prorsus, quia liquidæ eius-
modi Topicorum partes fixa Veneni salia di-
luere, in fermentationem agere aptæ sunt.
Interim quiuis excessus [præterquam in *Ve-*
nereis] homini permittendus: Chorææ insu-
per,

pér, Tangomenæ, Ludicra, Exercitationes omnes [modò Sudorem tamen non cieant] imò aliquatenùs quòque Crapulæ & compositiones cum vinò imprimis meraciori, cum Aqua Vitæ, Rore Solis &c. ad luctam nimirum humorum in glandulis *Inguinalibus* incendendam. Præscribantur ad hoc prætereà Theriacalia, Iuniperina, Gaiacina & similia plura, donec tandèm euincatur intentum. Ex-
— aduersò euacuationes insolitæ, quoad fieri poterit, fistantur, tum naturales, vt Hæmorroides, tum Artificiales, vt Phlebotomiæ, Purgationes &c. Fugiantur vltteriùs Topica *Repercussiva* appellata, vt quæ virus fixando ipsum minùs habile reddunt ad fermentandum: necnon demùm *Resoluentia*. Quandoquidèm inconceptibile est, quomodò hæc idem virus ex talibus glandulis excussura sint foràsque penitùs eliminaturà. quodsi nihilominus *Suppurantia* præfata, & prætereà alia, vt Althæa, Parietaria, Oleum lumbricorum & huiusmodi alia parùm profecerint, non inutile erit applicare sequens *Resolutivum*.

R^x. sal. armoniac. 3. ij. Galban. 3. ss. ; dissolu. in
s. q. vini generos. ☿ evapor. ad Cerati
consistent.

Malè tamen ipsum *Resolutivum* nuncupavi,
A a 2 cum

cúm potius vocandum fuisset *Incisivum*, ut ex analysi remediorum in id Ingredientium satis constare potest. *Incisivum* paritèr dici meretur Emplastrum *Vigonis* de ranis præsertim quadruplicato *mercurio* cuius in hoc casu virtutem nemo satis commendare novit. Caue tamen intèr adhibendum hæc *incidencia* linguas *Evacuantes*, quæ imprimis fuerint *Antivenerea*: secús resolutio Bubone virus in sanguinem refunderetur: ac propterea, ni casus ferat, atque eiusdem Bubonis mollities id fortasse moneat, abstinendum ab eiusmodi Praxi, & si demùm Medicus solers non fuerit ac sagaci ingenio præditus. Iterùm itaque ad *Suppurantia* recurrendo, si suprà indicata pharmaca absque compendio impensa fuerint, applicabitur quotidie eidem tumori magna aliqua vitrea cucurbitula, quæ inibi spatio ad minimum quadrantis horæ relinquetur: ac remotâ ipsâ, imponetur statim magis acuminatæ parti plummacceolus parvus, magnitudine nummum aureum exæquans, Basilicone obductus, cui anatina pars fermenti triticei cum spiritu Vitrioli parati adiuncta fuerit: Vel inungetur eadem stuppa Emplastro *Paracelsi*, Diaculon. magn. cum Gumm., aut huiusmodi alio. Mitto Cataplasmata Tumores
hosce

hosce rumpere apta, de quibus consulendus præcipuè *De Blegny*; itèm alia *Resoluentia*, imprimis verò folia Aloëtica sub cineribus cocta, quorū, admirandam vim prædicat *Monconys*. Dùm nihilominus hæ machinæ extrinsecus admouentur, applicandæ alię intrinsecus, quæ sopitos excitent humores: administranda, inquam, *Mercurialia*, & primum sub hac formulâ.

℞. sen. mund. ʒ. ij.; inf. in ꝑ. q. aq. font. In colat. ʒ. vi. dissol. cass. recent. extrac. ʒ. j. ialap. pulu. gra. viij.; m. C. deglutit. prius bol. ex mercur. dulc. ʒ. ss. conseru. ros. inducto (vt ne is in positione exhibitus dentibus hoereat : ex quo non pauca sequerentur inconuenientia] Cap. m.

Deindè alia porrigenda, quæ svus cuique mos, aut prudentia dictabit. Neque enim hic processus varios in his casibus describere licet. Iis vsurpatis consuevit Bubo satis de contumacia sua remisisse, vt aperiri demum aliquandò possit. et si res ità se habeat, hoc est mollificatus sit Tumor; quicquid aliundè minimè rubescat, lanceola feriendus. Scindatur ergò ad eum modum, quem suprà ostendimus in Tumore benigno hæc tamen præmissâ differentia, quòd benignus vtcūque Bubo

Observat.

bo quamvis svapte sponte, citò & alacritèr ad
 abscessum properauerit, ni tamen benè ma-
 turuerit secundùm omnia suppurationis si-
 gna, nunquàm incidi debet: econtrà rebellis,
 seu malignus. Præstat quippè in hoc virus ed-
 ucere, quàm vltiorem labem exspectare: in
 illo, ne crudum nimis, idest fixum extrahatur,
 satius est manum continere. Siuè tamen hunc,
 siuè alterum præcidas, caue lanceolam profun-
 dè vrgeas in glandulas. Siquidem diffissæ istæ
 non parum negocij offerrent curaturo. Me-
 liùs itàque res agetur, si instrumento vtaris
 adunco, siuè cultello, quem Galli *Bistory* vo-
 cant. Postulabis quid facto opus, quùm Bubo
 nullâ industria emolliri poterit? Resp. confu-
 giendum esse ad *Caustica*, imprimis verò ad
 Stygium lapidem, vtpotè qui minimè ac-
 idus sic, vt cœtera, escharæ ambitum exacer-
 bare, aut figere non solet. Quo igitur is ma-
 gis dolori parcat, in pollinem tenuissimum
 redactus *Digerenti* alicui Cerato, V. g. Diacu-
 loni inspergetur, latoque ordine extendetur
 suprà Tumorem. Vndè fiet, vt amplitèr ad-
 usto istius culmine, ablatâque escharâ ope
 alius *Digestivi*, Abscessus postea pateat, adhuc
 magis, si res tulerit, dilatandus.

IIJ.
Aperti.

Jàm verò implebitur subindè hic abscessus,
 siuè

siuè vlcus Butyro, vel Basilicone, quo mediante in longum tempus expurgari finetur. Ac macie porrò sufficientèr exhaustâ locum habere poterunt i. quæcunque Labiorum vlceris inflammationem, duritiem, liuoremque, si fortè acciderint, expiare valent, puta *Mercurialia* internè: externè verò cùm alia suprà, *Artic.* i. , proposita, tum imprimis fomentum pro Gangræna. Deindè ad Vlceris mundificationem facient Vnguenta Apostolorum, de Apio, & similia: ad Cicatrizationem autèm imprimis mel rosatū hordeaceæ infusum, tùm absynthiaca, atque in fine calcaria aqua, prout nimirùm in alijs viceribus fieri consuevit. De quo videantur Practici.

Quodsi tandèm Gangræna oborta fuerit, remedia quælibet externa parùm proficient. interna potiùs & quæ Luem ipsam *Veneream* profligare solent, erunt inuocanda. Nèc tam in Gangrænâ, quàm in alijs Bubonum constitutionibus *Antivenerea* congruunt. Siuè namque perdifficilem eorundem suppurationem, consideres; siuè Herpetibus, Inflammationibus, lethalibusque plagis metuendam retrocessionem: siuè demùm, quæ horrendissima sunt, Sphacelum, & vel à ritè pertractato vlce-

IIJ.
Sphacel-
ati.

vlcere se se in corpus insinuantem Luem, fatius
 existimabis Ægros aduersus tot mala præmu-
 nire, quàm ab ijs præuentus de ipsorum postea
 salute certare. Sed sciscitaberis, ex quo háud
 valdè perperàm curatus Bubo, nihilominus
 malitiæ suspectus esse debeat? Resp. quia dif-
 ficile est, quin virulenta aliqua particula in
 venas cum tempore gliscat, & quæ post per
 idem vlcus non poterit euacuari. Aliàs autèm
 prauæ eiusmodi curationis causa vnica, post
 Patientem, esse consuevit Medentis inscitia:
 ille, inquam, si cachecticus sit, si Bubonem
 seriùs ostendat; hic, si missis debitis animad-
 uersionibus, temerè, nulloque iudicio rem,
 infectetur. Liquet hoc satis hincè præposte-
 ré Verecundorum quotidiano errore, qui vi-
 delicèt, dùm clàm sibi consulere fatagunt, ap-
 ertè sunt improuidi: indè veró ex inauspica-
 tissimis illis Barbitonforum medicationibus
 tot monstrorum matribus, quot olim ne Ler-
 na quidém. Vapulet nihilominus sub quem
 quisquis maluerit Carnifice. Medico certè nil
 plùs displicet, quàm quòd passim tales spe-
 ctare debet lanienas, & quùm præsertim sunt
 irreparabiles, vt Enteroceles pro Bubonibus
 habitæ & excisæ, Abscessus malè deterfi, Vl-
 cera disepulotica facta &c.. Dices denique,
 accid-

accidisse interdum, ut cōsulto licet Medico diutinus puris effluxus supprimi non potuerit. Resp. non illū fuisse Medicum: secus phleboto-
mijs atque iteratis Purgationibus, talem tur-
gescentiam castrare calluisse.

A R T I C V L V S IJ.

Subsidiarius

De Morbis Femorum.

OBlitus fueram *Super. Cap.* loqui de Ver-
rucis alijsque morbis, qui *Femoribus* con-
tingūt cū Mulierum, tū Virorum. Nūc
igitur postquā occasio redijt Infirmitates ut-
rique Sexui communes enarrandi, non intem-
pestivum, fuerit quantum de ijs superest depr-
omamus. *Femora* ex *Bubone Inguinis* turge-
scere ac inflammari non itā pridē dictum
est; excoriari verò eadem, ac diuersimodē lac-
essiri debere ex incursione sordidi liquaminis
obuiam habebit quiuis aduerterit veluti Re-
ceptacula esse illa eiusdem colliquamenti tam
ex *Inguine*, quā ex *Pudendo* defluentis, aut
transudantis. Ob quam causam inuestigandū
duntaxāt, quomodò virulenta salia ad prædi-

J.
Rhagada-
es & Ver-
ruca;

ctarum partium superficiem deuoluta, aut affricta, excoriationes illas aliosque morbos gignere apta sint. Quod vt elucescat, non pigebit aduertere, vti putres illæ moleculæ eo loci progressæ frigidæ, tepidæ: hoc est fixæ ac parum actiuę esse debent. Hoc posito, nonnè liquet ipsarum actionem vltra Muccosum corpus extendi non posse? Muccosum autem corpus [quoniàm scilicèt de hoc nullam apud Authores Anatomicos, exceptis *Monspelliensibus*, mentionem factam fuisse inuenio] voco Ego quandam glaredinis speciem mediè intèr Cuticulam & Cutim existentem, vt papillas nerveas Tactûs sensationi dicatas in mollitie debitâ contineat, ab aereo nitro defendat &c. cuique porrò Cutis colores, imprimis verò nigredinem Æthiopum primus tribuit *Polfenus*. Illapsa ergò in hunc Muccum venenosa fallia constat vel istius flocos constrictura, vel cum exhalante ibidèm è miliaribus glandulis transpirationis materiâ bellum initura esse. Si primum; planum est serofas particulas intèr binos quoslibet eiusdem mucci flocos existentes exprimendas esse. Quamobrèm irrigatâ Cute nonnè huius fibræ ità producentur, vt postea se infimul contorquendo in Verrucas tandèm faceffant? Si alterum: certè, vti ex
fer-

fermentatione dirimentur Willi Cutem Epidermidi colligantes, ità disruptis vasculorum extremis capillaribus Rhagades patrabuntur, siuè Excoriationes.

Ex his igitur deprehendet quilibet, qualis sit *Veneri* miasmatis actio in *Coxis*. Sed obseruatales porrigines ac cæsuras non nisi foeminis accidisse, Maribus vtut Gonorrhoea plorantibus, aut alio quouis *Pudendi* morbo affectis semper exclusis [fortè hoc indè esse poterat, quòd in illis virus *hàc atque illàc perfluit*, vt Lemmate utar *Rollenbagij*, quod post exponit hoc carmine.

II.
Mulieribus familiares

(omni
*Pertusum Meretrix vas est, quod perfluit
Parte, nec arcanum, nec Venerem retinet*]

Eà de causà paritèr euenisse arbitror, cùr mulieres inspexerim Verrucis ad *Interfœmineum* frequentius stipatas, quàm Viros; etsi è contrà hi Fistulis in ipsâ-met parte crebrius donabantur, vt nouimus. Nec memini profectò Foeminam vidisse vnquàm cauernosis huiusmodi ulceribus fordescentem; quod me impulit, vt crediderim aliquandò, mulieres à Gonorrhoeâ porris in *Perineo* continuò scattere, rarò Fistulis: mares ex aduerso his quidè crebrò, rarò Verrucis. Quotiès autèm

III.
vt & aliæ
ad *Interfœmineum*:

vsuuenit has ibidè contigisse, obseruauit, non alitèr, quàm vt prefatæ Fistulæ, germinasse ex sudamine *Prostatarum*, aut *Vesicularum seminalium*, & cum hâc solâ differentiâ, quòd fixa fortè fuerint, quæ effluuia Fistulas suffodiebant: volatilia, quæ Porros; et quæ nihilominus cùm iam valdè tepuissent vt in adiposam *Perinæi* membranam conuolarunt, molem iccirco adepta pinguedinis filamenta constrinxerint, serum expresserint, quo cutaneis fibris emollitis Verrucæ denique concinnabantur.

IV.
Earum
Cura..

Sed quicquid de his sit; vbicunque, & quandocunque succrescat progenies hæc, semper tamen veluti vestigia sunt Luis purulentæ, genimina itidè, & quandòque semen. Quare vt deleatur, præstat illam è medio tollere. Nàm quod Topica; blandimenta sunt hæc, & compendia Tonforum; si verò *Antiueneræ* ritè adhibueris, nosces externis medicaminibus haud opus esse, remque te perfectè absoluturum solis Unguentis vel de Lithargyro, vel de Tuthia, vel adsummum denique Præcipitato *Mercuriali*.

ARTICVLVS IIJ.

De Ani Condylomatis.

§ I

Mariscas *Perinei*, sequuntur aliæ *Podicis*: quarum dispares licet causæ sint, de ijs tamen hic agendum duximus, quæ præposteram *Venerem* (heu Propudia! Stomachatur enim ad tam foedam recordationem Animus) inuolvunt; vt, si violenta duntaxat sit, vel etiã polluta: quod tamen ante quàm explicem, euomenda hic mea est nausa in Pædicones istos ac parùm, viros. Deus bone! ad eò ne perpetuum erit illud: Nullum sit pratum, quod non pertranseat luxuria nostra, nulla via, quã non corrumpamus? Annè satis proflare palam, vbique & diù Seruitia infida, Scorta petulca, vltro obuia, postulantia, absquequòd *Venus* in ipsa etiã non *Venere* queratur? Amentiam, si alibi, in hoc certè merito Prisci *Veneres* appellitarunt. Nam quotusquisque (inclamat *Scaliger*) non abijceret potius viuendi animum, quàm vt se se indueret in illos recessus cloacarum, nisi falsa & fortesque species mentem ipsam obruerent? Ità nihilominus comparatum est in natura Rationalium, vt (quod in Beluis nusquàm videas) Sedes ipsa sterco-

J.
Inuecti-
in Pædi-
cones

ris, inuerecundiæ, abominationis omnis, nedum oculos, quos auertere deberet, alliciat; sed prætereà ipsam præcipuam Intellectus humani partem, Uoluntatem; utque in Deam ferè sese statuat, in Supplicationum aram, in gaudium & delicias perditorum. Vah scelus! vah amentia! Sed.

Vale nefandum Idolium Belzebub.

Tibi hæc parantur, ut tuum terque quaterq;

Vrat incensus torris putidum crinem.

(ut nempè Uersus imiter *Virgilianos*)

II.
Condy-
lomatum
genera-
tio sim-
plex

Quod igitur causas; notum est *Anum* finem esse Recti Intestini tribus Musculis instructū, qui ipsum claudunt (ne contenta Nobis inuitis excernantur; vnde & eiusdem Sphincter nominatur] Superiūs crassus multūmque carnosus; tenuior inferiūs & cuti firmiter connexus spectatur: quā parte iccirco fibræ etiā magis constringuntur. Proptèr quod, cum ibidē minùs extendi soleant eæ fibræ, cumque introducto crassiori aliquo corpore præter naturam elongari, seu violentiam pati debeant, sequitur, ut cessante postea istā Elasticitatem, siuè Tonum suum pristinum recuperare amplius nequeant; ver mangulos magis acutos, quàm, antea describant, siue in plicas duplicentur longiores. Nec satis. Quippe

pè succo præsertim nutritio illuc proptèr ipsam eandem solito vehementiorem extensionem liberalius accito, siquidè hic præfatos angulos difficillimè superabit, ad ipsorum cuspides propterea remoratus, arcuatas illas fibras postea irrigabit, producet, alescet sic, vt hæ in papillas denique crescant Cristarum nomine; quicquid reuera Mariscæ sint è genere Verrucarum.

Sed si aliud adiungatur, quod infami plaudent Hymenæo, Gonorrhœa nempè, aut fax alia quælibet *Veneræ*, condensato protinùs à ponticis particulis in hemorrhoidalibus vasis sanguine vti nutritius succus hinc serosus postea euadet, ita magis emollitis, nutritisque illis, idest Orbicularibus (& quæ antea fuerant crispatae) *Ani* fibris, dictæ Cristæ intantum allongabuntur, vt fimbrias, seu longitudinalium fibrarum Appendices veluti simulent.

Interrogarunt aliquando Me Viri Curiosi ecquid mihi videretur, accepisse se ab alijs, vti foeminæ quamuis præposterè stupratæ, stigmatibus tamen eiusmodi non essent obnoxie? Respondi nouisse me aliquot puellas talem *Venerem* passas, & quæ tamen nonnisi Sedis inflammatione tenebantur [quemadmodum etiã inflammata videram *vulvam* infantis

III.
Compli-
cata

IV.
Viri præ
Foeminis
sunt huic
morbo
subiecti.

Observat.

tis

tis sexennis ab impijssimo viro compressæ ad-
spexisse itè me, quibus aliquæ Cristæ super-
uenerant, sed duæ tantum aut tres numero,
atque ita contractæ vt non nisi exquisito tactu
internosci possent. Rationem deindè addidi;
pellem nimirum foeminæ mollem esse, doüil-
lette [vt verbis utar *D. De la Chambre*] & de-
liè, adeoque aptam cedere, neque ita recusa-
re extendi, ac pellem Viri, præsertim in *Pu-*
dendis partibus, vbi pinguedo est maxima
circà *Vulvam* *Ano* proximam, & quæ ideó re-
bus in hunc impetum facientibus locum illicò
præstat: quæ causa est proindé, vt fibræ *Ani*
à *Pederestiâ* illâ parùm violentiæ perferant,
suumque iccirco Tonum continuò conseruent
corpori vtpotè cuilibet introducibili accom-
modabiles. &c.

§. 2.

II.
Condy-
lomatum
numerus
mollities
& rigi-
ditas.

Coeterò complures eademque indefinitæ
sunt illæ productiones, iuxta numerum
videlicet plicarum, seu angulorum, quos *Ani*
fibræ compingunt; quæque adeò, vt increue-
runt, tam confertæ apparent, vt Cristas iam
indicatas mentiantur. Quoàd verò adhuc pu-
fillæ sunt, molles itidè perferuntur. Et-
tenim nutritius succus, vtut egré, influit ta-
men.

men, atque etiamnùm penetrat ad laceffitarum fibrarum extremitates: non fic, fi iam plurimùm adoleuerint. Obftabit quippè infupèr ipsius curfui circumfufus æther, & qui adeò ficcato iftarum faftigio rigidas reddet, quæ marifcæ indè resultabunt.

Nefcio hic ego tamén, qualis ille fit pruritus, qui Ficus huiusmodi comitatur. Uidi namque complures hoc morbo vexatos in libidinem fic exariffè, vt hìc, atque illic quærerent, à quibus incæftarentur. Et profectò, nifi id fortè accidat ex eo, quòd nutritius totiès memoratus fuccus ex acrimoniâ, quam ob moram in ijs Sedibus contraxerit, Ani fibras postmodùm vellicatum eat, adhuc ambigam vndè ille ardor oriri poffit. Aft hìc præterproptèr caufa patet, cùr huiusmodi Catamiti fe prostituere geftiant. Quid verò arbitrabimur de ijs, qui absque dicto incitamento Amafios quærunt? Noui ego Villicum vt facie, fic vitio abominabilem, cùm diu vitam ftupri patientiâ toleraffet, annos deindè fenectutis ingreffus [erat enim ferè fexagenarius] Procos amplius non inueniret, contruxiffe sibi Priapum ligneum non mediocris cùm longitudinis tùm craffitiei: quocum confueuerat mediante scamno aliquo, aut lapide, fuprà quem

I J.
Pruritus,

Obferuat.

tale instrumentum adaptabat, hymenæum ducere; donèc aliquandò adactò penitùs in *Podicem* tali pessario, cum ipsum indè educere non valeret, ad Archiospitale nostrum se transferre coactus est: vbi tentatâ inutilitèr extractione, ad extremum *D. Cechinus* forcipes excogitavit; quibus exempto ligno nigrâ fanie lurido ac foetido Gangræna nihilominùs ità inualuit, vt intrâ pauca Cinædus execrabilis supremum diem clauferit. Accesserat paritèr (quid enim vltiora punitæ impudicitia exempla, dùm huic maledicimus, non offeramus?) eodem tempore atque ad idem Xenodochium alter Rusticus, sèd iuuenis atque habitosus, qui Græcalem vitam agere solitus cùm aliquandò cêu Lydus, vt aiunt, meridiaretur, introduxerat in anulum ferreum satis crassum suum *Verethrum*: cùmque in ipsum, etiàm *Scrotum* vna, cum *Testibus* postea induxisset, accidit, vt inflatis contrectatione partibus eas subindè reducere ampliùs nequiverit. Quamobrèm priusquàm is annulus recidi potuerit Gangrenâ obortâ, miser ille satis cedere debuit. Sed hæc pro datâ occasione, siuè, incidentèr, vt diximus.

II J.
Inflama-

Interim tales excrescentiæ, dùm vigent ac durescunt, citrà apices earundem retento sanguine

guine & coaceruato, non tam prolixius vrgeri debent, quàm aliquo etiàm demùm disrupto vasculo rubescere, tumescere, seu inflam-
mari. Hinc igitur, quoniam subuersâ partium eundem cruorem componentium texturâ etheris incurfus impediatur, adeoque & fermentatio sequatur necessum est: propterea in pus conuerso sanguine idem ad extremum sibi vias aperire, idest suppurare debet. Et en profectò Cristas illas antea ficas, nunc humentes, rubicundas, faniosas!

tio & ex-
ulceratio

Quid verò, si *Veneri* quidpiam adiunctum fuerit? Videbis mariscas illas breuè marcescentes ruborem suum in liuorem conuertere, foetere, remedia respuere, verbo, in Gangrænam induci: Ægrum deindè antea petulcum spectari tristi facie, pallidum, emaciatum, donèc postremò comparentibus alijs Luis *Veneris* signis, atque integrâ Condylomatum mortificatione verificetur *Homericum* illud
Hos fatum & malefacta neci exitioque dederunt.

IV.
Mortifi-
catio &
Gangræ-
na

§. 3.

Controuersum nupèr est ab aliquibus, puer, qui Ficubus eiusmodi tenebatur, è stupro ne ipsos an aliundè sibi consciuisset; Ratio dubitandi erat, quòd matre prognatus per-

Signa Di-
agnosti-
ca sim-
plicium
Mariscarum

hibebatur scortorum cicatrice stigmata. Quamobrè suspicari quivis poterat, Infan-
tem siuè ex Vtero, siuè contubernio, basiationibus
nempè, concubitu præsertim suprà linthea pol-
luta &c. *Venerèa* miasmata exhausisse sic, vt
quemadmodum Lue Gallicâ infectis, sic ei-
dem hæc *Podicem* Cristis distrinxissent. Ad
hæc: decisum à me fuit, Condylomata, de
quibus contendebatur, si vicerata fuissent,
nonnisi *Priapum* habuisse authorem: sin ità,
à Lue *Venerèa* etiàm procedere potuisse; et, si
alia signa comitarentur, quæ mòx dicemus.
Nàm in Lue *Venerèa* Condylomata illa par-
ua sunt & pauca: itèm pallida [cuiusmodi nem-
pè tùm Cutis vniuersæ color est] nec mutan-
tur, aut rigescunt &c. Egèr tandèm pustu-
lis in facie, alopecia, alijsque affectionibus
vexatur, quas afferemus *Artic. sequent.* Si ve-
rò *Venerem* incubam non habuerint, crescunt,
ampliantur, inflammantur, vlcerantur, vt
diximus; at Patiens nec de viuido cutis colo-
re quidquam amittit, neque accidentibus
à Syphillide prouenientibus deprehenditur,
neque demùm vllò alio symptomate, præ-
tèr febriculam, quæ vlcus ferè quodlibet se-
qui solet. Denique dignoscentur Condylom-
ata à Postergatoribus inducta, qui *Mentula-*

gra

gra laborarint, si eadem liuescant, foeteant, sphacelentur, planè, vti retulimus ad calcem *Paragraphi Superioris*. Addam hìc igitur tantum, venisse mihi aliquandò in mentem, vti *Podex* etiàm Virilis, quemadmodum *Wlua* muliebris, ex affrictibus libidinosis *uenericum* focum accendere posset; sed dissuaserunt aliæ causæ à Nobis in *Theoreticis* allatæ, & quas porrò inuenire non est in *Podice* virili, vt consideranti patefcit.

Hoc non obstante, Exolætorum, qui criftofi sunt, maiorem partem *Lue Venerea* affectam vidi; fortè quòd pluribus se prostituunt, intèr quos aliquis sempèr est *Pudendag.* faucius maximè ijs in locis, vbi & virorum ergà pueros, & foeminarum ergà Viros impudens Amor æquè regnat: fin hoc, rursùs dicendum, ex Postergatione Luem illam procreari. Quod tamen ne credam moneor ex eo, quòd obseruauì alios itèm ficosos Adolescentes, sed multà cum zelotypià custoditos, vtpotè à Proceribus in delicijs habitos, sicque vnicè adamatos Siphylide illa nunquàm laborasse. In reliquum Mariscæ in his facile curantur vulgaribus etiàm præfidijs, vti ostendetur, obsecuturæ.

IIJ.
Prognostica Pri-
orum;

IV.
nec non
Posteriorum.

Non sic, quibus *Venus* à tergo est, videlicèt

Veneris fomes: atque hæc quidem, si initio ob pudorem celentur (inquit *Musitanus*) ut plerumque fieri solet, *Multiplicatur Gallica messis*, & nisi appropriatis aueruncentur remedijs in *cancrosam migrant naturam*; Regerminant etiã quamvis conuenienti methodo curatæ; & (modò hæc methodus non sit quæ *Luem Veneriam* pelsundat] varias formas inducunt, *Morarum*, *Thymorum*, *Ficuum*, *Verrucarum*, quæ nunc exiles habent pedunculos, nunc iatissimis potiuntur radicibus &c.

§ 4.

J.
Cura ex
ferro &
igne

INsuper hoc quòque cum *Porris* commune habent *Ani* *Condylomata*, quòd decisa crescunt feraciora. Et sanè ingenuè affirmare possum, quotquot mediante ferro curatos noveram, vidisse exposit, intrà pauca, *Nosocomiũ* repetijse. Quæ autem cura ex ferro? vinciebantur misellis illis vnà manus pedesque ita ut corpus in glomum veluti componeretur, exceptisque mòx quâdam quasi forcipe condylomatis tandiũ premebantur hæc, quoad extenta suprâ illam maximè prominerent. Tunc verò arrepto lato gladio prominentiæ eiusmodi amputabantur iuxtâ bina forcipis latera, quæ rotunda erant, atque ex altera parte

parte funiculo simul ligabantur : denique eie-
cto forcipe atque amputatione facta candens
lamina primò applicabatur, tum glomus fer-
reus crassus pariter & ignitus, qui in *Podicem*
usque intrudebatur tanta immanitate, ut
nemo Adstantium non horresceret, solo pa-
rem culpæ pœnam inclamante Tortore: veluti
iuxta illud

Cæduntur tumida Medico ridente mariscæ ;
atque ultimò *adstringentes* pulveres plagæ in-
spargebantur. Hanc profectò curam, *Lector*,
Auernalem diceres, nec improbandam ta-
mèn, si esset *Eradicatiua*; sed cum ex eâ nihi-
lominùs *Criste* repullulare soleant, ad *Cy-
nosarchas* hoc remedium;

Humanius igitur agunt alij, quiuis vel A-
quâ forti, vel Unguento *Ægyptiaco*, vel Pre-
cipitato, Alumine, Sabinâ, Vitriolo, Vi-
ride *Æris*, *Mercurio* dulci similibusque phar-
macis eiusmodi *Excrecentias* extirpare, siue
potius cicurare conantur. Præstat enim
incrementa morbi saltem impedire, quam
re infecta *Ægrotos* recisos, ambustos, semi-
animas linquere, & cum periculo grauiorum
ærumnarum.

Nos ante inchoandum huiusmodi curatio-
nem sedulò inuestigamus an *Veneri* quidpiam
lateat

II.
& cum
Locali-
bus

III.
ad Chri-
stas sim-
plices;

lateat in prædictis Moris; sique de negatione certi euasimus, Topica solūmodò consulimus reseruatis Internis vt *Purgatio, Vena-sec. &c.* quotiès aliqua alia indicatio efflagitabit, vt Febrilis habitudo &c. Topica autèm, siuè Localia illa esse poterunt huiusmodi.

Rx. aq. plantag. ℥ss. mercur. præcipit. ʒ. iiij. alumin. ʒ. ss. dissoluantur inuicem, & cum penna huic liquori intincta rangantur.

Hinc enim emarcitæ Cristæ pedetentim decidunt; et sic Verrucis alijs etiàm conferre creditur. Peculiarior tamen ad illas.

Rx. aq. calc. viij. & misceatur cum mercur. præcipit.

Hac aquâ fluida, vel linteaminibus huic aquæ intinctis solent eadem Cristæ exsiccare & curari; et si apertæ sint, armoniacalia maximè conferunt, siuè spirituosâ ea sint; siuè salinofixa, vt patet.

Verùm adiuncto virulento miasmate superflua censenda quæcunque Topica: *Mercurialia* intrinsecus, & quæcunque Luem *Veneream* dissipare valent, palmam præferunt. Tu itaque in hoc casu ad eadem confugito, secus inanem operam insumpturus.

ARTICVLVS IV.

De Lue Venerea

§. I.

ARgutè profectò, ac more suo lepidè *Aristophanes*:

I.
Causa
Morbi
remota.

*Tamen postquàm & vinum dignum putabas
Bibere, compotandum est tibi & fæcem:*

videlicèt, quandoquidèm palato Vestro [improbæ *Veneris* Cultores nequissimi!] arriserunt Excoriationes, Tumores, Inflammationes, Abscessus, Ulcera diuersi generis, Porri, Mariscæ, ac similia pocula hucusque indicata [videtur quippè hic mihi rem aliquo, tanquàm Epilogo, inchoari debere) quandoquidèm, inquam, hinc Fæminæ *Pube, Clytoride, Labijs, Alis, Lacunis*, totâque *Vagina* substantiâ; indè autèm Viri *Preputio, Glande, Prostatis*, verbo yniuerso *Pene*, atquè insupèr *Vessiculis seminalibus, Testibus & Scroto*: demùm vtrique *Inguinibus, Interfæmineis, Coxis, Ano &c.* eadem pleno velut ore haurire voluistis; quidni forbeatis paritèr [prout in adagijs est) improbitatis fæcem? *Sed* (respondetis cum Iuene eiusdem *Aristophanis*) est valde fex antiqua & marcida

Igitur [concludam cum Chremylo] Trygæpus hæc omnia medebitur. Sed medicaturus Asclepius nouerit imprimis talem fecem esse Complexum plurium morborum ex actione virus Veneri in Corpus introducti resultantium: et qui adeo, Lues, à grassatione vocatur; introduci deinde idem virus in corpus triplici modo: primò per usum Veneris ordinariū, et siue Excoriationes, Tumores, Ulcera &c. Pudendis imprefferit, siue non [quandò nempè clām, veluti per infidias, sanguinis tyrannide potitur] Secundò ex contactu; quū ab alijs membris non Genitalibus eidem sanguini participatur. Tertiò denique à natiuitate, seu in generatione. Quo fit, vt & nos triplicem faciamus illam Luem: et primam quidem Legitimam appellemus, vtpotè prerogatiuis omnibus stipatam, quæ morbo Veneris Primogenito competunt; alteram Spuriā (ad prioris differentiam) ultimam Hæreditariam, quæ per traducem suscipitur.

Iàmque toto ferè decursu præsentis Tractatus locuti fuimus quo pacto venenum illud in Vagina, Mentula alyque Venereis modò recensitis loculis castrametatum [ettenim Gonorrhœæ, Ulcera, Bubones &c. ex Fallopio, principia sunt & veluti milites levis armaturæ victorem gallicum præcedentes] nisi cominūs per Euacuantia

quantia, eminens per *Impellentia* profligetur, lympham ibidem peruertat atque in suos mores fingat; auctisque propterea copijs demum sanguineam crasin expugnet: pauca interim præfati de altero modo, quo videlicet idem virus per *Verenda* quidem, sed nullâ in ijs strage factâ, clanculum, absque strepitu, quicquid etiâ aliquandò cum impetu, imperium sanguinis suffuratur. Cui sanè defectui suppleturi adnotabimus impræsens fieri hoc inquantum, quòd in tali occasione vel volatile est ipsum virus, & sic citò labitur in venas; vel valdè analogum humoribus, quibus communicatur (quam analogiam idæis tribuit *Marco-Marci*, nos uniformi particularum ordini ac dispositioni) vel denique, quia humores suscipientes in magnâ despumescencia sunt, atque ita excalefacti, ut virus attenuare potuerint, idque in suâ volatilitate conseruare, quoad penetrauerit in venas.

Quod *Spuriam* (quæ per contactum fit) nota
 i. quòd vtrumque tangens calidum esse debet
 secus non fortiretur effectus. quandoquidem
 Agens, hoc est venenum, aliam speciem indueret
 penetrationi contrariam, scilicet fixitatem,
 & sic ad oscula pororum cutaneorum concideret,
 imò antè ipsam Cuticulam. Quæ causa
 D d 2 est

IIJ.
Spuriam,

est etià, cùr mitissima esse solet quæ Lues per contactum acquiritur. Ettenim virus ut-
cunque ab vno corpore in aliud migret calidif-
simum, priuatur tamèn sempèr angulis in tran-
smigratione sua, atque imminuitur affusione
corporum etherogeneorum, quæ diuersimodè
ac passim obuiam occurrunt; & prætereà quia
vehiculum statim non inuenit sibi appropria-
tum, idest lympham, Matricem nempè Vi-
rus *Veneriei* totiès decantatatam. Ea causa est
etià, quòd minimè contagiosam arbitror di-
ctam Luem; et sic *Fallopius*, *Primis*, inquit,
*temporibus credebant ex usu vitrorum, aut pocu-
lorum posse nasci affectionem istam, & Ego locu-
tus sum cum sene, qui habebat domi duos Labo-
rantes habentes partes posteriores ulceratas; et as-
serebat se infectum ob usum eiusdem latrinæ: ho-
die non est timendum de hoc; & quamvis (subiun-
git alibi) quidam summæ authoritatis voluerint
defendere castas Matronas dicentes aqua bene-
dicta infectas; infectio illa habuit originem per unū
Asperges, scio Ego &c.* Et de facto quotiès vidi
Tyrones Chirurgos in Archiospithali sibi in-
uicem propinantes Infectorum poculis, quæ
etià cuius Infirmorum indiscriminatim
destinabantur. Nàm cum effluvia illa frigi-
da iàm sint quandò alienum corpus contin-
gunt

gunt, videluduntur sua vel adminimum de ferociâ suâ multum iam remiserunt: vndè appositè *Scaliger: Frigus per se ad naturæ opera ineptum*. Misso hoc contagio. Lues certè per contactum irrepit, sed interueniente calore, vt diximus. Sic noui Adolescentem, qui cum Meretrice sordidâ congredi verritus, eius *Pudendum* procaci manu tantùm attrectauerat, nihilominus membro hoc insolentissimè tumuisse, Pustulis vbique scatuisse, inanem porrò delectationem constanti morbo expiaturum, ni ad opem Medicam confugisset. Nota 2. ad virus in contactu suscipiendum plurimū etiā conferre, si pars, quam attingit, humida sit, ex hypothesi nempè totiès deprædicata, quòd eiusmodi menstruum lymphæ facilè nubat: vndè est porrò, quòd in Glandulosis cavitatibus, Ore, Ex. gr., *Podice &c.*, vbi præter calorem feruidiorem liquidum quid reperitur, *Veneriei* halitus temerè hærescunt; & quia sanguifera vascula ibidè magis obuia sunt, sanguinem audentiùs aggrediuntur.

Hereditariam tandè quod concernit Luem perenne certè est *Homericum* illud:

*Heus Heus, vt illi dictitant rectè, probum
Patre ab improbo non posse nasci filium*

Nám si consideres in nostro casu Patris semen

Dd?

acido

Observat.

IV.
Et Hære-
ditariam.

acido quodam fixo turgere, quod à virulento sanguine in *Testibus* depositum fuerit, apertè nosces eòdem postea in *Vas* muliebri iaculato, vbi ipsius portio magis salina, magisque volatilis, quæ *Aura* dicitur, ad *Ouaria* exhalauerit, huius salilla *Ouulum*, quo parua foetus rudimenta continentur, facile subitura; dùmque operante alio menstruo spiritoso idè ad *Fallopianas* *Tubas* indèque in *Vterum* deuoluetur, ipsa insimul agglomeranda esse, donec crescente foetu in eo sistant se se, viresq; suas post ortum aliquandò tandèm effutiant. Idem dic propemodùm respectu *Matris*. Namque ab hac si foetus alys impressionibus percellitur, quæ minus apparentem habent originẽ, dubium esse non debet, quin *Venereis* vel maximè notetur siuè in vtero, quùm loco congrui nutrimenti venenosum quid ad illud adigitur, siuè extrà *Vterum* loco lactis, vt patet. Quare scitè *Fernelius*: *Maxima ortus nostri vis, & non parùm felices benè nati.*

§. 2.

J.
Causa
proxima.

IAm verò illapso in venas viru venit inquirendum quid ibidèm præstare hoc valeat? Quod vt elucescat, suppono 1. Sanguinem quadruplici substantia constare; *Gobulosâ*, *Lymphaticâ*

paticâ, serosâ & salinâ; et primam quidêr rubi-
cundam esse, alteram muccilaginosam, ter-
tiam aqueam, vltimam sapidam, hoc est dul-
cem, austeram, vel amaram &c. prout scilicet
temporum & victus diuersa ratio id poscit.
Hanc prætereâ Principiorû quadrigam, quo-
ad singula in esse suo consistunt, neque ex ijs
aliquod serie, figurâ, numero à naturali suâ
constitutione desciuit, ritè procurrere, æquè
omnia fluere sorte, paritate, constantiâ vbique
eâdem: intermisceri nempé Lymphaticis fi-
lamentis cûm serosos, tûm rubellos globulos,
hos passim transfigi à salibus, quæ rursûm illis
dant accipiuntque mutua. Uerûm vt harmo-
nia huiusmodi dissona euasit, rem longè ali-
tèr se habere. Tûnc enim Sal hic recollectum
debita non occupat interualla; illic serum cum
fero labitur; hinc iterûm Lympha omnis sup-
ernatare, illinc rubentes globuli cruoris fac-
iem appetere videntur tanta discordia, vt om-
nia subuersum iri credas; ac tûm porrò diuersi
etiâ diuersimodè fiunt morbi, vno scilicet pr-
incipio statas leges non seruante, aut duobus,
tribus, aut penè ònibûs. Sed quicquid sit de hoc
absurdo; vno certè dempto Sale, quod vbique
diffusû perhibetur, reliqua Cruoris cõstitutiuâ
rarò abinuicè secedunt, nisi Lympha, quæ ip-
forum

veluti vinculum est, aut reticula, soluta fuerit aut complicata [id nimirum, quod compulit *Henricum Scretam* aliosque melioris notæ Practicos, vt existimarint periculosiores Æg-ritudines ab ipsius, nempe Lymphæ, discrasia pendere, quemadmodum & Mors ab omnimodâ cunctorum eivsmodi Elementorum separatione & corruptione) Hoc posito, meminerimus iam, vti *Venerereum* virus soboles est Lymphæ sanguinæ, eique adeò naturalitèr inhæ-
rhescit, ex Sympathia videlicèt, seu magnetismo, aut consimili partium configuratione. Meminerimus insupèr, quòd idem virus acido-fixum est, acre, & corrosivum: habens nimirum partes tribus, aut quatuor angulis instructas (comme des petits pions) & quarum cuspides obuia quæq; corpora iccirco rodunt, si resistent: cùm aliàs in rebus fluidis dictos angulos base tenùs adigat in illas, easdemque protinùs constringat. Collige itaque inducta in sanguinem virulenta hæc salia, quoniàm sulphurea, quæ secum traxerint, inuolucra mucosos Lymphæ flocos peculiaritèr amplecti debent, infixis ob id altè admodum in hos suis cuspidibus eandem condensatum ire paucis exceptis filamentis, quæ Parietibus, poris sinibus, flexuris, anfractibus Canaliculorum

Mus-

Musculorum, Tendinum, Ligamentorū, aliarumue partium Organicarum inhærendo fortè restitent, & sic dissolui pergant. Collige, inquam, quòd condensatâ illâ, idest lymphâ, tum rubellâ, tum serosi globuli ipsius floccis antea intermixti mōx exprimendi sunt, vt & salia omnia: quæ proinde, quoniām veluti manumissa ac sui iuris facta venenosis moleculis passim obuiabunt, fermentatione iccirco facta illorum fixitatem, acrimoniam atque indolem denique nanciscentur, *Gallicum* ærarium interim augendo, sed auro tamē plusquā Tholosano.

Irrepunt iām protinūs Affectus é Lymphæ crassitudine præfatâ, ex Rubellis globulis sequestratis, atque ex Sero demū virulentis particulis grauidis tam varijs tamque inuoluti, vt eisdem enumeraturus hesitem, vndè potissimū exordiar. Dabo nihilominūs operam, vt talem plexum enodem initio sumpto à magis apparentibus: intèr quos principatum obtinent Affectus Oris nescio quâ de causâ. An, quia Os in propatulo existens ægritudines suas citiūs ostendit? an est, quia alibi plūs viarum, plus etiām moræ superandæ habet virus, antequām se manifestet? an denique est, quòd decebat illam primariò infici, quæ

II.
Acciden-
tia Morbi
Gallici
Legitimi

pars in Prothoparentibus nostris prius peccavit(mittamus Theologica) quæ, inquam, pars vel maximè symbolizat cum Ore *Vaginali* [vndè nempè *Pudendagram* omnem excludi demonstrauimus?] Sed quicquid de his sit

Saliuæ re-
dundan-
tia.

1. Saliua magis fluxilis obseruatur, siuè aquosa: idque intantum, quòd inspissata Lymphâ nil mucosi, nil oleaginosi per exiguos Saliuales tubulos permeare potest ad Oris cauitatem.

Oris Ex-
coriatio-
nes

2. Et, quia expressum Serum sale celtico onustum est, Saliua porro suprâ membranam Palatum inuestientem defluens acribus suis particulis deglabrare, huius lanuginem velle re pergit excoriationes pingēs obliquas, rectas, longas, diuersiformes.

ptyalif-
mus

3. Nec tamen his contenta eiusmodi Saliua ostiolorum etiâ, vndè irruit, Sphicteribus abscissis, viam sibi sternit aliquandò ad perpetuum exitum.

Oris vl-
cera

4. Ast quandoquidém vnâ cum constrictorijis fibris lacerantur soepè vascula sanguifera Palatinas glandulas occingentia. hinc est profectò, cùr inductâ post aliqua phlogosi, vlcera efformantur pro sitûs varietate abinui- cem discrepantia.

Callosa

5. Nam vbi crassa est prædicta membrana,

vt in

ut in Palato & Guttore, vlcera callosa euadunt. Quippè ipsius fibris in tali loco naturaliter cohærentibus, si aliquæ dirimantur,urgent extremis capitulis: quæ res est, ut magis postea conniundo succi nutritij vias intercludere debeant: hic verò ita coaceruatus, ac tùm ab austeris vicini vlceris, tùmque ab acidis nitri aeris salibus condensatus nonnè dicta capitula conglutinabit, vnà, strictim fartim, ammuffatim conferruminabit?

6. Hæc autem vlcera sunt, quæ *Galeno* *Telephias* vocantur, idest profunda, maligna. Et sanè dùm saniem coercent fouentque, tam altè penetrant, ut Palati fornice excauato *Fistulas* aperiant, vocem etiàm ad Nares transmittant.

Fistule in Palato

7. Ut verò mollem Oris partem occupant, V. g. *Gingiuas*, traseunte haud egrè in patentibus poros virulento miasmate, latè proferpunt, omnimodam istarum carnem absumendo: cuius quidè verbi recordatione reduci-
tur in memoriam, quod constantissimus in
patièdo plusquàm *Hercules*, Diuus *Iob* (quæ
Lue Venerea quòque fuisse tentatū opinantur
permagni Docti Viri, etiàm Theologi, intèr
quos *Vatablus*, *Cyprianus Cisterciensis*, *Pineda*
& alij plures) posteritatì mandatum reliquit,

Gingiuarum erosio

scilicèt : *Pelli mea consumptis carnibus adhesit os meum, & derelicta sunt tautumodo Labia cecidentes meos.*

Wluta

8. Laxior tamen, & Gingivis adhuc spongiosior pars, Columella, sic abradi interdum ab aduncis illis moleculis solet, ut penitus erosa atque exscalpta voces quæ illius ope articulabantur, iamiam confuse, idest inarticulatè proferantur.

Epiglottidis

9. Sic etiàm Epiglottis vnà cum adstantibus hinc indè furculis, ciborum canalibus, è quorum propterea erosione assumpta quælibet tam esculenta, quam potulenta, ne in Tracheam decidant à, Spiritu hinc exsurgente ad Nares impelluntur

Laryngis

10. Larynx verò, & ipsa eadem Trachea ut ut dura sint, cum tamen tunica insternantur, quæ Glandulis sebaceis referta virulentum serum eructat, pedetentim scalpuntur & fatiscunt. Quamobrèm vidi aliquos, quibus eæ partes iam hiabant, inter bibendum illicò fuisse suffocatos.

Nas

11 Nasus interim, qui non tam ulcerosos halitus excipere, quam ipsum virus per membranam Pituitariam segregare cogitur, istius carnificinà longum exercitus totus aliquandò absumitur, & corrui planè.

12. Idem

12. Idem constat de Faucibus, idest OEso-
phagi principio, siue Pharinge, cuius exco-
riationibus vlceribusque non tam impeditur
Deglutitio, quàm ad cuiusvis, etiàm liqui-
di, corporis contactum intensissimus excita-
tur dolor.

& Phar-
ingis

13. Attende nunc paulispèr ad huiusmodi
Buccam mi Lector! nonnè ipsam, Latrinam,
nonè Sepulcrum dices potiùs, quàm Suauium,
aut Delicias Humanorum? Foetor autèm indè
exiens à *Tilingio* aliundè, quàm ab Ore deri-
uatur, quemadmodùm itèm Deglutitionis,
necnon & Pronunciationis impedimenta;
scilicèt ex Thymo. *Quippè quem Thymum*, in-
quit, aliàs nouimus ex quorundam Lue Venerea
infestatorum cadauerum sectionibus id docti tam
certò, quàm ter tria sunt nouem. Unde quoque
sonora non sunt voce agrè cibum potumque deglu-
tientes, sapè per foramina nasi ea excernentes
agrè respirantes, insuper compresso à tumore Thy-
ni OEsophago, renitente cartilaginosa Aspera Ar-
teria. Immo suspicamus eosdem ob prauam hanc
Thymi constitutionem fatenti esse anima, saluis
adhuc Pulmonibus [id enim si ita se non haberet
aut exulcerati Pulmones essent, quomodo fieri pos-
set, ut spacio sex septimanarum Lue Venerea in-
fecti curari possent) non tussientes, sed sputatores

Oris fo-
tor

ac creatores. Et paulo post *Quæ omnia de Thymohic tradita Lue Venerea laborantium medela confirmat facta per pyralismum artificialem, quem collo circumdatum emplastrum Vigonis simplo, vel duplo Mercurij currentis constans longè facilius, quàm Zona mercurialis promouet & accelerat &c.* Dicat tamen quicquid vult *Tilingius*: Ego vlcerosum Thymū nunquàm obseruavi, neque, trium annorum curriculo, quo plus centū eiusmodi Cadaverū licuit secuisse, tale aliquid se visendum præbuit. Uidi autē semper Thymum durum, contractum ac penè nullum, quòd videlicet schirosus instar aliarum glandularum euasisset, quæ glandule Conglomeratæ sunt è numero Vesiculosarum quales dici debent Iugulares, Axillares, *Inguinales* &c. de quibus suo loco. Oppones, exulcerari has in *Lue Venerea*, ac proindè etiā Thymum. Sed disparitas in hoc consistit, quòd dictæ glandulæ intantum vlcèrantur, inquantum quòd ex ipsarum duritie inflammantur partes adiacentes, imprimis Musculosæ, & sic abscessu facto vlcus eisdem communicatur: cū. verò Thymum nullæ obstipent carnes, sed Sterno & Clauiculis contegatur, nisi propterea hæc ossa carie tententur, vti plerūque in *Lue Venerea* fit, non potest vlcus talem, glan-

glandulam, idest Thymum inuadere; & prætereà, quicquid ex ossibus deprehenderim in Sterno & Claviculis præfatis, nunquam tamen memini vidisse Thymum exulceratum. Foetor igitur ille ex Ore omninò aucupandus est, & cum, si vel vnicum adsit in eo vlcusculum *Venericum*, intra pauca Os oleat foetidissime.

14. Mittimus alia, quæ in *Tilingo* castigationem potius merentur, quàm responsionem, & descendimus interim ad OEsophagum. Hic in *Lue Venerea* infectorum cadaueribus squalidus, ac tantum non rubicundus, idest excoxiatus spectatur; & patet ratio tum ex saliva per eundem canalem delabente, tum ex alijs succis, qui ad ipsum properant. Quippe compertum fecimus in Anatomicis (*Sect. 1., Artic. XXVII. primæ Nostræ Dissertationis*) adesse Lymphæ ductus qui è Glandulis Iugularibus descendunt ad Nerueam illius tunnicam, nec non alios humorem digestiuium afferentes. Quandoquidem ergo tam huiusmodi recrementa, quàm saliva præfata corrosiuis moleculis in *Lue Venerea* abundant, quid mirum, si ijs supra talem tunnicam rotatis interior OEsophagi superficies postea deglubatur?

OEsophagi
laniatio

15. Verum præter OEsophagum abraditur
etiàm

& Stomachi

concaua Stomachi facies intantum, vt muc-
co destituta semper inuenta sit, ad minimum,
satis diluta: id quod indicat feri loco lymphæ
ad Glandulas Gastricas miliares incurfionem.

Efuries
inordi-
nata

16. Inueni vltteriùs in ijs, qui morbo eius-
modi occubuerant, intrá plicas Ventriculi
humorem quendam serosum, adurentem, ac-
rem ac subrufum, qui alius esse non poterat,
quàm humor digestivus è Conglomeratis No-
stris profectus, de quo fusè in *Dissertat. ci-
tat.* Atque eiusce quidèm humoris acredini
tribuo Ego ingentem illam Famem, quæ pla-
gis *Veneris* faucios vexat. Dùm enim per OE-
sophagum affluit talis liquor, retortis in Ner-
ueam membranam iam crustâ, seu mucco or-
batam realgaribus suis particulis, eiusmodi
sensum stimulare debet.

Chylosis
euerfa.

17. Nota verò hâc occasione qualis esse pos-
sit fermentatio alimentorum ex tali men-
struo? Certè, nonniû inchoata & imperfecta.
Nàmque vti acido-fixum est illud, ciborum
autem partes aliquando fixissimæ; ità, quic-
quid idem cum hisce committatur, ac vires
experiatur, minimè tamén ipsas abinuicem
separare, abstrusa præsertim falia in aper-
tum deducere valet. Fit itàque cita & fu-
gax fermentatio, cremorque indè resultans
infor-

informis, Chyli-embryo potiùs, quàm chylus: qui vt citiùs ad Intestina prouoluatur, pulsat, incitaturque fibras præfatum menstruum, & Pylorum referat.

18. Occurrit iàmque huiusmodi chylo Bilis in copiâ satis exuberanti. Quandoquidè in nullo alio morbo tantâ obseruari vnquàm; et Cystis quidè fellea ad stateram appensa semilibre pondus plerùmque superare visa est: Torrida etiàm apparebat illa Bilis, & Palato admota (quod citrà Lectoris nauseam dictum sit. Non pudet quippè heic palàm confiteri non tam recrementa interna, quàm ipsam etiàm saniem sub crustis, alijsque cutaneis affectibus, atque in vasis hominum hoc morbo enectorū me pluriès degustare voluisse) instar Titymali adurens sentiebatur. Causam talis vbertatis adiudico Ego facilitati ex cernendæ bilis (de qua Excretionē doctè satis differuit nō ita pridè *Jo. Bapt. Bianchi Taurinensis* in sua *Historia Epatica*) ex abundantia nempè feri, quod biliosis salibus pro vehiculo inseruit.

19. Nihilo tamen plus efficit hæc bilis frequentia, nisi vt fœces præcipitantèr à chymo separentur, vtque copiosæ fiant deiectiones, Intestinis tam internè, quàm externè ad Colon stimulis

Diarrh-
œæ

20. Jamq; adeò fenſim increbeſcunt iſtæ deſe-
ctiones, atque itá, vt in Diarrhœam denique
faceſſant, cuius color flauus eſt ex origine,
quam olet; exitus autèm peſſimus, vt dicemus
in Prognosticis.

Defectus
mucci
Intestina-
lis

21. Corrugationes tamèn Intestinorum, &
per confequens hæc Diarrhœa ſollicitátur ma-
ximam partem ex defectu Mucci Intestinalis.

Observat.

Cùm enim iſte à lymphæ ſit, quæ per lym-
phaticâ Meſenterica deriuatur ad *Peyeri* glan-
dulas, id eſt acinos Intestinales; atque interim
hæc lymphæ condenſata in proprijs vaſis reti-
neatur, ſit, ne quid oleaginoſi tranſeat ad Ner-
ueꝝ Intestinorum tunicæ deſſenſionem. Vtrũ-
que hoc probat autopſia. Ipſe ſcilicèt vidi in
Adoleſcente præ morbo *Gallico* vitâ functo
propendiſſe vtrĩque & continuo è Meſen-
terio ſuprà Intestinorum dorſum paruas quaſ-
dam & diaphanas, ceú cryſtallinas lentes,
ſingulas ſingulis tanquàm pedunculis fibroſis
appenſas, & quarum altera craſſior, altera te-
nuior erat, vt & illa magis infernè deſcen-
debat, quàm hæc; ſimbrias ſic, ſiue ſegmenta
ſimul repreſentando, quo nil pulchrius ſpecta-
ri potuiſſet: extitiſſe prætereà lentes illas ad
Intestina craſſa maiores, ad tenuia minores;
ſed in illis æquales, in his ordine ſimbriato
diſ-

dispositas, vti nouimus; tandem verò omnes
durę ex gummi quodam veluti compactę cer-
nebantur. Quarè colligi ex his potest, quòd
deficiente in Intestinis lymphā, siuè mucco
villofam crustam confingente, efluentibus-
que, ex aduerso, acri sero, bile titymallina,
& chymo foecibusque indigestis; Diarrhoea
illa attendenda venit.

22. Bilem sequitur liquor Pancreaticus. Hoc
autem viscus quoniam in Lue Venerea schir-
rosum semper existit [vt cultro anatomico li-
cuit experiri] non rectamentum idoneum,
sed consuetum acre serum intestinis imperti-
tur cum præiudicio Chylificationis, atque ad
maiores illorum ductuum vellicationem.
Sed de schirro glandularum Conglomerata-
rum Vesiculofarum, adeoque & Pancreatis,
dicemus postea.

Durities
Pancreu-
tis

23. Operimentum igitur Intestinorum, siuè
Omentum quod attinet: nemo hoc quærat
in Abdomine Lue Venerea extinctorum; re-
periet tantummodò contractam pelliculam,
emunctam, luridam, subrusam vasculis tan-
guiferis nonnullis, sed exillimis obsignatam
adipe ab acri toxico prædominante penitus
abligurito.

Omenti
Squalor

24. Similitèr & Mesenterium squalidum,
qua-

& Mese-
nterij

quasi Tympani pellem atque humectatam æmulatur, nullo, ac ne sanguineorum quidem vasorum vestigio apparente, glandulis consumptis, *Aselliano* Pancreate ad nihilum redacto.

Prausa-
nguineis
cathefis

aselliano
pancreate

Observat.

25. Iam verò indigestus chymus, virulento sero grauidus [quod in his sedibus ubique hauserit] ad Cor denique delatus, & sanguini permixtus in fonte demùm natat impuritatis. Qualis autem sit iste sanguis luculentè nouimus in Causis: habere videlicet lympham strictè condensatam, rubellos globulos palantes, nunc turmatim, nunc solitariè procedentes, & sero affusos, ac serum denique manumissum, & seorsum à vasis capacioribus ubique obuim: impræfens, ad ista confirmando referam quæ in Anatomicis veluti palpassè contigit. Vidi scilicet in funeribus Siphylorum ingentem. i. Polypum Cor perpetuò occupasse valde durum, fibrosum, subflavum, & qui cum parum, aut nihil sanguinis complecteretur, concretum quoddam lymphaticum apparebat; extitisse præterea alios tam in venis, quàm arterijs grandioribus, sed molliores, hoc est hàud ità fibrosos, ac nupèr indicatus: nigros insupèr, & quò plùs à Corde diffidebant, eò nigriore colore præditos [ex globulis videlicet sanguineis lymphæ capillitio

litio adhuc hoerentibus & impactis] in vasis autem minus capacibus extitisse atrum quoddam veluti cænum, rubellos nempe globulos corruptos, seu mortificatos, qui sero innatantes istud penitus turbabant; atque ultimò in vasis minimis capillaribus solum hoc, nempe serum, locum obtinuisse. Et quod hoc serum: scitè ac sæpè cum Axillaris, tum Cru-ralis arteriæ ramulis detectis, & secundum omnes suas productiones exploratis, inueni ipsum inferius, circa Musculos, colorem lut-eum semper retulisse; paulò superius, circa In-tegumenta, coesium, ac tandem omninò ex-trà, in cute, limpidum apparuisse: vbi por-rò, si cruste adfuissent, sub iisdem tanquam in lacusculum diffundebatur, secus, per pellem oberrabat. Argumentum profectò dicendi quod neque in viuis & sanis animalibus sanguis æquali partium quantitate ac ordine vbique fluit. Sed de his ex professo agemus in *Dis-ertat. nostra Anatom. Med. 2. De Humor. Ge-neratione, Separatione & Usu*. Postremò [& ne hoc ommittam] degustatis hisce tribus feri spe-ciebus, compertum habui coesium illud cœ-teris longè mordacius, ac non per Integumen-ta modò, sed & per Tendines & per Lacer-tos sparsum tyrannidem exercuisse, vt iam-

iàm enarrabimus in Viuis, Mortuorum incommoda priùs emenfi.

Eiusdem
Lirculus
impedi-
tus

26. Quamobrèm, si motum sanguinis circularē spectes, nonnè ex lymphæ coaguligrumisque partis rubicundæ, obstructio vasorum aliquandò continget, quæ illius fluxum impediet atque inuertet?

27. Si verò motum intestinum, aut fermentativum [vnde *Calor naturalis* Priscis est] liquet, deficiente sulphure, quod erosum, vel ad lympham antea inspissatam fuerit ablegatum, abesse pariter debere copulam explosiuam, quæ ex nitro aereo in Pulmonibus recepto, inque illius filamenta adacto obtinetur, & sic desiderandam esse eiusmodi fermentationem, in quâ tamen vita vel potissimum consistit.

Pulsus
debilitas

28. Consistit, inquam, in hoc vita, ut nitrum aereum cum salinis frustulis fermentando sulphurea filamenta sanguinis exsuscitet, ab inuicem separet, atque ita exactam principiorum eius faciat commixtionem. Quod si adeò parùm inter sulphura emicet, quo pacto flammam, veriùs crasin istam conciliatum ibit? Hâc tamen non constante, tenebræ, siuè mors repit, vti apparet: atque interim languente eiusmodi explosione, quemadmodum Cordis
Dia-

Diaστοle minùs validè promouetur, quidni & Pulsus debilis efficiatur?

29. Nihilominùs à talibus quasi vinculis absolutum nitrum, vti liberiùs cum cruentis salibus fermentat, ità in sinistro Cordis sinu crebriùs accendendo oleosa stamina, ipsius dilatationem accelerat, Pulsus reddit frequentiore.

& frequentia

30. Sed non sufficit frequentia, potiùs amplior dilatatio exigitur, vt validiore indè Systole [hoc est fibrarum Cordis ad naturalem suum statum reditu] cōsequente sanguis postea quoquouersum alacriùs didatur, impellatur, aut distribuatur, Hinc itaque velut torpido sanguinis remanente motu, lymphæ faciliùs conuenit & condensatur, humorum discrasia quotidiè magis crebescit, vt patet.

Lymphæ condensatio

31. Jàmque ex discrasia ista serum, quod è butyrofa sanguinis substantia expressum, vnicè & vbique permeat [coeteris, nempe principijs, hic atque illic coaguli cuiusdam, aut instar limi subsidentibus ob defectum etià competentis motus] quoniam ad Pulmones identidè allatum membranofas eorundem vesiculas veluti macerare pergit, flaccidà propterea reddità istarum texturà Inspirationis negocium non parum implicat.

Asthma

Quan-

Quocircà parietibus earundem concidentibus nonnè porrò vberior aeris influxus requiratur ad ipsarum dilatationem? Iunge, quòd cùm sanguis effoetus spiritibus etià careat, qui partes in elasticitate suà contineant, vt proindè aer ducendus est, maior istius copia exigitur pro istarum expansione.

Tussis
32. Ast Serositatis vt aliàs, ità hâc occasione proprium est, vt; salia sanguinis circumuehat, diluat, hincque in actum exerat iuxtà tritum illud Chymicorū *salia non agunt nisi soluta*. Quarè ijs in Vessiculas pulmonares actis, ac titilatione inducta Tussim excitat plerùmque siccam, vt ratio suadet: interdum humidam, vasculis relaxatis, ac nonnumquam etià cruentam, aut saniosam, vbi sanguiferorum ductuum erosio contigerit.

præfer-
um Sicca
33. Dixi, *vasis relaxatis*, propterea quòd serum illud non tam per sanguifera excurrit, quàm per lymphatica, nec tantum in Vessiculas pulmonares, quàm ad glandulas in istarum bronchijs, in succingente membranâ intèrque vessiculas præfatas existentes. Quarum adeò fibris contractis atque conuulsis Tussis illa sequitur sicca, & cùm Aer pusillos illius globulos congregare atque eleuare nequeat, & prætereà, si adsint aliæ causæ læ-

ſæ reſpirationis, puta Muſculorum Thoracis, Diaphragmatis & cohærentium membranarum atoniam, ſiue relaxationem; quæ nullo negotio accidere debet, vt inſinuauimus.

34. Tracheam quod attinet: quamuis ſerum è glanduloſo interno velamento depluens altera præfatæ Tuſſis cauſa exiſtat, quoniām nihilominus tumefactis tunc temporis iſdem glandulis reſluentis aeris columnæ vndulatū eunt, Uox propterea continuò alteretur, ſiue immutetur neceſſum eſt.

Raucedo

35. A Pulmonibus interim rursus ad Cor, atque hinc per Aortam ad Carotides procedendo ſubit contemplari ſanguinem imprimis ad Caput emigrantem. Notum autem iam ſuprà fecimus qualis in *Venerēis* ſit iſtius conſtitutio, ſeroſa nimirum in Arteriarum finibus, alibi muccillaginofa, eoque compactior, quò propiorem Cordi ſedē occupauerit. Cum itaque muccoſa portio accliuem, ſeu perpendiculararem viam metiri, eiſdemque terminum nimis anguſtū ſuperare difficultè valeat, planum eſt, quod muriatico duntaxat ad Meninges & Pericranium euecto ſero, puncturę in his atque irritationes pangendę veniunt, & ſi inſupèr glareoſum quid illuc tranſeat, grauamen etiām ac diſtenſiones fiant, ſeu Dolores Capitis

Cephalagie

lancinantes , tenui ac pregrauantes :

Febris
lenta, &
Hectica

36. Respectu verò reliquæ alterius massæ ; manifestatum est itè , quemadmodum debili existente Systole, idest Cordis contractione, cruoris motus circularis hebescere multum debet. Colligamus nunc proindè, ad auctâ semper ex eiusmodi lentore lymphæ concrescientiâ, cœtera principia abinuicem quòque tamdiu sequestranda esse quoad Sales velut euinculati, vbi post alios conuenerint per Respirationem , Chylificationem &c. in arterias introductos, fermentationem accensuri sint , videlicet Febriculam Hecticæ similem, & quæ cum tempore in veram Phthisin degenerat. *Neque enim mirum est (loquar cum Riccardo Morton) cum tota humorum massa tam euidenter ab huius morbi [nempè Venereæ Luis] fermento alteretur & in statum colliquativum reducatur (quod à Tumoribus malignis Gonorrhœis & ulceribus hunc morbum usitato comitantibus & præcedere solitis apparet satis) si etiam huiusmodi Tumores atque ulcera Venerea aliquando in spongioso parenchymate accidant, undè Phthisin verè Pulmonarem insequi necesse est. Ego equidem (pergit) potius mirari soleo Luem Veneream saltim Chronicam, seu malè curatam, unquam sine pulmonum ulcere & Phthisi*

si inde nata reperiri. Verum, ut rem ipsam loquar
rarissime si unquam Phthisin pulmonarem Venericam
obseruavi, praterquam, ubi pulmones iam prius
obstructi & in Phthisin dispositi fuerant, vel sal-
tem ubi malum regimen & medicamenta mali mors
ab Empyricis fuerant exhibita; & frigora sapius
in cursu sudatorio vel saluatorio percepta cum
ipsa Lue conspirarunt. Haftenus Laudatus Au-
thor, & mea quidem sententiam rectissime. Ut
ut namque & ipse complures adspexerim, qui
Lue Venerea infecti Asthmate, Tussi, ac Ma-
cie praeterea vexabantur, neminem tamen
unquam comperi in Phthisin delapsum, nisi
forte aut Stirpe satus tabida, aut causis illis
obnoxius fuisset ab Authore relatis. Ratio-
nem si petis: censeo Ego nullum in Lue Vene-
rea vlcus pulmonare gigni, quod tunc in hoc
viscere sanguis minus rareseat ac despume-
scat, uti narrauimus.

obseruato.

37. Licet autem Lues Phthise vacua plerum-
que sit, Marcore nihilominus, siue Tabes sti-
patur semper: & ratio est primo, quia Chy-
lus (à quo nutritio est) imperfectus peruer-
susque, & in minimam mensuram deuoluitur ad
Cor; praeterea, quia balsamicae eiusdem partes
siue sulphura, pereunt, aut corroduntur, hoc
est volatiles praefebili diathesi diuiduntur

Mem-
brorum
Atrophiam

continuò ac sufflaminantur, fixæ verò (quæ Fibræ sanguinis, à nobis vno nomine Lympha appellari solent) constringuntur, seu condensantur. Quamobrè illæ inutiles euadunt alendis membris; hæ non tam exigua capillaria ingredi nequeunt, verum etià alias prohibent, nè progrediantur, nèue, præter serum quidquam per arctiora intestitia discurrat pro partium organicarum nutritione.

Cutaneæ
maculæ

38. Vnum itaque omninò serum, quod venosis biliosisque salibus turgidum minimas arteriolas subire diximus, Corporis peripheriam aggreditur, ac verè, inquam, aggreditur. Quandoquidè tantum abest, quin eiusdem fibras nutrire valeat, vt potius depascat; ad minimum autè Miliare glandulas, quas obtinuerit, tandè obstruat impacto in ipsarum poros aliquo è crassioribus, quos secum vexerit sales. Hinc ergò perspirabili materia suppressa, quoniàm circumstantia vascula in quibus, vtpotè latioribus, rubicundi aliquid semper est, disrumpuntur, propterea & Maculæ ad extremum excitantur in Cute purpureæ, petechiis, siue Exanthematibus gradioribus ferè æquales. Vnde ita *Tilingius*: *Petechiæ, non modo in contagiosis, sed interdum quidè in alijs quoque affectibus apparent, vt in Scorbu-*

to, Lue Venerea &c. citrà pestem vel pestilentem febrem: sed earum ab his differentiam [addit] peritus Medicus sola inspectione, & circumstantiarum consideratione facile animadvertet.

39. Quòd si compertâ in ijsdem Glandulis Cutaneis materiâ aliqua siue Nutritioni, siue Transpirationi dicatâ moleculas etiâ inueniat illud serum à Celticis, quibus scattet, omninò diuersas, protinùs indicto bello & tumultu excitato Glandularum ostia, parietesque consternet, vasorum repagula auferet, sanguinem denique hinc eductum, atque ad luctam instigatum in pus confinget; quod erosa Cuticulâ liquidum priùs, mòx verò à nitro aereo inspissatum solidam, hoc est crustaceam naturam inducèt, idque in facie, in trunco corporis, in Extremitatibus, planè vt in *Iob* citato, de quo itâ *Sacre Litteræ*: *Egressus Satan à facie Domini percussit Iob ulcere pessimo à planta pedis usque ad verticem Capitis*. Obseruauit Ego Crustas, quæ laxiori cuti penès capillare aliquod succreuisent, habuisse infrà se aquam limpidam, ad summum parùm turbatam, siue flauam, & quæ adeò opercula quorundam scrobiculorum eadem aquâ repletorum emulabantur, latas insupèr, crassas, circumherentes: quot-

scabies

Observat.

quot verò in arcto, vt suprà Musculos, prouenissent, fuisse vtplurimum siccas, labiles, fluxiles squammarū instar, tàmque frequentes, vt herpes mentirentur.

Impe-
tigo

40. Sed istæ, vtpotè ad casum pronæ, si prætereà ex irritatione virulentorum salium iusto crebrius fuissent exscalptæ, ablatis per intervalla etiàm fibrillis, quibuscum pelli toti adhærescebant, latiores pedetentim factæ, Serpiginis, aut Impetiginis nomen promerebantur.

Lepra

41. Illæ verò, crassiores Crustæ, etsi minús pruriginosæ, quoniàm tamen ichore abundabant, Pforæ, Heraclei morbi, Leontiasis, Satyriasis, Lepræ, Elephantiasis [vt qui affectus ferè vnum & idem sunt, nec nisi nomine intèr se differunt] speciem præferebant tanta malignitate, vt quæ crebrò scalptæ corpus altè confodissent, cancrofam naturam statim inducerent, manante proptereà sanguine ac malignitatem, seu acrimoniam illam suo effluxu connotante. Horreo profectò, ac tremis adhuc animus ad recordationem eorum, quos ita infectos noui ad nos confugisse. Ipse, scilicèt vidi aliquot Elephantinâ eiusmodi pelle inductos, quâ visu etiàm priuabantur, ambustos quasi stipites repræsentasse, & qui
ad

Obscuras.

ad extremum cū lotium reddere non possēt accensa intensissimā febre ac delirio correpti vitā decessere. Sectis cadaueribus inueni Cerebrum penē aridum, Renes nigerrimos, exulceratos, cutim tabidam & arentem (similes in hoc Beluis, Imprudentiæ æquē ac Impudentiæ suę sic admoniti; vndē & beluinum nomen huiusmodi morbi generi concessū est: *Cutis animalis Elephanti*, inquit *Cassiodorus*, *ulcerosis vallibus exaratur, ex quā Transpontaneorum nefanda passio nomen accepit.*)

42. Rursū serofus ille latex siquidē nil succulenti habet, quod defferat ad Bulbos, idest radices pilorum in *Pube*, *Mento*, *Capite* &c. existentium, vectis propterea illuc potius totidem veluti acinacibus, quot sunt, quibus salibus instructus est, interiores eiusmodi germinum canaliculos deuastat, dissicit ac prosternt Alopeciam sic inducens, Menti glabritiem &c.

Alopec-
cia

43. De colore *Aphrodisiacorum* subflauo, aut luteo dicemus postea.

Cutis
fædatio

44. De Cute igitur quod in reliquum dixerim: expanditur ea nōnullibi in tumores quosdam oedematosos, quatinus serum toties nominatum per ipsius poros aliquandō diffunditur liberalissimē, nec postindē vias inuenit

OEdem-
ata

per

per quas in reliquam massam reducatur deficiente præsertim motu cordis impulsivo, ceu quem diximus in Lue *Veneræ* desiderari.

Adipis
consum-
pti

45. Labitur ulterius idem serum in Membranam communem adiposam, ubi quicquid melliginei superest abligurito vacuos relinquit fauos, idest alveolos, in quibus pinguedo nidulabatur: & sic integumentum illud emunctum remanet, tenue ac vix perceptibile, quemadmodum & Omentum (adipis scaturigo ex *Mapighij* suspitione) vt quod in Lue *Gallica* visum effugit perinde quasi fuerit eliquatum.

Dolores
in Mus-
culis

46. Iam verò quanto magis gracilescit teges ista oleosisque globulis fraudatur, tanto acerbius pungitur ex salini phlegmatis incurfu præsertim in lamella sua interiore, quæ carnea est & Musculorum communis.

Nodi

47. Musculi pariter tali inluvie farti rigescunt. Quocirca ipsorum motu non tam lentè, quàm molestè succedente Corpus aggrauatur Lentor tamen iste, vt & molestia crescit eò magis, si Ligamenta ac Tendines ex eodem sero similiter fuerint imbuta. Quippè sic Nervis pressius irritatis Animus accuratiorem Corporis se præstat OEconomum.

Gangria

48. Et, quod rursùm Tendines ac Ligamen-
ta

ta: patet his expletis ac fero veluti maceratis aliquot ipforum fibras alicubi proculdubio relaxandas esse. Vndè fit, vt excitato inter eas quodam quasi Folliculo Ganglion ibidem postea innascatur, cum primum scilicet inclusa humiditas foras euaporauerit.

49. Hac etiàm ratione proueniunt Nodi, seu protuberantię *Gallica*, Perioestij fibris nimirum elongatis, & concluso succo postea exsiccato. Qui, si denuo alterius feri occasione liquefactum eat, & salia in ipso antea fixata denique in motum agantur, protinus in pus conuersus abscessum molietur, in Therioma transibit, nempe in vlcus teterrimum, ferinum, & summè malignum, colore foedum, nigrum, liuidum, mucoso humore repletum &c. cuius causam in sanguinis ichorescentia causticâ & putrefactione consistere prodiderunt *Hippocrates*, *Celsus* & alij Morbi *Gallici*, vt & *Luis Venerea* nomen adhuc ignari.

Theriomata

50. Qualis interim futurus sit dolor ex eiusmodi Stygio tanquàm vdore in tam delicata Organa sequente deprehendet is profectò, qui Mentem nouit passionibus sui Corporis esse presentissimam, imò & huius cruciatus ab Aliquibus pro Mentalibus omninò reputari, solâ nimirum Mente de ipforum intensione,

Dolores nocturni

H h

aut

aut extensione iudicante. Cùm autem noctū ut plurimum exacerbari ij soleant indē est, quia tali tēpore nitri aerei glebę fixiores sunt quā interdiū; ac propterea cū tūc sanguinis coagulationi auxiliētur, & per consequens vberiore serosi laticis promoueant expressionem, sequitur quod auctā penu, istius actio paritē augenda sit, & cū præterea, ex eiusmodi fixationē sales maiorem acquirant molem, quā ad feriendum magis idonei euadunt.

Caries
Ossium

51. Sed iterum quod Theriomata præfata, qui nesciat ab his Ossa quandoque cariari? seorsum hæc, id ipsum nihilominus serum vltro talem cariem audet. Cum enim se se vel in penitissimos Ossium poros intrudat, eodemque vnā phagedenicam suam muriam conuehat, nonne liquet istius vi erosionem quamlibet, ab eo patrandam esse?

Car-
cim Cra-
nij

52. Vt verò inter Ossa Cranium poris hiscit grandioribus, atque ex alia parte coeteris exilius perhibetur, ita citius teritur atque absumitur aliquando, nullo etiā prægresso ulcere, aut aliquali inflammatione. Sic Mirandus Senex vidit Capitis futuram excavatam; vidit insuper ossium cariem seu teredinem, quę est pertusio ossis ex corruptione iuxta Ga-

lenum

lenum. Coeterò post Cranium, veniunt Sternum & Clauiculæ, quæ præ reliquis tentari carie animaduerti.

53 Locus hic iam profectò esset de Verrucis aliquid libandi, ceu quæ *Siphyllidis* non tam parentes, quàm & Filix nuncupandæ. Uerùm quoniam de ijs alibi vel ex professò actum est, plura dicere non vacat. Confirmaberis nihilominus adhuc magis in veritate Systematis ibidem à nobis positi quoàd earundem causam, si hic aduertas, quòd huiusmodi excrementiæ nonnisi ex sero fibras cutaneas alluente obtineri queunt, vt est manifestum.

Verrucæ

54. More Verrucarum educatæ fibræ, quæ inferiorem *Ani* partem constitvunt (eoque adhuc maiori iure productæ, quòd in tali loco multo adipe obduci solent) in extuberantias facessunt, quæ duplices, interdum triplices numerantur; *nec sunt Hemorroides* (inquit *Celsus*) *sed eminentes tumores nunc molles nunc duri, figura rotunda & nihil linefcentes*. Ex quibus verbis liquet quòd differant Condylomata à Mariscis, ijs nempe productionibus, quas eisdem *Sedi* euenire diximus ex attritu, quem Cinedi patiuntur. Hæ quippè multæ sunt, liquidæ, concisæ, oblongæ cespitantes &c. vt diximus suo loco. Fiunt similiter, ac penè ad

Condylomata

eundem modū Condylomata in *Vagina* muliebre propter parem istius partis atque *Ani* in adiposo contextu situationem facilemque fibrarum elongationem, vt patet.

Bubones,
Strumæ,
Parotides

§ 55. Ordo nunc nos ad cognata deuoluit. Notauimus in superioribus [*Artic. de Pano Inguinis*] quemadmodum Bubones *Veneriei* fiunt ex viru acido lymphā vsque in Uessiculosis Glandulis condensante. Remanet hic insinuandum, quod cum in *Lue Gallica* loco lymphæ sanguineæ puræ ac oleaginosæ nil, nisi quidam hydor fixis, cathareticis, siue corrosiuis salibus turgidus transeat ad tales glandulas, hinc est quod obstructis eiusmodi Uessicularum poris, atque impedita cribratione, eadem glandulæ postea turgere debent, nihil adeo excernentes, sed tantum totiès decantatam serositatem admittentes. Quæ cum ita sint, præter Bubones in *Inguinibus*, fiunt alij sub *Alis*; *Strumæ* item ad *Iugulum*, *Parotides* ad *Aures* &c: et, si porro superiacentibus Musculis pressuram fecerint, disruptis vasculis sanguiferis inflammantur, exulcerantur, imò, vel si humor in Glandulis coaceruatus præ longiore morâ tandem in fermentationem eruperit. Denique vlcus hoc cancrösam naturam, plerumque induit. Hinc Bubones obseruaui

observat.

in

in Lue Venerea imprudentè apertos curâ quilibet non obstante impediri nunquàm potuisse, quin malignauerint; ad minimum verò eorundem aperturâ in fistulas degenerauisse.

56. Quod superest de alys in alys partibus Vesciculosis glandulis è genere Conglomeratarum: imminvuntur istæ ferè vniuersim, abliguritâ lymphaticâ pinguedine, quâ naturalitèr scatere solent; liuescunt insupèr ac durefcunt adeò, vt schirrosum habitum assumpsisse videantur ob defectû videlicèt olei, quod easdem in debitâ mollitie continebat.

Extenuatio Glandularum

57. Cerebri autém Cortex (qui itidém Conglomerata glâdula audit Anatomicis) abs me in Lue denatorum Cadaueribus inuentus semper est flaccidus, laxus, humidus, quasi putrescens: Obseruaui paritèr in eiusdem Cerebri Ventriculis fluctuasse subflauam quandâ ferositatem illius æmulam, quæ mòx dicetur in externis partibus reperta; Aderant quòque in illius Sinubus excrescentiæ sanguineæ poliposæ plurimæ, nigræ, fero innatantes: Denique pia præsertim Menynx penè tabida videbatur, lurida, squallida, vasculis nigricantibus exarata, sed tam exiguis, vt oculorum aciem penè diffugerent. Ex quibus propterea animaduersionibus apertè deduxerâm,

Morbi Capitis

Observat.

cūr tali morbo subiecti Strabi, Balbi, Obstipi, Tetanici, Conuulsi reddātur, alijsque Neruinis ac Cephalicis affectionibus dediti, vt Epileptiæ, Apoplexiæ, Comati &c.: Nec subiit mirari *Paracelsum* eiusdemque Affeclas hanc Luem, Lepræ titulo, totam soli Cerebro adiudicasse; quandoquidē noueram à serositate illà quamlibet in Cerebro tam Spasmodicam, quàm Animalem ægritudinem ludi posse.

Bilis co-
pia

58. Sola adest Hepatica, siuè Hepar & ipse à *Modernis* Conglomeratarum Glandularum cathalogo adscriptus, quæ porrò in Morbo *Gallico* neque obstructionem patitur, neque aliam infectionem: cuius rei causam arbitror, quòd non lymphæ, non vasa minùs teretia, sed ipse numero sanguis largo flumine influit in illius substantiam; vnde est planè, quòd solis Iecurinis Vesciculis segregandi munere ritè fungentibus Bilis postea sic exundet in felleum folliculum, vt ponderi iam alibi indicato potuerit æquipollere. Sed hæc in gratiam eorum, qui huiusce Uisceris intemperiem arguunt in causâ Luis *Veneræ*. *Montani* videlicet, *Massæ* atque omnium penitùs *Antiquorum*.

Unde
Cutis
flauor

59. Iamque ex eà Bilis affluentia quâ tot incommoda Ægrotis afferri suprâ demonstraui-
uimus, dicendum nunc est prouenire & ipsam
flaue-

flauedinem, quæ tales Infirmos tingere consuevit maximè deficiente adipe, seu sulphure sanguineo, quod eandem bilem viscere atque abscondere, potuisset.

60. De Conglobatis autem Glandulis, quod in totum dixerim, hæc est regula: scilicet ut ubique & semper tamdiu decantatam serositatem eructent: Hinc, in Pericardio, Vesfica Vrinaria, Sphinctere *Podicis*, in Vtero, *Vagina* muliebri, Tunica vaginali *Testium* &c. acri colluuie illa destillante ubique phlogoses, ubique Vulnera, Excoriationes, Vlcuscula, Corruptiones panguntur; in Corde insuper ex humoris Pericardij irritatione fiunt Palpitationes, in Vesfica Stranguriæ, Diffuriæ, & similia plura.

Palpitationes,
Vlcera
Vesicæ
vrinariæ, &c.

61. Peculiaritèr nihilominus *Pudenda* impetit præfatum serum, propter nimirum iam alibi allegatam analogiam, quam nouimus intercedere inter dictum virus & poros eius loci, vnde sua traxit Incunabula; & propterea Gonorrhoeas, Vlcera, Excoriationes &c. in præfatis Sedibus excitare semper gestit.

Pudenda
dagra

A *Legitima* ad *Spurtam*: hæc iisdem Accidentibus stipata in publicum prodire solet, quibus & prior; verum non adeò crebris, neque,

IIJ.
Accidentia
Spuriæ

ut

vt alibi iam dictum est, ita violentis. Comitantur nimirum hanc Pustulę in Labi s, Ore, *Pudendo* &c, Duritates in Mammis, Juncturarum dolores, Tumores in Artubus, Depilationes ac similia leuiora, dirioribus Symptomatis rarò, ac ferè nunquam apparentibus, qualia nempè sunt Nodi, siuè Exossofes, ipsorum Ossium Caries, Vlcera phagedenica, Nafsi consumptio &c. Dabo propterea aliqualem *Spurię* huiusce Luis descriptionem. Romã redux anno 1702. secesseram in Oppidum, *Burgi Alarum*, Incolis *Borgo d' Ales*, vbi non ita pridem bini Infantes ad valuas cuiusdam Ecclesię expositi, vulgo *Proietti*, ab illius Loci Scabinatu suscepti, ac totidem Nutricibus alendi consignati fuerant. Euenerat proinde, vt pauco temporis interuallo Mulieres istę schirrosa tubercula in Mammis, vlcuscula, in Ore ac *Pudendo* pati cæperint, neutrá tamen nihil minùs, quàm de Lue *Veneræ* suspicante. Nihilòseciùs vtraque in dies magis tabescebat, Strumæ ad Jugulum, Sugillationes ac Maculæ in vniuerso Corpore, Iuniori etiàm fæminæ oedema prægrande in Genu dextro adiungebantur. Misericordia ergò motæ aliæ Contrerranę, quibus vel lac abundabat, vel vices officij rependendi in votis erat,

at, illuc turmatim conuolantes breui etiam
parem sortem obierunt, donec tandem vel
domesticarum occupationum causâ, vel la-
borum, quos in agris perdurare debebant, aliâ
apud alias pusiones suos [vt eiusmodi foemi-
narum ferebat consuetudo] nutritum depo-
nendo, hæ ab Alumnis, hi à Nutricibus sic
infecti sunt, vt nec Lactantium, nec Lacten-
tium quispiam supererit talis pestis expers.
Sed misellum illud male-natorum par iam
fatis cesserat, sexto videlicet ab ortu mense:
luuencula pariter illa Nutrix prefata post Ma-
ciem Hecticâ febre correpta decesserat, super-
stite adhuc alterâ seniori, sed magis virosâ,
& quæ nihilominus eundem cursum percur-
rebat. Coetero tam liberi, quam Parentes,
quo tempore eò me contuleram, se habebant
hoc pacto. Ulcera imprimis mali moris
in nonnullis, in alijs Aphtæ plurimæ
Puellorum oscula deuastabant, Excoriationes
Inguina populabantur, Scabies demum ac
Pustulæ Corpuscula vniuersim aliquandò con-
tinebant: in Matribus Ora erant foetida, cu-
tis color cretaceus, Mammæ sugillatæ ac vl-
cerosæ, Capillitia glabra, Vires prostratæ,
Menstrua irregularia, *Sinus pudoris* exulcera-
ti. Euenerat periformiter, vt quot quot siue
Ji has

has, siuè illos fuissent exosculati Coniuges; Filij, Fraterculi, Consanguinei &c. eandem sortem subijsent. Sed Genitores eiusmodi Alumnorum iidemque talium Mulierum viri è maribus suprà coeteros affligebantur. Nihilo tamèn amplius laborabant, quàm Oris ulceribus, Scabie, Maculis Pustulisque cutaneis, Articulorum doloribus, Hemicraniâ, similibusque symptomatis benignioribus, in reliquum vegeti ac firmi. Dubitatum quippè fuisset eorundem *Pudenda* plagis aliquibus esse vexanda stante ulcerosâ diathesi *Wluam* Vxorum affligente. Verùm plures ego noveram & antè hos, & dùm hæc scribo, qui à *Spurio* contagio *Pudendagram* nunquàm tulerant. *Dùm*, inquam, *hæc scribo*. Idem quippè nupèr (hoc anno 1715.) contigit in Vico hàud procul ab Vrbe ASTA, cui nomen vulgo *Castagnito*: vndè vxorati homines pro se, Coniugibus, Filijs, Affinibus, Amicisque pluribus consultationis ergo ad me profecti, postquàm auditâ causâ (eâdem nimirum, quæ in Oppido præallegato] quicquid sibi, Suis, alijsque in eo affectu accideret recitassent [neque enim ipsi quid enarrarent satis sciebant] ad eòque applaudissēt tanquàm diuinanti; quum tandèm eò deueni, vt dixerim, putare me pro-

probabiliter ipsorum neminem in *Obscuris* partibus aliquam læsionem pati, maiori cum admiratione id verum esse facti sunt, idemque de reliquis in Pago relictis asseuerarunt. Ratio huiusce incolumitatis si quærat, præsto est. Ettenim *Virus Venereum* quò longius ab ipso fonte [*Pudendo* scilicet Meretrício] discessit, eò minori pollet energiâ. Hinc noui mulieres ex Maritali copula, dùm Viri *Pudendagra* tenerentur, in Gonorrhœam lapsas sanatos postea amplius non infecisse, ipsis interim difficile (vt suo loco ostensum est) ab eo morbo rescipiscentibus. Verùm quicquid de his sit; satis ex historia ista patere arbitror qualis & quanta existat *Spuria Venereis* seges ac messis.

Hereditariam propterea quod concernit: hæc tripliciter considerari debet; prout videlicet vel à Matre prouenit, vel à Patre, vel à Nutrice: & si à Matre, rursùm dupliciter. Nam hæc aut per se, ex causis nimirum in Theoriâ allatis, vel ab alio infici potuit, vt à Marito vlcere *Præputij* laborante &c. Iam igitur pueri sati matribus parùm honestis, & quæ adeò *Pudendagram* libidine sibi compararint, præmaturè in lucem exeunt, quarto, quinto, adsummum sexto gestationis mense: ipsi etiàm

IV.
& Hære-
ditarij.

abortus, si talem parentem habeant macilentum sunt, emuncti, tenues, depiles, excoriati, semicocti, rubri [*Fallopiana* comparatione] velut gambari elixi, nec diu denique lucis usufruuntur: Qui verò à matre sunt per Coniugem foedatà, hi usque ad legitimum quidem tempus Vtero gestantur, sed nati graciles, teretes, languidi, quærule cernuntur, prætereà depilati, rhagadibus pleni ac fissuris, quamvis ad extremum nec tam repentino fato subijciuntur, atque aly mōx indicati. Si verò à Patre *Hæreditas* illa sit; licet hic minorem in Generatione partem habet, non desinit tamen, quin vel teterrima Luis vestigia imprimat in filiis, præcipuè si *Legitimo* laboret morbo, & semine scateat salillis celticis referto. Quippè aliàs, in Lue *Spuria*, uti, eiusmodi corpusculorum agmen rarum est, quòd nempè in transfusione sua defecerit, ità ex longiori circulatione, diutinàque humorum maceratione disperit aliquandò atque obliteratur. Sin hoc, sulphureis fortasse, ceu compedibus implexum toto vitæ tempore in filiorum corpore cubatur, nec demùm nisi vi fermentationis alicuius, vel dissolutionis se afferet in libertatem decimo, vigesimo, aut trigesimo ætatis anno Luem tunc *Venerèã* exe-

exerens si angulis integrum fuerit; mutata verò configuratione pro Lue Cachexias, Tabes, Atrophias, Rachitides, Arthritides, Scabies dabit, vt & alia huiusmodi. Euenit pariformitèr ex Patre, qui semen vel radicalitèr, vel per viam *Spuriam* habuerit inquinatum, vt in prima, vel paulo post primam conformationem in foetu fiant noduli ex salibus & sulphure, idest lymphæ, prædictis; qui laxis eiusdem membræ intimè penetratis, secus ossa [verius ossium rudimenta] ad Articulos tandèm deuoluuntur: vbi porrò, quoniàm indè ampliùs ab humoribus elocari nequeunt proptèr eorùdem capita, seù Condylor, sistunt iccirco se se, atque in Perioostio tam hos condylos, quàm istorum Acetabula inuestiente stationem ponunt, vsquequòd ineunte ætate enodentur, dissoluantur, atque inclusis demùm salibus *venereis* faciant exeundi potestatem. Tunc igitur emancipata hæc, tametsi infiguratione detrimentum passa fuerint, idonea nihilominus adhuc sunt ad fermentandum. Quamobrèm cum etherogeneis sibi, inque Sanguine innatantibus particulis rudiusculis partâ turbâ, vicinæ fibræ diuelli, sanguifera vascula dirumpi incipiunt sic quòd ad extremum articulationis actio impeditur, Inflammatio

gignitur, & Tumor adeò ibidèm excitatur nō-
nihil liuescens ob venenaturam Vitriolicæ
proximam, vti nouimus. Iam verò ex tumo-
re Abscessus fit; vnde internè à pure corrup-
to osse, Musculi supernè ceu terebrà perforan-
tur: atque ità demùm proptèr arctam partis
structurā ichorisque stipticitatem fistulosum
vlcus gignitur Spine ventositas dicta, *Sewer-*
ino Pedartrhocaces, quòd nimirum Metatar-
so fiat vt plurimum proptèr Articulationum
in eo loco latitudinem ac pluralitatem: quic-
quid ex alià parte contingit etiàm Spina ven-
tositatis, nec minus rarò, in Metacarpo,
itèmq; in alijs Ossium iuncturis, vt in con-
nexionem Cubiti cum Osse humeri &c. sed hoc
non ità crebrò. Vbicunque verò situm fuerit
tale vlcus, in moribus habere solet, vt quò plus
tumet iunctura, Artus vtrinque decrescant.
Sugitur enim iugitèr per dictam fistulam nu-
tritius succus, hoc est, ruit quā data porta in
malam frugem: corroditur etiàm à Veneno
ibidèm latitante, quicquid vltra membri cer-
tam dimensionem extendi nequeat & totum
corpus inuadere proptèr acquisitam possessio-
nem, quæ cum membris cœteris non commun-
icat. Nihilofeciùs nutrimento Corporis exin-
dè quotidie effutito Contabescencia, Dolor,
Mors

Mors superueniunt miseris filijs nedum viuere affuetis, atque infimæ Pubertatis. Quodsi porro venenatorum salium inuolucra præallegata ad tam ima, nempe ossa, non descenderint; verum sub cõmunibus Integumentis condita ac substrata fuerint, profectò eadem, vti ad communia lymphæ excernicula, glandulas scilicet Conglomeratas ac Vesiculosas cum tempore deferrenda erunt, sic Tonfillas denique, ceu in edito sitas glandulas, ac præ cæteris Cuti viciniore adeptæ ibidem obstructions facient, quæ Tumores Schirrophlegmonosos secum trahent, idest Strumas. Ac postremò in ipsa Dermide castrametata, obstructis pedetentim glandulis eiusdem miliaribus paruisque phymatibus excitatis Herpetes generabunt pro causæ facultate etiam Estiomenos. Superest Nutrix; hæc etiam, pro ueneni robore Lactentem magis, minusque inquinare solet, & citius tamen, quàm si à Patre *Spuria* Lue contaminato malum, effluxisset. Breui nempe in Ore fiunt aphtæ in peius quotidie degenerantes: Infans etiam languet, pallet, non vigescit, ægrè ad incessum se disponit, si parum veneni suxerit &c. namque ex maiori istius copia morbi contingunt, qui intrá pauca eundem vel ipsà vità de-

destituunt, vt est manifestum. Atque hæc de Lue *Hereditaria*: quæ licèt quod Nutricem posset aliquandò vocari *Spuria*, tamen, quia mater est, quæ nutrit; à Nutrice iccirco affectus intèr maternos adeoque *hereditarios* duximus computandos.

§ 3

J.
Natura
Morbi

TOt in vnum conspirantibus plagis, tot laruis totque eiusdem propaginibus moniti quidni repetamus heic, quod initio eramus augurati, esse videlicèt *Veneream Luem* *Complurium malorum* à sanguine per acido-fixa *Veneri* alicuius *Ulceris* spicula dyscrasiato, siue grumefacto, & corrupto, cumulum & Prouentum? Annunt certé omnes, & sic *Mercatus* præ cæteris, & *Vigoni* autumare iamdudùm non dubitarunt, quòd *omne morborum tam acutorum, quàm chronicorum genus cum Gallico potest complicari*. Hinc alij *Compendium illam Ægritudinum omnium; Iliadem omniuariam, inenarrabilem; Miserabile Scortatorum flagellum; Morbum plusquam Herculeum, Leoninum occultum, dolosum, pertinacem, insuperabilem* appellitarunt, verbo, *Mare malorum*. Ast non omnes tamen, neque vnà, vbique & semper coeunt istius procellæ: verùm pro temporum, ac subiectorum varietate nunc plures,

res, nunc pauciores, molestæ, tolerabiles, intensæ, remissæue spectantur; ut si vetus, aut noua sit ea Lues, *Legitima*, aut *Spuria*, Hyeme, vel Æstate: & quod subiecta, difficile inuentu est, quod virus ita alicuius cruori accommodatum sit, ut ipsius particulæ hunc amussatim penetrare, scrutari, transfodere, valeant; nullæ pereant, liquecant, figuræ ac molis detrimentum faciant: ut item omnes vires suas exerant, incoeptumque alacriter vrgeant; ut denique sanguis ad eum modum alteratus sit, qui requiritur ad plus centum ægritudinibus inducendum. Nimirum inest cuilibet peculiaris quædam in Humoribus, aut in Organis structura, cuius ratione naturaliter *Venero* seminio resistitur: non naturaliter autem Cibi, exercitationes, Aer calidus &c. multum possunt; Vltimò, præter naturam, ipsi morbi, ut febres superuenientes Luem quantumvis *Legitimam* suppressere, interdum, etiam extinguere consueuerunt, viru scilicet uolatilizato, atque in aliam substantiam conuerso. Verum de his fusiùs in Prognosticis.

Quod impresentiarum; ut ut Lues illa rara, ut ut mitis adsit, magni nihilofeciùs interest eiusdem processum metiri. Nos propterea tri-

plicem, aut quadruplicem ad imitationem *Fernelij* stabilimus eiusdem differentiam. Prima est, quum Os (ab hoc enim semper incipiendum ob toties vulgatum illum consensum *Arui genitalis* cum eodem Ore: de quo consensu satis plura alij, nominatim *Septalius*, *Spigelius*, *Sachsus*; cuiusque rationem, missis armonijs omnibus & proportionibus, nos ad fabacearum glandularum vtriusque partis uniformitatem definitiue ablegauimus) quum, inquam, Os excoriari incipit; Gurgulio producitur, vnaque extenuatur; crescit Sputatio; Mariscæ in *Podice*, Exanthemata quædam & maculæ, aut parvæ Pustulæ in aliqua corporis regione confurgunt. Tunc enim primitus coalescente Lympha Serum in remotiores prouincias decedere incipit. Alter gradus est, in quo præter *Vterum* (qui in Fœminis, vt & Os, antè alia vexari solet) Mammæ durescunt; Scapulæ & brachia quasi torpescere videntur; Dorsum Rhumatismus occupat; Scabies & granula pruriginosa multiplicantur coeuntque Herpetis in modum; Dolores in Artubus persentiuntur; Pili decidunt; Emicrania Synciput infestat; Vox raucescit; Spiritus foetet; Nasus decurtatur, atque intrinsecus cariatur. Siquidem in hoc virulen-

ruenta salia, quæ in sanguine pererebuerunt (ex adiunctione aliorum in sibi similia converforum) à præfato fero iam vniuersim circumducuntur. Tertiùs est, quando Musculi oppidò rigescunt, iidemque dirè torquentur Nodis percelluntur: quùm, inquam, Ganglia in iuncturis, Tophi in Fronte apparent; Strumæ, Parotides, Bubones erumpunt: Ulcera dolosa in Gulâ, Palato, *Pudendo* & vniuersa Corporis mole propullulant, siuè, Veruce in eadem parte & schirrofa tubercula iuxta Ossa exoriuntur; quùm denique omnia redundant sanie, præsertim *Cervix* Vteri ac Mamme, quibus etiàm cancer accedit. Quippè in hoc statu lymphæ sanguinis proximè coagulata, balsamicum sulphur exæsum, reliqua eiusdem massæ elementa diuisa. Quartus demùm est, in quo dicta omnia ad acmin peruenere, Tussi, Anhelitu, Macie, Febre hecticâ in superpondium irrepentibus, vt & Ulceribus cachœticis & vix ad cicatricem peruenientibus, Uigilijs, Convulsionibus, diarrhoeis, ac tandèm Morte. Et planè, eadem lymphâ omninò condensatâ quid, nisi virulenta amurca nutrimenti loco sit? Interim verò congestis circa Cor polypis duriusculis ex illâ; circa reliqua autèm nigerrimis foecibus ex sanguine sphacelato Corpus alimonia priuatum.

vitâ etiâ deſtituatur oportet . Iàmque hi ſunt per quos gradus in Lue *Veneræ* ad mortem acceſſus eſt, nec tam in *Legitima*, quàm & in *Spuria*, & in *Hæreditaria*, ſalvis duntaxat differentijs, quas intèr ambas iſtas Luis ſpecies & *Legitimam* illam intercedere iàm ſuprà denotavimus .

III.
Diagno-
ſis;

Ex talibus itèm differentijs diſcernuntur facilè eedem Luis ſpecies intèr ſe. Nàm ſi lenta, ſi blanda ſit Lues, & vel leniſſimis *Antiueneris* obſequatur, *Spuria* cenſenda venit: *Hæreditaria* verò quotieſcùnque citrà apparen-tem cauſam Infans in morbos incidit, qui lym-phæ argvunt condenſationem; videlicèt rur-ſùs triplicem nos ſtatuiſſimus *Hæreditariam* Luē Prima eſt, quùm Puer præmaturè naſcitur, videturque ruber, veluti excoriatus, deco-ctus, & citò demùm vergit ad interitum. Hanc enim nouimus á Matre deriuari, quæ pluſquam Foetum in Vtero, Morbum *Galli-cum* in vaſis incubauerit Altera eſt, quæ mi-trior ab eadem genitrice infecta quidèm pro-uenit, ſed non eà infectione, quæ obſeruatur in Lue *Legitima* detentis, idèſt non ità fixâ: laborauerit nimirùm Mater gonorrhœa ſed quam á Coniuge, non verò cum pluribus libi-dinando contraxerit. Quamobrèm Infans in,

eo casu statò quidè tempore oritur; ast intrà
pauca nihilominùs Rhagadibus deprehendi-
tur, & Fissuris, & Aphthis, & Tabes; quibus ni
tempestiuè succurras, biennium, triennium,
aut quadriennium vix attingit, pro maiori
videlicèt aut minori virus energia. Ultima
est, quæ á Nutrice & Patre dimanat: sed ex
priori repentini atque euidentes fiunt morbi,
causam facile indicantes; ex posteriori verò
occulti, & qui nonnisi tractu temporis, cum
aliarum affectionum larua se manifestant.
Trium interim eiusmodi Specierum, *Legi-
timæ, Spuriæ, ac Hereditariæ* Luis incommo-
da verè prò talibus haberi possunt, quoties-
cunque non diuissim, est vnà fartim, ammus-
fatim superueniunt. Cæterò quippè plura ex
ijsdem cum Hypochondriacis, aut Scorbuti-
cis confundi solent: imò in regionibus sep-
tentrionalibus orisque maritimis [vbi Ende-
mius, familiaris ac veluti vernaculus est] Scor-
butus inueteratus & grauior luem *Veneream*
ità aliquandò mentitur, vt ægerrimè Medi-
cus & sibi & quærentibus fidere possit. Nam
Bubones & furunculi sæpè *genitalia* aut eo-
rum viciniam infestant; haud rarò quòque
infert exulcerationes linguæ, gingiuarum,
palati, cariem maxillarum & complura alia,
kk 3 quæ

que Symptomata 49. numero supputavit *Eugalenus*. Quanquam quod Bubones; differunt *Gallici* à Scorbuticis, quòd in illis apertis materia pinguis reperitur, quale nihil in istis Scorbuticis apparet. Prætereà tumores scorbutici sequuntur vitam calamitosam, *Gallici* luxuriosam. Videatur hac de re idem *Eugalenus*. Quod autem reliqua, *incipientem scorbutum* (loquar cum *Sennerto*) eiusque prima quasi rudimenta produnt lassitudo spontanea, in abdomine & cruribus gravitatis sensus, Crurum debilitas & dolor obtusus, Pectoris angustia ac respiratio difficilis, que sensim percrebrescit. Lues autem *Veneræ* in Ore, Cute, Articulis brevè se manifestat: ægroti constant viribus, benè respirant &c. Prætereà in Scorbuto accidunt Ventris, Hypochondriorum, Luniborum, Dentium dolores, Vomitus & ructus, lypothimiæ, Febres erraticæ, omniuariæ hæmorrhagiæ, horror, tremor, stupor, tristitia, memoriæ defectus, paralyxis &c: quæ in Lue *Veneræ* rarò contingunt. Denique, post antea actæ vitæ scientiam, tutior Luem à Scorbuto cognoscendi modus erit mente recolere processum eiusdem Luis, quem tradidimus. De malo Hypochondriaco res est clara: tantum innuam respectu utriusque huius morbi, Hy-

po-

pocondriæ scilicet, ac Scorbuti, assimilari hos valdoperè Lue Venerea, quòd ab eadem causa pendeant, idest à lymphæ in sanguine condensatione, quæ minor est in affectu Hypochondriaco, maior in Scorbuto, & maxima in morbo Gallico, pro ratione nimirum virus, à quo producitur. Superest ergò Lepra, quæ nisi Lues Venerea est, certè nihil aliud est, lepra, inquam Arabum nuncupata (quandoquidè altera Græcorum nihil diffidet à Scabie fera) Fauent opinioni meæ hodierni Luis Venerea descriptores: & ipse idem, dùm Veterum monumenta reuoluo ac de Lepra Tractatus lego, vel ab ipsis titulis Luem Veneream videor perlustrare. Sic ex Montagnana hæc transcribi poterunt. De Lepra propriè Elephantia, cuius accidentia sunt Casus pilorū barba & Superciliorum, Pustula per uniuersum corpus apparentes, Asperitas & raucudo vocis Difficultas anhelitus, Sitis immoderata, Tensio splenis, Multitudo ventositatis in omnibus Intestinis [& hoc ipsum est, quòd oblitus sum indicare paragraph. super. vidisse nimirum, me Lue Venerea extinctos habuisse Intestina turgida, vehementèr inflata; quod ego in Bilis exuberantiam pròptereà refundebam) Fætor horribilis totius corporis, defædatio cutis capi-

capitis, Corruptio coloris naturalis, Multitudo pustularum in facie, Alcosa dispositio in ore, Pruritus in uniuerso fere corpore, Angustia partium nasi, Impotentia motus membrorum, Stupor eorumdem, Dispositio maculata seminis generitui &c. Nàm quorsum hæc, nisi vt ostendatur, morbum *Gallicum* obsidione Neapolitana antiquiorem fuisse? & tamen neutrum creditum fuit hætenus, habeturque semper tale malum à *Carolo* Rege inchoasse. Quicquid de his sit; protestati fuimus ab initio, nolle nos in has quæstiones descendere, apparetque satis ex Theoriâ Nostrâ quamobrem. *Lues Venerea* vel à *Nannaco*, vt aiunt, existere debuerit. Hinc Antiquissimus ille *Polysthor Herodotus* refert ob depeculatū in *Palestina Veneris Vranix* Fanum Spoliatoribus prolibusque à Deâ morbum fuisse immissum *Theliam*, idest *Pudendi* defluxionem; quam veriùs ex consuetudine cum scortis illic sacra facientibus contractam arbitror, planè vt in castris ad Neapolim. Narrat deindè *Iustinus* de *Agatocle* *Siciliæ Tyranno*, quòd formà, & corporis pulchritudine egregius, cum diù vitam stupri patientia tolerasset, annos postea pubertatis egressus libidinem à maribus ad foeminas transtulisset, tandem morbo

bo correptus fuit, quo toto corpore comprehensus [sunt illius verba] per omnes nervos articulosque pestifero humore grassante, velut intestino singulorum membrorum bello impugnabatur. Et de facto Pudendorum morbos nullo non tempore extitisse docent ipsæ-met *Sacra Pagina*: docent & passim *Historicorum* monumenta. De Appione Alexandrino, V. g. narrat *Ioseph Flavius*, quod necessario circumciso circa genitalia, vulnera ei facta nihil profuerunt, & putrefactis in magnis doloribus exspiravit, quasi nimirum Phymose, aut Paraphymose laborasset in poenam odij & calumniarum, quibus idem Appion (præfati *Historici* dicto) in Circuncisos suos ferri pro more habuerat. Item de Galerio Maximiano refert *Eusebius*, peremptum illum ab ulcere in quadam parte (reticenda nempe quia pudenda) sordido, maligno, depascente, quod usque ad Intestina penetrauerit, ac rursùm ita fetido, ut plures Medici edicto occisi sint, quod nequiverint tolerare (foetorem audi Bubonis Venerei exulcerati) Sed missis *Historiographis* adducendi hic potius essent *Medici*, qui verbo tenus *Pudendagram* cōnotarunt: inter quos *Salicetus* [Author fere 500. annorum] titulum hunc apposuit Cap. 18. suæ Chirurgiæ: De pustulis albis & scissuris & corruptionibus quæ
L 1
sunt

sunt in Virga & circa Præpucium propter coitum cum Meretrice vel fœda, vel alia causa. Gordonius pariter Cap. 5. Libelli sui inscripserat, de Passionibus Virgæ: adducendi, inquam, etiã alijs adhuc vetustiores, nempe Hippocrates, Celsus, Galenus, Plinius, Avicenna, è quorum diuersis scriptis Pudendorum morbi colligi affatim possent; verum quoniã id ab alijs iã præstitum est, præcipuè ab Authoribus Gallis [fortassè vt odiosum ipsis Gallici morbi nomen auerterent ac confutarent] manum contraham, & Chirurgos duntaxat antiquissimos inducam saltim eum in finem, ne Theoreticæ nostrę theses ab aliquo in dubium reuocentur. Rogerius igitur, qui, post interdictam ab Avicenna Principe Medicis manualitèr operandi Artem, primus Chirurgorũ fuit Guidone teste, medicamentum adhibuit ad Verrucas, Pustulas, Cancrum & Fistulas Virilis membri; ad Inflammationem itẽ & excoriationem Testiculorum: vbi subiit risisse, vt legi commendare ipsum in curatione Lepræ indè natæ post vsum Stuphæ Testium abscissionem, fortè nempe sic morbi originem ostendens. Rulandus deindè in omnibus Rogerium secutus adiecit Tractatum de Cancro in naso & Reliquis partibus Oris, de corrosione
 Gingi-

Gingiviarum earumque separatione à dentibus; scripsit insupèr Tractatum de Bubone *Inguinis*, quem qui legerit non poterit non dicere, quòd Bubo illius sæculi nihil à nostro, post obsidionem scilicèt Neapolitanam animaduerso, dissentit: *Rulando* successit *Brunus Longobrugensis*, qui egit de Clauo, Formica, Porris & Verrucis, quæ tùm *Preputio*, tùm alys *Virgæ* partibus contingunt. Emicuit postea *Theodoricus*, à quo *Ani* Mariscas, Nodos Capitis, & Gummata prætereà inuenimus adnotata. Nec pergam voluere Textus insequentium *Chirurgorum* præsertim ac *Medicorum*: *Valesci de Taranta*, *Lanfranci*, *Bertapaglia*, & *Guidonis de Cauliaco* Authoris nouissimi, & qui tamen plus vno sæculo vixit ante *Carolus* Regem; qui singuli de *Pudendorum* morbis ex professo egerunt: vtrò, meo videri, sufficientibus illis vetustioribus vt ostendatur siuè hos morbos, siuè *Luem Veneream* longè antè annum 1494. incæpisse. Et profectò fuerunt (inquit *Sinapius*) à primis usque sæculis *Meretrices*, *Prostribula*, *Lupanaria*, *Fœmina menstruata*, *impuri concubitus*, *luxuria* seu *immoderatus Veneris usus*: fuit item id, quod *inculpatum temperamentum malencholicum*, *Saturninum* dicunt, *humores falsi*, *acidi*, *faculen*.

ti, tartarei &c., quorum effectus non adeo recentes esse debuerunt. Sed occasionem (addit) falsę huius denominationis [Morbi nimirum Gallici, aliàs Neapolitani, Hispanici, Indici, miror cur Italici non etiam Bauarici aut Suedici; à fluxu nempe Oris & sudore, quibus curari solet] & opinionis de Pudendorum affectibus ortam esse iudico ex defectu typi & librorum Authorumque vetustiorum. Cum enim parum aut nihil nobis cōstet quales morbi, quales curę seculis ante nos tribus, quatuor, quinque, sex &c fuerint, hinc poterat idem morbus qui in castra Gallorum tunc temporis ad Neapolim est propagatus longo tempore semper fuisse & extitisse. Sed satis extra oleas Quod igitur propositum, an videlicet Lues Venerica idem sit cum Lepra Antiquorum, legatur duntaxat examen Leproforum à Guidone prefato descriptum; Medicus [inquit] debet imprimis interrogare de his, quę disponunt ad Leprā; Si ipse habet aliquid, ut si ipse est de genere Leproforum, aut si est conuersatus cum eis, & quales aggritudines consueverunt pati. Deinde inquirit cum notis ipsorum & cum ipsis de astretia & moribus ipsorum, & somnijs, desiderijs ipsorum, & si sentiunt acuitatem, ardorem & puncturas in carne: deinde tangat pulsum [quem vel antea dixerat esse debilem] & consideret aspectum; secundum

cundū, Supercilia si sint depilata, si sunt inflata Tu-
berosa: de naso, si est tortus, ulceratus intus; de Au-
ribus, si rotundantur & curvantur: de Voce, si loqui-
tur rauce & cum Naribus; de Labys & Lingua,
si sanguinantur & ulcerantur, & si habeant gra-
na: si anbelitus sit difficilis & fœtidus, & si eius
Forma sit diuersa & horribilis. Deindè faciat ip-
sū expoliare & consideret imprimis Colorem totius
Corporis, si est tenebrosus & morpheus; postea sub-
stantiam carnis, si est dura, aspera, tuberosa-
presertim circa Iuncturas & Extremitates, &
si est Scabiosus, serpiginosus & Ulcerosus: si co-
rium eius crispatur, ut Anseris; si muscoli sunt
consumpti: si patitur dormitationem in membris
&c. Hæc ex Guidone citato: quæ si cum Ac-
cidentibus Luem Veneream concomitantibus
conferas non magis aquam aquæ similem di-
ces, aut ouum ouo [iuxtà prouerbium] quàm
Morbum Gallicum huic Lepræ. Enim verò,
dum Prisci hanc in Alopeciam, Elephantia-
sim, Leontiasim, Theriasim diuidere volue-
runt; & rursus istarum Symptomata in Ser-
piginem, Impetiginem, Vitiliginem, Saphat,
Baaras Albaras, Scabiem, Morphæam, Liche-
nen [quod malum Simphorianus Champerius co-
ntendit acriter fuisse ipsum purū putum Gal-
licū morbum, quidquid ex alia parte negent id

Leonicens, Fuchsius & alij] dùmque istarum singulas adhuc in plures alias ægritudines subdiviserunt, distraxerunt, siue confuderunt, ad extremum nil, nisi nudo nomine *Lepræ* relicto, Neoterici porrò collectionem eiusmodi morborum in castris ad Neapolim demirati non amplius veterem, verum potius infirmitatem arbitrati nouam, novum propterea morbum novo nomine dignari voluerunt; sicque pro *Lepra* *Lues Venerea* nata est.

IV.
Prognosis:

Quod prognosin: sperauerat *Fracastorius* Luem hanc, vt supradicta (neque enim post inuentum *Luis Venereæ* nomen, alia porrò *Lepræ*, *Serpiginis*, *Elephantiasis* &c. ad aures crebrò peruenerunt) suum finem denique habituram; cecinitque iamdiù nēniam hoc carmine.

*Nāque iterum, cū fata dabunt, labentibus
Tempus erit, dū nocte atra sopita iacebit
Interitu. —*

Verum *Sennerto* dolente, spes illa ipsum plurimum fefellit: cū iam vltra 300. annos sub tali titulo durauerit, nihilque etiā de atrocitā sua remiserit. Aliundē potius spes eiusmodi aucupanda venit, ex *Pharmaceuticis* & *Diæteticis*. Hinc cœli clementia V. g. idest

aer

aer calidus & humidus (antiquo verbo] vt Ma-
 rinus, multum iuuat. Sic nempè *Fallopins*: cre-
 bra est mercatura Gallici Venetijs; sed aer sa-
 luberrimus est, secus oporteret relinquere locum
 inhabitatum, aliundè novos colonos expiscari.
 Pater proindè morbum hunc in calidis regio-
 nibus minùs sæuire, quàm in frigidis; atque
 Indos iccirco, quibus idem Endemius & ver-
 naculus est, cum ipso ad extremum vsque
 senium perdurare. Insupèr; febris Lue Vene-
 ree superueniens morbum soluit. Testatur hoc
 continua experientia; atque ipse imprimis
 rarò febrem *Pudendagricis* contigisse aduerti
 [vt & eosdem *Pesti* ferè nunquàm subiacere
 autumant *Paræus*, *Diamerbræckius* alijque,
 passim: imò, vel si *Bubone Inguinis* duntaxat,
 alioue morbo in *Pudendis* antea correpti fue-
 rint) quibuscunquè verò ipsam accidisse no-
 ui salutarem sempèr comperi, & ni adsum-
 mum virus alicubi fixum hæssisset, vt in
 Ossibus, quæ carie afficerentur &c. Prostat
 huius rei exemplum apud *Nicolaum Massam*:
Audiui [rescribit ita ad Appollonium suum)
Historiam Iuuenis laborantis Morbo gallico: qui
 haud dudum infectus fuit ita quod novus morbus
 proculdubio erat: quanquam dolores vehementissi-
 mi eum per uniuersum molestabant corpus, qui
 artus

Observat.

Observat.

artus omnes & caput etiam comprehendebant ut minime nocte dormiret, aderatque faucium & *Ulcera* exulceratio non parva: cui inveni superueniente tertiana febre ex pharmaco levi, quod illi exhibuisti: quarto die non tantum ab ipsa febre, sed à doloribus omnibus gutturisque exulceratione liberatus fuit, ac ita incolumis factus est, ac si nūquā aliquid mali passus esset. Et ego equidem sanatæ Luis nullum certius habeo indicium ipsa febre, quæ usum pharmacorum exceperit, ita nimirum, ut quum ægrum Ephemerā aliquā laborantem inuenio statim denunciem ipsum à Lue integrè coualuisse. Quod verò *Syphili* rarò febricitent, nec pestem contrahant, hæc ratio est; quia acidum *Venerereum* est ita fixum, ut alius cuiusvis inspirati miasmatis impressioni resistat. Atque hinc profectò oritur difficultas ab eodem perfectè eluctandi. Vtut enim affabrè curati, egri nihilominus sæpè in pristinum malum relabuntur. Difficilè paritèr inflicta in eos vulnera consolidantur: quin imò exasperantur & cancrofa fiunt ut plurimum, *Venerereo* nempe acidò Balsamicum quodlibet deuorante, & sic ceu fannā posticā Chirurgi operam eludente. Coeterò, quod Luis Species; planum est intèr ipsas pessimam esse *Legitimam*, hoc est

est primam: inter verò istius gradus, truci-
 lentissimum esse vltimum. Notavi tamen Observat.
 cum in his gradibus, tum speciebus, quot-
 quot Scabie, pustulis, siue crustis scatuissent,
 quæ siue arentes facile decidebant squamma-
 rum instar, siue humidæ Cuti adhærescebant,
 omnes nec tophos, neque aliam huiusmodi
 excrescentiam pertulisse: et vicissim, qui his
 subijciebantur rarò scabie fuisse tentatos. Sed
 isti doloribus capitis & Iuncturarum insupèr
 erant afflicti; illi, non ità molestè; foràs vi-
 delicèt versâ materiâ. Et iuxtâ memoratos
 gradus; tene Supremum illum nullam ad-
 mittere curationem, benè autèm tertium,
 & facillimè omnium alterum, imò primum;
 adeò quòd in hoc morbo, vt & plerisque, sa-
 lus in celeritate consistat, periculum in
 morâ. *Spuriam* quod attinet: Mulieribus hæc
 sempèr infesta, nisi fortassè gonorrhœa teneâ-
 tur. Quippè sic, imminuto per eiusmodi qua-
 si Saliuationem viru *Venereo*, non ità pericli-
 tantur, ac si tali diuerticulo, siue colliquia-
 rio carerent. Obseruavi iccirco complures à Observat.
 Maritis infectas, & quæ tamen fluxum illum
 non patiebantur, conuocatis postea atrocissi-
 mis febribus, Tumoribus, Cephalagijs diem
 clausisse & cum Intestinorum, aliorumque

Viscerum doloribus immanissimis, ex fermentatione videlicet, quam virus in sanguine accenderat. Nonnullæ insuper Mammarum. Schirro, Ulcere Vteri cancroso, Ovariorum Tumore laborabant adiectâ Femorum & Crurum gracilescencia nimia, & quarum præsertim Genua OEdematofus tumor occupauerat. Aliæ tandem morbum *Gallicum* naçte sunt *Legitimo* parem: quanquam Pustulis non ita crebris Foeminæ stipari solent, ac Viri, at viceribus tamèn copiosioribus veniam istam, *Veneri*, veluti cum sænore persoluunt. Uæ præ coeteris nihilominus prægnatibus & nutritibus [vt *Sacra* ferunt *Litera*] illæ siquidèm indubitatè abortiunt plerùmque, inque abortu de vita periclitantur; hæ iusto citius in Tabem incidunt. Coeteró, quod Gonorrhœam muliebrem: hanc iam dudum immedicabilem statuimus; addendum nunc, non referre utrū Vetulam deprehenderit, an Iuueniculam. Nuper etenim talem Gonorrhœam aduerti in puella 6. annorum, quam Conductor quidam inire frustra tentauerat, remedijs quibusvis non obstantibus adhuc perseuerare. Sed hoc in eum finem duntaxat, vt colligas etiàm hinc fundamenta Theoriæ nostræ, vbi nempe ostendimus non Vterum, sed eiusdem *Cervicem*

pri-

primariò infici in Gonorrhoeâ muliebri: ac prætereâ, Virile sperma analogum esse humori *glandularum Vaginalium*. Ettenim, si nec introducto *Pene* [vt constitit ex Iudiciali Visitatione] à corrupto semine, quod *exterius Vteri Orificium* tantùm irrumauerat, Gonorrhoea illa vera & verè virulenta (vti ex colore & consistentiâ dignoscebatur) haberi potuit, quidni dicemus è tali homogeneitate id prouenire debuisse; & cùm in eiusmodi puella partes tam organice quàm inorganice admodum tenellæ essent, adeoque cuiusvis alterationis susceptibiles: Nàmque hoc rursus in aduersarijs habeo, mulieres, quò iuniores, eò facilius infici, vel alterari. Postremò quòd *Hereditariam* attinet Luem: magis insidiosa est quæ à Patre, quàm, quæ à Matre influxit, vel à Nutrice. Quandoquidē vtraque hæc celeritèr se manifestat, illa verò non ità. Vt uerò (loquar cum *Terentio*) quod audio vulgo dici, *Dies adimit agritudinem hominibus*, sic dirior censenda Lues, quæ velocius accurrit. Hinc nati quilibet macri, graciles. excoriati, rubentes &c. ortum occasu ipso funestant: non ità citò, quorum Lues minùs manifesta est; ac tardissimè omnium, qui non sincero semine fuerint procreati. Serò quippè hi, imò aliquan-

Observat.

dò nunquàm originem *Veneream* ollent, con-
 uerso viru in aliorum morborum seminaria,
 & quæ tandèm nonnisi per *Antiuenerea* eua-
 cuari postulant; in quorum cénfu sunt Arthri-
 tides, Epilepsiæ, Affectus Scorbutici, Hy-
 pocondriaci, Herpetes, & si quæ sunt alia.
 Interim, quandocunque eò ventum fuerit (au-
 di in qualibet Luis specie) vt Esuries propè
 canina, Languor, Febricula, maximè verò Di-
 arrhœa & partium quædam aliositas, quæ
 identidèm recurrat, & remissio denique par-
 tium membranofarum obseruentur, tenen-
 dum, instare Lethum, & quòd

*Nec vis Herculeæ fatum evitabit acerbum
 cum Homero.*

§ 4

J.
 Cura
 Luis Ve-
 neræ Le-
 gitima

CArdo rerum itàque in hoc vertitur, ne
 rubelli sanguinis globuli ab acido *Vene-
 reo* perstringantur; in quo casu actum de Vi-
 tâ. Dùm verò eiusdem vis adhuc hæret in
 Lymphâ (quam nempè veluti vinculum esse
 adspeximus reliquorum principiorum massæ
 sanguineæ] considerandum, tenellum-ne sit,
 an firmum ipsius coagulum, habito nimi-
 rum respectu ad signa, idest ad morbos ab eius-
 modi coagulatione resultantes iuxtà quadru-
 pli-

plicem illum Luis *Venerea* gradum, quem designauimus. Et si adeò eiusdem lymphæ filamenta in tenuem quendam cremorem solummodò abierint, sufficiunt, quęcunque istum excutere, raras veneni copias dissipare apta sunt, imprimis falso acria cùm fixa, tñi volatilia, quorum, efficaciam in eiusmodi statu nemo non est expertus: suntque è prioribus omnia ex Esulâ, vt Scammoniata; deinde Colocynthis, Jalappa, Heileborum, atque ex his parata Electuaria, Confectio hamech. trocisch. alkandal. &c. In formâ liquida si exposcas

Rx. fol. sen. 3j; rhabarb. ellect. 3jss. Infund. per noct. in vin. alb. ℥j. Colat. dissolu. syrup. rosat. 3℔. confect. hamech. 3v. f. p. pro 3. dos quarum p. cap. hor. 1. matut, Alteram hor. 2. deinde interiecto iusculo sumat ultimam hor. 5.

Coeterà tam hæc potio, quàm boli, aut pilulæ purgantes (quas vnusquisque sibi pro temporum ac temperamentorum diuersâ ratione fingere, ac variare poterit) alternis diebus repetendæ sunt, ter, aut quater, aut, vsque quód uisum fuerit sanguinem conuenientér satis fuisse agitatum. In quo casu locum habent alkalico-volatilia, seu. *Diaphoretica.*

Rx. mithridat. 3j. laudan opiat ʒj ʒ. M., uel solut. in aq. scabios. ʒ pauca cinamom. f. p. C. h. s. (uti hoc antidotis illis narcoticis, inquit hac occasione Platerus præsertim si admissione narcotica ipsorum vis augeatur, exhibitis evenire solere, theriacamque ʒ mithridatium opio dempto sudores minimè mouere alibi docuimus).

Tale *Diaphoreticum* vsurpare ego soleo tùm alias ad compescendos dolores maximè nocturnos, tùm imprimis post copiosas deiectiones ad humorum præcipitationem, maioremque fixationem (quæ contingit sero sanguinis liberaliùs euacuato] suspendendam . Seorsùm purgationem, quoniàm *Diaphoreticorum* diuturnus vsus esse debet, eligenda iccirco magis balsamica, vt ligna quatuor exotica, idest radix chinæ, lignum guaiacinum, Sassafras & sarsaparilla quæ porro sulphur sanguini conciliare solent; & prætereà, quia mediante hoc sulphure (illi scilicet, vnde lymphæ est, homogeneo) se se facile in istud sanguinis elementum insinuant, maiorem iccirco agitationem cient in hoc succo, adeoque & *Diaphoresin*, aut *diuresim* vberiore. Quippè, quand la sueur ne seroit pas bien copieuse (subintrat hic de S. Romain),
que

que cela ne vos inquiete point: le succes ne,,
laissera pas d'etre heureux par le moyen des,,
eiections & des vrines abondantes & epa,,
isses, ainsi qu'on pourra voir dans le pot de,,
chambre, lesquelles supleront au defaut des,,
sueurs. Jàm verò qualis esse debeat admini-
stratio eiusmodi lignorum tam clarè ab alijs
videtur indicatum, vt in hoc longiùs lecto-
rem distingere ducam in anathema. Moneo
solummodò, quòd in tali administratione he-
rendum nequaquam est in solâ sudorum ex-
spectatione; verùm in lymphæ penetratione
potiùs, atque in virulentorum salium lique-
factione, quæ proptèr analogiam supradictam
contingere consueuerunt ex apozematũ usu,
quæ ex lignis memoratis constiterint; ac pro-
ptereà in tali casu respiciendum potiùs ad
vrinas atque ad excrementa aluina, quam
ad *Diaphoresin* præfatam. Quamobrem inter-
miscenda semper *Purgantia Diaphoreticis*, vt
& quod ab his præstitum fuerit, ab illis ex-
pediatur, hoc est eliquatio, inuersio & vene-
nati miasmatis eliminatio. Rapimur deindè
ad alterum Luis *Venerea* gradum. Hic eadem
quæ suprà conueniunt, sed fortiùs, atque
importuniùs exhibita (intelligo *Purgantia*,
nám *Diaphoretica* non sunt *Antivenerea*; nec
nisi

nisi viam etherogeneis salibus in cathartico latentibus sternere solent, ut ex dictis colligi potest]. Urgenda proinde illa, utque ad usum decoctorum sudorificorum deueniendum fuerit, præscribentur hoc pacto.

R. lign. sanct. rasp. & cortic. eiusdem 3 ij. sal. separeil. 3 ss. fol. sen. oriental. 3 iiij. hermodactyl. 3 j; C. C. limat. sem. anis. cinamom. elect. a 3 ij. inf. in ℥vj. vin. alb. per triduum in vas. viuat. bene lutat. sup. cin. calid. Coq. deinde ad 3. part. consumpt. Colat. add. sal. guaiac. 3 j. f. apozem., de quo cap. eger M. & vesp. 3. v. hor. 3. ant. past.

Hoc remedio [verba sunt Foresti de apozemate purgante] consumuntur dolores, ulcera persanantur, resoluuntur citrà inunctionem pustule, gummositates, nodi sic, ut neque topicis medicamentis, neque Chirurgia locus ullus relinquatur. Refert quoque idem Author circà hanc rem obseruationes Augerij; quem vsque ad citata verba elogio profecutus fuerat, inducitque hæc: Noui ego (inquit idem Augerius) qui idem effecerunt decocto buglossi triginta diebus utentes, & septimo quoque die superfluitates expurgantes cum cassia nunc sola, nunc adiecta confectiione hamech: Alij absynthy & mercurialis decocto vsi sunt; Alij bis, aut ter in hebdomada purgationi-

tionibus utentes tricesimo die sanitati restituti sunt: aly bis, aut ter idem facientes &c. Vnde liquet, facultatem eludendi virus *Venericum* non *Sudorificis*, aut *Purgantibus* concessam esse. Quod si nihilominus tam frequentér purgare non libet, iungendum erit *Diaphoreticis*. *Antimonium* crudum; quod ratione salium alcalicofixorum rectius obsistere videtur veneno prædicto, & cum *Mercurio* eminentér contineat. Modus adhibendi in decoctis tam notus est, quàm, quod notis: dabo nihilominus exempl.

R^x. radic. Chin. & sals. parill. minut. incis. à 3. ij, lign. guaiac. & sassafras contus à 3. j. b., antimon. crud. crassiusculè triti & in nodul. suspens. 3. j, Inf. sup. ciner. calid. per 24. hor. in vin. alb. ℥. vj. Coq. deind. ad. 3. part. consumpt. Colat. cap. ter in diem, mane. scilicet, à prandio, & ant. decub. continuand. donec. &c.

R^x. lign. sanct. contus. & sals. parill. minut. incis. à 3. j., antimon. crud. in nod. suspens. 3. j, Inf. sup. cin. calid. per. 24. hor. in aq. font. ℥. vj. Coq. deind., ut supra. Colat. utatur pro pot. ord.

Coeteró vinū nos adhibemus in decoctis partim ratione tincturæ, quæ cum eodem melius extrahitur; partim ratione stomachi, qui

à *purgantibus* eneruatus metū incutit, ne accedentibus postea cruditatibus ex aqua, dispepsis fiat, aut alius morbus hanc sequi solitus; partim denique ratione sanguinis, qui vino fortius exagitur. Iamque hisce remedijs curari posse *Luem Veneream* in primo, aut secundo gradu constitutam à nemine in dubium reuocari debet; apparetque hoc satis tam ex Scriptis eorum, qui antè *Carpium* saluationis Inuentorem de *Lue Venerea* meminerunt, quàm ex Observationibus insequentium Authorum, in specie *Zacuti*, *Plateri*, *Borelli*, *Riuery*, *Timai*, præter *Forestum* & *Augerium* præfatos. Vnde qui hodiè libros inscribunt, *Methodus curandi Luem Veneream absque saluatione, & Mercurio*, nihil noui afferunt; cùm talis morbus, si recens sit, non egeat isto: Si autem vetus, siuè ad tertium gradum peruenierit, vti mediantibus *Catharticis* & *sudorificis* sanari respuit, ita *Mercurio* tantum palmam cedit. Permagni ergò refert stationes hæce morbi percunctari, & ne in curatione saltim, *Entia* (quod aiunt Scholastici) *absque necessitate reduplicentur*. Interim, si tertium gradum prædictum iam conscenderit ista, *Lues*, longè fortiore cuneo opus est, vt enodetur. Consueuere propterea Practici

post

post vsum decoctorum ad Sudatoria deuenire, intèrque concremandum eadem apoze-
mata propinare. *Concremandum*, inquam: ne-
que enim heic me continere possum, quin re-
petam quod de talibus fornacibus aut Stu-
phis iamdiu scripseram ad Amicum, scilicet:
Uideres homines ex fide potius Nebuloni cui-
dam prestita, quam impudicitia aliquandò
reos ibidem exitia sua cubare, gehennam ma-
turare: videres, inquam, miseros incendio fla-
grantes, assos ac ferè tostos clamores edere in-
gentes, eiulare, suspirare, gemere velut ex
Barathro; & nihilominus tamen non audiun-
tur, satellibusque, seù lictoribus ac tortoribus
laus summa est non esse clementem: Nec pre-
ces nimirum, nec vota iuvant; longum vstu-
lari facinus, diu torqueri, victoria. Heu pi-
etas! ast istud adhuc iucundi est: quòd, postquã
te triduo torserint, si perseverandum est, im-
petrari supplicia debent, ne dicam magno pre-
tio emi: secus aduenturo Ministro aulico, Ma-
gnati cuiquam, aut, quẽcumque demum com-
miniscatur avarus Iatralipta, locus cedendus
est; ac tu interim tantum non coctus abibis.
profundendum iccirco, & quemadmodum.
corpus sudore, sic loculi pecuniã emungendi.
Macte tamen prodigalitate ista! hoc enim

Observat.

dèm euicisti vt qui antea pedester indè recessisses, expleto mense iam efferri debes tabidus, exsuctus, languidus, semianimis, tanquam cadauer, neque alia demùm mercimonia onustus, nisi, quam antè in corpore gestabas. Profectò vidi hos è stuphà ad xenodochium continuò remeasse, & quibus nihil iam reliqui erat præter Animam: nec numerare possum singulos, quos vel insanabiles redditos noui, vel extinctos. Generalitèr de omnibus; aduentabant squallidi, aridi, languidi, imbecilles, siticulosi, famelici, queruli, semper alsi: nonnulli, qui quadratæ staturæ extitissent, faciei flatulentiam, membrorum cachexiam, pectoris anxietatem, hypocondriorum distensionem, musculorum denique inferioris ventris ligneam quasi indurationem præferebant, & præsertim qui longiori tempore talia hypocaustra introiissent. Alij, quibus vlcus *Præputium*, aut *Glandem* occuparat, non obstantibus etiàm peculiaribus subsidijs Jatraliptæ diobolaris, gangrænâ insupèr in eadem parte affligebantur: Plerisque tandem Pulsus tenuissimus palpabatur, Mictiones erant exiguæ, Diarrhœa, Algor ac Mors denique ingruiebant. Iàmque exfectis funeribus conspiciebam insignem Pulmonum extenua-

tenuationem, schirrosas cum Hepatis, tum Lienis obstructions, Bilis præternaturalem [potissimum in hoc morbo] parsimoniam, nigredinem atque adustionem, lympham liquatā, atque ad intestina in lenticularem formam deuolutam; postremò sanguinis vel duabus abindè horis explorati spissitudinem, feculentiam & limositatem. Quibus spectatis non potui non abhorreere ab eiusmodi remedio, melioremque Medicis in stuphâ determinandâ mentem precari. Et sanè, quæ compendia ex sudore? Expressa hæc mera est serositas, ros sanguinis extrorsum pulsus. Quæ igitur emolumenta ab eiusmodi expulsionem, nisi ad summum quòque contingeret ex eâ, ut virus pariter per cutis poros exprimeretur, utque adeò lymphæ se se in pristinā assereret libertatem? Cùm verò contrarium potius accidat in *Diaphoresi*; & venenum illud in sicco relictum mole crescat, proindèque aptius euadat, ut quùm iterum dilutum atque in actum fuerit exertum, peiora prioribus moliatur: lymphæ itidem glutinis formam nacta minùs penetrabilis postea reddatur, restat ut in forti istius crassamento (cuiusmodi nempe est in tertio Luis statu) ex sudoribus, nedum ut benè vertant, omnia veriùs pessimè cedant;

Observat.

Ettenim Sanguis sero depauperatus spissam ac fusæ pici consimillimam consistentiam inducit. quocircá non tam impar euadit fecerendis recrementis, quàm membris etiàm, præ balsamicarum partium colliquatione & exhalatione, nutriendis. Hinc itàque fiunt Tabes; hinc Pulmonum extenuationes, tubercula, excrescentiæ &c. hinc demùm Hepatis aliorumque viscerum tenacissimæ obstructions. Mitto præparationes in Stuphis, quæ dùm diutiùs luduntur, ansam morbo dant, vt Tragædiam claudant irreparabilem. Quod mea: dicam, eorum, quotquot Hypocausta curationis ergo frequentasse noui, neminem comperisse, qui exindè non totale exitium, vel nullum subsidium, vel si quid vtilitatis denique sibi compararit, id neque statim, ob virium deiectionem, nec subindè, ob morbi regressum degustare valuerit; si qui verò sub morbi initio benè se habuit, remi hoc aliud (vt adagio fertur) genus erat, & quod iuuamen ego non igni; verùm propinatis in Stupha, vt moris est, *Antiueneris* pharmacis acceptum potiùs referendum duxi. Siuè igitur ab actuali flammâ pendeant sudationes, siuè á potenciali, vt in vaporarijs, quorum alia Artificialia, vt ex spiritu vini: alia naturalia sunt puta

puta Puteolana, Luem *Veneream* illa radicalitèr nunquàm extirpant; benè autèm incubant, atque interim ægritudines post se trahunt, quibus interdùm mederi non possumus: quemadmodùm videlicèt factum nupèr est in Iuene pristinario; qui cùm diù & benè sudasset, oculorum humores etiàm sudauit, & sic breui cæcitatem induxit. Extirpaturò itaque Luem, quæ tertium attigerit gradum [ità nempè, vt lymphâ sanguinis à virù affabrè fixata sit] inuestigandum quod remedium ex vna parte analogum sit illi lymphæ, seù, quod in ipsius filamenta gliscere ac se vbique in eâdem insinuare valeat: ex aliâ, alchamico-volatilibus suis particulis venenū præfatum subuertat, mutet, eliminet. Vix autèm dari posse censeo, quod vtramque hanc paginam impleturum sit, vno excepto *Mercurio*; qui vti in Macrocosmo sulphuratis omnibus se coniungit, auro nimirùm, argento ac coeteris metallis, sic in microcosmo sulphuri sanguinario. Veruntamèn vt analogia hæc inter lympham & *Mercurium* magis elucescat, præstat de istius origine pauca præfari. *Mercurius*, qui & argentum viuum & hydrargyrum, Liquor est metallicus, albicans, homogeneous, omnium metallorum materia, ob idque

Observat.

idque panspermia metallica appellata. Undè licet arguere, quòd elementa hydrargyrum componentia sunt simplicissima: ipsum nempe sulphur metallare primum; cuius stamina per diutinas in terre meandris filtrationes cum elongari, tum complicari, idest elastica fieri didicerunt: Quamobrè congregata, atque à minerali aliquo corpore excepta in cincinnos denique transferint, siue in mercuriales glomos figurâ fluxiles, nec tamen vdos. Porro è tali homogeneitate partiû pendet imprimis læuor, qui vbique in superficie globulorum mercurialium externâ spectatur. Nam si nullum metallicum Ramentum secum abrepserint hamata illa, idest sulphurea filamenta, tales globuli omninò perpoliti sint oportet; ac tametsi aliquandò emeticus, aut corrosiuus perhibetur *Mercurius* [id quod indicat aliarum partium in hoc ipso cōmixtionem] emesis tamen illa & corrosio non ab essentia hydrargyri sulphureâ verum è minerâ, cui hæc infederit, repetenda venit, à matrice nimirum minij, cinabaris, stibij, immò nonnunquàm etiàm arsenici, utpotè quod, iuxtà *Kircherum*, ad alia metallica gradus est: et de facto tales *Mercurij* affectus non.

nonnisi a prauâ eiusdem *mercurij* purgatione
procedere testantur ferè omnes Chymici. E
læuore ad pondus. Vt enim læuigata omnia
& complanata corpora aeri ingressum inhi-
bent, ità maximè ponderare solent: confe-
ratur *Boyleus*. Et prætereà, cùm hydrargyrus
flaminibus politissimis conflatus, atque insu-
pèr aporodion, sine poris, sit, patet ratio, cùr
de suo is nihil vnquàm amittat, ægré pari-
tèr fixetur &c. Postremò, est etiàm indiuisibi-
lis *Mercurius*, hoc est, ipsius partes, quamuis
in diuersa abstractæ, se se nihilominus recol-
ligunt sempèr, atque in vnum confluunt.
Hanc indiuisibilitatem aliqui Sympathiæ
cuidam attribuunt, ego defectui porositarum
nupèr allegato. Ettenim, cùm aerem non
admittant mercuriales globuli, atque ex aliâ
parte interiacentes eiusdem columnas ponde-
rositate sua superare valeant, sequitur, vt eò
impulsi, vbi minùs aeris interfluit, cōgregētur
postea ac simul vniantur. Quod si regeris cum
Rhoaultio & alijs, argentum vivum ideò per-
petuò mobile spectari, quòd poros habet hinc
indè permeabiles; resp. hoc falsum esse, mo-
bilitatemque illā nonnisi ab elasticitate flam-
inum sulphureorum [è quibus nempè *mer-*
curium constare deprehendimus] esse repeten-
dam

dam. Et de facto talem elaterem *Mercurio* inesse apud omnes receptum est, maximè Machinarios & Philosophos Experimentales Iuniores. Verùm ad dictam indiuisibilitatem reuertendo: mercurialium staminum impenetrabilitas est, quæ ipsum *Mercurium* determinat ad aurum, ad argentum & reliqua metalla, non verò tendentia ad Perfectionem, vti opinatur *Kircherus* præcitatus, aut electrica quædam facultas & elementaris, iuxta alios. Quippè vicina entia quo minùs porosa sunt, ipse, qui sine poris est *Mercurius*, inquirat decet, eoque citius, quò minùs aeris intèr illa & *Mercurium* interponetur. Jàmque adeò, vti aurum solidissimum est ac minimè permeabile, & *Mercurius* omninò imperuius, ita hic ad illud cogitur à contrenitente cælesti materiâ, eoque effertur. Iungitur his insuper homogeneitas principij: cum vtrumque eiusmodi metallorum ab eodem sulphure sit, imò, & ipsum aurum ab eodem *Mercurio* &c. Quibus sic explicatis, aio cum *Gaspare Scotto*, quòd si aurum absit, adsintque tamen alia corpora, cum quibus, aut cum quorù effluuijs agnationem aliquam habeat, *Mercurius* utique ad illa confluat; vt ad argentum respectu auri &c. vt quorum idem principium est.

Cùm

Cùm autèm in humano corpore sulphur adfit Macrocosmico illi affine, scilicèt lymphæ sanguinis, vt suprà innuimus, quidni dicamus proptereà, nihil existere in naturâ quod eidem lymphæ magis hæerere eandemque magis penetrare valeat, præter *Mercurium*. Colligitur affinitas ista ex multis historijs, quarum nonnullas recitat *Aldrouandus* his verbis. *Relatum est in historijs quondam in caluaria mulieris, quæ iam biennio ingenti dolore capitis perierat, argentum viuum pondere duarum unciarum inuentum fuisse. namque id sensim in cerebro colligebatur dum quotidie mulier in fucis eodem utebatur.* Ettenim ea est vis argenti viui, vt in tenuissimum halitum facilè transeat. Hac de re non est mirandum, si referente *Leuino Lemnio*, quandoque ex incisa eorum vena, qui semel atque iterùm proptèr luem *Gallicam* hoc inuncti fuerant, aliquot drachmas hydrargri emanasse conspectum. Sic nota est etiã historia cuiusdam Antonij Galli, qui pluries hydrargyro inunctus, neque copioso sputo, neque fluore alui correptus est, sed tantùm per vrinam hydrargyrum minxit. Tradunt etiã historiæ quædam, nonnullas mulieres vt maritorum vitæ lethaliter officerent, argentum vivum eis deglutiendum dedisse; sed

cum sit ponderosum & mucco intestinorum analogum, illicò per alvum absque vllò incommodo fluxisse. Testatur etiàm *Kircherus* sua etate Romæ in cuiusdam aurificis post heteroclitos capitis dolores multo tempore perpeffos tandèm Defuncti cerebro plus quàm libram argenti viui repertam. Ex his constat confluere intèr se argenti viui particulas, & spiritus, & adherere certis humani corporis partibus potiùs quàm alijs. Hucusque *Schottus* prælaudatus: ex quibus etiàm colligitur, tales partes, in specie organicas, esse glandulas lymphæ secretioni dicatas, imprimis verò Cerebrũ [quod neque adeò immerentèr à Priscis *pituita Emporium* vocatum est] intèr inorganicas autèm esse ipsam lympham toties decantatã. Iam verò, quemadmodùm hæc lymphæ materia est recrementorum é glandulis omnibus Uessiculosis destillantium, in Ore, Ventrículo, Intestinis, Cutè, Renibus &c.; et *mercurius* próptereà tam vni, quàm alteri parti indifferentèr adhæret, vti nouimus, quærendum hìc à nobis quid meliùs in Ægrorum salutem cefsurum sit, si nempè *Mercurius* per *Ptyalismum*, *Emesin*, *Catharsin*, *Diaphoresin*, aut per *Diuresin* demùm operetur? Respondent hodierni Practici, intèr has actiones *Ptyalismum* proculdu-

culdubiò optimum, esse inque Lue Venerea coe-
teris palmam præripere. Verùm etiam si com-
munissima opinio fidem maiorẽ promereatur,
non libet tamen ità eidem inherescere, quin
ad vltiores inuestigationes animus induci
queat. Estò igitur *Ptyalismum* siuè externà, siuè
interna *Mercurij* administratione procuratũ
à morbo tam truci liberare; quid nihilominus,
si hoc ipsum per aliam viam obtineatur? Quip-
pè imprimis cura per *Saluationem* satis lenta
est; 2. parum tuta; ac 3. denique minimè iu-
cunda. Est laboriosa ac tarda ea Cura, quo-
niàm eligenda primò anni tempora, tum
Chirurgi expertissimi salutandi, prece & pre-
tio rogandi &c. insupèr domicilia mutanda,
Euacuationes præmittendę, Balnea, decocta
& id genus alia sustinenda. Qui igitur celer
esse possit talis cura? Est præterea parum tuta.
Nám quot inuenias vel tẽrue quaterue à Ton-
fore inunctos, & quos tamen *Saluatio* à Lue
nunquàm liberauit? Ratio autem istius phœ-
nomeni est, quia per Illinitionem ità lymphę
commisceri nequit hydrargyrus, quin ali-
quos semper angulos in eadem linquat imper-
scrutatos. Videatur *Ucay*. Et rursum, quia
siuè vnctionibus, siuè Suffumigijs instituatur
Saluatio, ea nunquàm *Mercurij* dosi exigi ad

libellam potest, quam aliàs Medicus requiri nouit in hoc, vel illo Luis gradu ad virus magis minusue fixum edomandum. Quocircà is tùm vel in paucâ quantitate rapitur in corpus, & sic inutilis euadit Operatio; vel è contrà, in magnâ scilicèt mensurâ. In quo planè casu tumultibus enormissimis excitatis tàm subiti fiunt morbi, Suffocationes puta, Lypothimie, Convulsiones &c. vt penès Medicum non sit eosdem reparare. Denique nec est iucunda eiusmodi Curatio, cum sit longa; cùm æger eundem decubitus perpetuò seruare, nec libera frui aura, nec masticare debeat; cùm, inquam, idem fætorem suum, cadaueraceum tolerare, mortem continuò meditari, timere, ingentissimos denique cùm Palati, tùm Capitis dolores perferre cogatur. Infurgis illum hisce obuiam iturum satis, qui *Saluationem* non Inunctionibus, suffumigijs Cingulis, Emplastris &c. verùm *Mercurio* internè adhibito prouocet. Ad quod resp., quòd utcūque licèt hoc pacto res tutiùs processura esset, quis nihilòminus spondeat, illum *Saluationem* inducturum potiùs, quàm Emission, Catharsin, aut Mortem? Et certé, notum est, quòd ad *Ptyalismum* excitandum, *Mercurius* imprimis crudus minimè confert.

Quem

Quem verò latent strages ab eiusdem præparationibus inuectæ? de Mercurio vitæ, quo ad illum finem vtuntur nonnulli, narrat *Lotichius* vidisse se puellam nobilem, ex eius assump-tione peremptam. Quamobrèm hisce historiam claudit. *Ab eo casu, (quem hisce oculis meis mihi notavi) istoque tempore Mercurius vitæ prout falso vocant isti, rectius Mortis pararius appellandus, temetsi quidem à præstantissimo Chymico foret subactus preparatusque, horribilis mihi sacerque extitit: adeoque opinor, non, nisi cum religione & conscientia tractandus, aut (quod prestaret facile) unanimi Medicorum nostrorum consensu omninò damnandus.* Et quod ipsum *Mercurium* dulcem: eius præparatio simplicissima, omniumque innocentissima perhibetur; casum nihilominus Medici ab eo occisi habet *Heluigius*: nec diù elaborabo in perquirendis alys Practicorum Observationibus; quà de præcipitato albo, panacea, bezoardico minerali puluere Valgaroti quàm denique de sexcentis alijs *Mercurij* præparationibus, quæ iam iam quilibet *Pudendographus* comminisci consuevit; & quæ quidem Observationes satis indicant noxas eiusmodi compositiones sequi solitas; adeò, quòd plures receptas demùm tradere conati sint, quibus persuaderent Luem

Venerem citrá omnem *Mercurium* curari posse: suntque ij *L' Abbè Rousseau, Boirel, de S. Romain, & aly Galli*. In id enim animum nunc induximus, vt ostendamus *Saluationem* ab eiusmodi *mercurijs* quandoque irritò exspectari. Sed demus insupèr rem ità contingere; *Saliva* nihilominùs exindé nūquàm in eâ tùm consistentia, tum quantitate fluet, quæ exposcitur ad perfectam sanationem. Quæ ergò utilitas eiusmodi *Ptyalism*? Et denique, annè suis caret incommodis ista *Saluatio*, vtcunque licet per interiora obtinueris? Nonnè, inquam, ex eâ saltim *Oris exulceratio*, *Dentium vacillatio* sequentur? His sic consideratis *neruos omnes intendendos duxi & ne, ad minimum mala hæc ex Mercurio* contingerent, & vt prætereá *Magistri essemus tam indomiti* [vt *Chymici aiunt*] *Lupi*. Pro mea virili, non alitèr meliùs frænatum iri didici *Argentum vivum*; quàm ipsum ad *Intestina determinando*. Sic enim istud veneni *salia per naturalem viam educere, sic in sanguinem penetrare, lympham triturare, quoquoersum influere*: sic insupèr ab *Ore Neruis Capite arceri*; sic denique eiusdem vis *incitari, cicurari, iterum stimulari, contineri, aut omninó cohiberi potest*. Sciscitaberis, quo pacto

facto *Mercurij* virtus ad intestinales glandulas determinari queat? Resp. *purgantia* sæpius exhibendo. Vt enim istorum actione lymphæ sanguinis auocatur ad tales glandulas; ita *Mercurius*, qui lymphæ motum sequitur, *purgantium* ope trahitur ad eandem partem. Et de facto à *purgatione Saluationem* coerceri omnibus in comperto est: quod me docuit Intestinales glandulas auidius appeti à *Mercurio*, quàm Palatinas; nec deest ratio. Siquidem maiorem lymphæ copiam excernunt ac prætereà crassiores sunt, seu diametri maioris: Palatinæ verò minuscule minùs lymphæ, quàm serositatis eructant. Obijcies nihilominus, patere ex inunctione Mercuriali, quòd *Mercurius* salivæ libentiùs nubit, quàm mucco Intestinali. Ad quod Resp. contingere hoc ut plurimum præmissis balneationibus, per quas introducto in corpus liberalitèr sero hydrargyrum, quod deindè superuenit, illius undam sequendo ad serositatis potiùs, quàm ad lymphæ filtrum deferitur, scilicet ad Palatum. Coeterò, missis Balneis, Inunctione illa Intestina potiùs vruntur, excruciantur, Diarrhœam, vel Dissenteriam minantur &c. Junge quòd Exteriora Corporis cùm Palato citiùs communicant, quàm cum

Intestinis, quorum vasa lymphatica à Me-
 feraicis Vasculo-vefficulosis glandulis pendēt.
 Ergó [inquiet aliquis) *Mercurium Purganti-*
bus maritabis ! Resp. nequaquam : fore nem-
 pè sic, vt *Mercurio* Intestinatorum motibus ob-
 sequente minima ipsius pars intruderetur in
 venas; præscribere me idcirco, & quidem in
 principio, *Cathartica* etiàm validissima, qua-
 lia scilicèt in superioribus adnotauimus: su-
 bindé autèm, quùm lymphæ sanguinis Inte-
 stina versùs iam inclinata est, iisdem rariùs
 opus esse, quolibet nimirùm triduo, aut qua-
 triduo, ne fortè eadem lymphæ aberret á tali
 motu, vtque virus identidèm euacuetur, &
 si præsertim *Mercurius* non fuerit hydrago-
 gus. Coeterùm, alio tempore, huic tantum-
 modò lito. ab eo namque cùm prædicti ve-
 neni subactio, tùm grumorum sanguinis dif-
 gregatio expectanda. Quod si nihilominùs
 mali quidquam ex *Mercurio*, signumue ali-
 quod *Saluationis* immineat, quoniàm in eo
 casu appropriatis *purgantibus* vis illius suffic-
 ientér illuditur, in hjs adeò totus sum, eun-
 dem sic ab Ore, Capite, Neruis, Pectore, aut
 ab Intestinis arcessens: verùm metu solutus
Mercurij vsum pedetentim resumo; nec desisto,
 quòad aliud emergens alia suadeat. Hinc igi-
 tur

tùr alternando, & nùnc *Purgantium*, nùnc *Mercurij* doses augendo, minuendo, instando, suspendendo &c. eouſque procedo, vſque quòd viſum eſt venenum omne etiàm medullitùs, vt aiunt, ſcrutatum fuiſſe. Fine enim tunc curationi impoſito, veriùs pauſà factà, ad reliqua procedo, quæ venenum abluendo, triturando, volatilizando diſperdere, ac ſanguineam maſſam ad debitam conſiſtentiam, craſimue reuocare idonea ſunt, velut ad balnea, ſerum lactis, iuſcula viperina &c. de quibus alij multa ſatis diſſeruerunt. Iam verò notandum, quòd hoc modo inſtituta Luis cura intermitti, reſumi, diſtribui, diuidi, aut continuari poteſt, pro Medici nimirum prudentià, vigilantia & doctrinà. Itèm, quòd ſi *Catharſi* longiùs adhibita *Saluationem* poſteà tentare libet, hoc continuò liberum eſt, imò proficuum aliquandò, in morbo ſcilicèt contumaci; & ſi prætereà é tam diutinà *Catharſi* Intestiſinorum læſio metuatur. In hjs quippè caſubus ſufficit *Purgantia* ſuspendas: quibus amotis, continuatoque *Mercurio*, *Saluatio* contingit, vt patet. Nota 3. quòd nec prægnantibus noxia eſſe poteſt cura præfata, modò *Mercurium* non niſi rarò & granulatim exhibeas: fore námque hinc, ne foetus de Lue

de Lue periclitetur, vtque hac mulier vltè-
riùs non infestetur &c. ; quod tamen sperari
à *Salinaione* non debet, vt quæ Grauidis om-
ninò contraria quemadmodum & Menstrua-
tis, imò omnium maximè ijs, quibus men-
strua defecerunt: non sic methodus nostra.
Nàm *Mercurij* dulcis successum in obstructio-
nibus quibuscunque nemo non nouit. 4. No-
ta iucundam esse talem curam. Siquidem
præterquàmquòd remedijs expeditur mini-
mé nauseosis ac parui sumptus, incommoda
quoque non est. Uideres scilicèt Ægrotos vel
innumeris plagis faucios in dies singulos velu-
ti reiuuenescere, quotidie minùs de morbo
conqueri, magis mundificari: videres, inquam,
omnes munia sua alacritèr profèqui, po-
cillari, in liberâ aurâ versari, nec de vlla cu-
ra suspicionem vel minimam alicui incutere.
Adde 5. quod securitatem: non tàm quo-
libet anni tempore tutam esse illam, sci-
licèt methodum; Verùm ipsa, qualemcumque
etiàm desperatam Luem caueri posse, *Mer-
curium* videlicèt ità subministrando, ne vi-
res deficiant, interim expulso pedetentim.
morbo opus vigorosè perficiendo: cùm è con-
trà methodus *Saluatoria* vti domina esse ne-
quit *Servi* illius *fugitiui* nuncupati, ità Me-
dici

dici indicationibus in tali casu inferuire non
valeat. Vltèriùs per *Saluationem* non curan-
tur Syphili, quibus insint ossium caries, vlcera,
tophi, ac similia plura: nostra verò curãdi nor-
ma siuè hęc, siuè illa equè delentur, & tametsi
nullũ emplastrum admouéas. Norunt nostra-
tes imprimis Virum Illustrissimum (quem, vt
& alios, quamuis minoris notæ, hìc nomina-
re nefas est habentem Laryngem prioresque
Asperæ Arteriæ carthilagine ità exulcera-
tas, vt nec respirare, neque ampliùs loqui
posset; rursùs ità excarnem, vt viuum sce-
leton repræsentaret ex Lue, quam iam à quin-
quennio perferebat [& tametsi omnẽ penè su-
pellectilem & pecuniam in Barbitonforum
manus effudisset] nostrà nihilominùs (absit
iactantia verbo] industria tam bellè ac benè
conualuisse, vt nullum ne raucedinis quidẽm
incitamentum in eo relictum sit. Denique ip-
sum-met cancrum exulceratum cum vel mi-
nimã Luis Venereæ suspicione [ettenim de
Marito duntaxat dubitatum erat] in Naso &
superiore Labio in Muliere quãdam non ità pri-
dẽm à nobis curatum vidit *D. Io. Dominicus Ca-*
ualla Chirurgus *Astensis* præstantissimus (&
quem vtpotè mei obseruantissimum redhosti-
menti ergò hìc nominare libuit] concepitque

Observatio.

spem exindè vlcus quodlibet vel malignissimum, nostro, vt putat, Secreto sanatum iri posse. *Secretum*, inquam, Nám postquàm casu factum est, vt in amplissima dignitate constitutus Vir, cui ad medendam grauem Cephalagiam nodis eiusdem Capitis aliarumque partium &c. stipatam ex *Pudendagra* ab ineunte ætate contractâ accitus fueram, me enixé rogasset, vt quandoquidè in longinquo degebat, tertio scilicèt ab vrbe milliariorio, nec famulitio vti poterat stantibus anni tempestate, reique domesticæ necessitatibus, mitterem sibi hebdomadatim quicquid tali tempore insumendum foret: factâ iccirco recepta, in qua singula ordine describebantur iuxtâ numerum dierum, quibus ijs vti oportebat, ipse è contra inuerso, ordine quæ vltimò deuoranda erant primò loco assumpsisset, & sic *Mercurij* dulcis doses aliquor non præmissis præmittendis deglutiuiisset ex desperatione (vt postea fassus est. Speraue-
rat nempè doses, quas fortiores crediderat malum suum citiùs alleuiaturas esse] tandè atrocissimis Intestinorum doloribus correptus & Diarhœa & Gulæ aliarumque primarum viarum excoriationibus ex *mercurio* perperam sublimato [ipsum namque
im.

imperitus ac tùm mihi in Vrbe nouo nondùm
fatis perspectus Pharmacopæus emerat ex al-
ijs] è viujs ereptus fuisset duobus ab indè men-
sibus Medicorum, in eo certè casu minùs ver-
satorum diligentia quàcumque adhibitâ non
obstante[me scilicèt prò suspecto immeren-
tèr habito & minùs auscultato] postquàm,
inquam, hoc mihi euenit, propositum reno-
uaueram (id enim sacrum æternumque eòus-
que mihi fuerat, ex *Syluij* omniumque *Ob-*
seruatorum monitu : nec tùm etiàm rescidif-
sem, nisi aut auaritiæ fortassis, aut liuoris in-
dictum Pharmacopolam notam vtpotè nouus
Medicus incurrere timuisssem) nolle scilicèt al-
icui *Mercurium* administrare, nisi quē & meis
ipsius manibus parassem, & ponderassem, &
exhibuisssem. Quocircà solliciti Chirurgi, præ-
sertim *Astenses*, iudodoratis per artem nostram
factis curationibus, vbique apud Pharmaceuti-
cos Camomelanos meum, Panaceã meam, Se-
cretum meum auidè perqueſierũt ignari, quòd,
iuxtà *Gerbeſium* *Secreta Medicorum sunt artifi-*
ciosa curandi methodus. Quam ideò methodum
quoniàm ipsos edocere nequeo stantibus tot di-
uersitatibus sexvum, etatũ, temperamentorũ,
anni temporum, morborum coniunctorum,
symptomatũ &c. quæ cognitu necessaria sunt,
neque

neque explicatu facilia, parcāt curiosi Viri, ni-
hic inueniant: Cum verò ista non calleant, mi-
ror Luem *Veneream* omnium ægritudinum,
compendium, malum omniuarium, Prothei-
forme, curatu difficilimum Chirurgiæ concre-
ditum; miror, inquam, non tām Chirurgos,
quàm vel Barbitonfores, vel circumforaneos,
vel Obstetrices ipsas hanc Prouinciam sibi
adrogasse; et sic minorem stuporem esse ipsos
quę non inrelligunt, Secreta vocare! Meum
quod attinet *Mercurium*; purissimus hic est,
purgatissimus, cūm lymphæ sanguinæ spiri-
tu, tanquàm menstruo appropriato, sublima-
tus, & ritè essentificatus. Vbi licet aduer-
tere, *Mercurium* quó simpliciore eó melio-
rem existere: cūmque Argentum viuū apud
nos vsuenire non debeat, quód pondere suo
alium semper petit, non verò quód noxium
sit [contrarium nempè ostendentibus *Ægin-
eta*, *Auicenna*, *Mathiolo*, atque è recentio-
ribus *Moinichen*, *Lanzono* &c.] propior pro-
indè cruditati querenda præparatio, ad hoc
vt ex hac *Mercurius* minus amittat illius
analogiæ, quàm habet cum lymphâ san-
guinis præfata. Etsi itaque sublimatio, simpli-
cissima sit eiusdem alteratio, studendum ni-
hilominus, vt quæ ex eâ deperditur sulphu-
ris

ris mercurialis portio, eidem per aliud menstruum restituatur V. g. per spiritum urinae post dissolutionem &c. Vnde colliges scopum non attingere, qui Luem *Veneream* curare posse autumant vel panaceis suis, vel bezoardico minerali, pulvere Valgaroti, vel *Mercurio* dulci &c. Leuia quippè sunt hæc, & minùs fixa, quàm vt fixissimum virus pessundare valeant, vt consideranti patefcit. Vnum displicet in hoc opere, nempe quia, cum eiusmodi remedium ipse suis manibus distribuere [vt iam nouimus] Medicus teneatur, contingit sepe numero, quòd non præcedente pretio oleum is & operam perdere, vt aiunt, debeat; insuper, & si quidpiam erogetur, pro Medico fordidus, auarus audiat. Videbis nimirum Sycophantas, Pseudo-chirurgos, Apotecharios quosdam clàm, noctu, coniunctim, diuifim, amuffatim suffurantes Medicum illum criminari, quòd remedij sui æstimationem iniustam indixerit; interim, neque ad labores attendere, quos in præparatione tolerarit; neque ad incommoda in administrationibus: neque demùm ad id, quòd, si obolum fortuitò ab aliquo retulerit in principio (ad spem eius acuendam) subindè nihil ampliùs reportare, à pauperibus præ-

fertim soleat; & ab ijs qui fanitati restituti Medicum postea nec salutare ut plurimum dignantur; non attendant, inquam, Pseudo-Chirurgi, quod alia ipsos, alia Medicum decent; & ij quidem plebeculam in ius vocare, ad forum trahere vel pro sudatiuncula, aut decocto illi exhibito pro more habent; à quibus tamen Medicus abstinere debet. Quocirca fateor nihil iam mihi magis infestum esse, quam ut ad Luem *Venerream* curandam accersor, hoc est, quia Medici industria in hac cura non spectatur: nec eiusdem medicamentum compensatur; neque demum, pro mercede aliud, quam probrum illi porro rependitur. Verum de his satis. Quod remanet cure: signum mutati, liquati, euacuati veneni *Veneriei* ut plurimum est Febris aliqua Ephemera, prout locuti fuimus in Prognosticis: nec reticebo heic propterea, quatinus intercurandum aliquos extrema macie perditos, cum superueniente ea febre alij Medici ad Consultationem conuocati Aegrotos pro deploratis renunciaissent, verso tandem in melius omine dicti poenituerit, utque antea me contra reclamantem certamque ex Febri illa valetudinem pollicentem effuderiserant, iamiam expulsa Lue risum in,
ad-

utile pour se faire & se conseruer des amis.,

Spuriam quod concernit Luem: notum fecimus, vel leuissimis *Antiueneris* hanc expelli; addo nunc, vel solis *Purgantibus*. Tu nihilominus *Mercurium*, si opus fuerit, his adiunges istud in mente habens. videri bolos, pilulas, opiatas & reliqua mercurialia non alterius Luis gratiâ inuēta: in formâ, inquam, solida, ne *Mercurius* Gingiuas attingendo Dentibus obesse queat. Formulas de ijs Nos nonnullas dedimus in superioribus suplementi causa potius, quàm vt existimarem eas tradere necesse esse; et cum quiuus Tonfor & Agyrta suas habeat sibi peculiare, communes verò in Libris vulgo prostent innumeræ. Mulieribus nihilominus, & quibuscunque. assiduus *Mercurij* vsus non cōpetit, quiue non nisi mastitando solida deglutire solent, hæc insupèr concedenda.

Rx. lign. Gayac. ℥ cortic. eiusdem a 3. ℞. fals. parill. 3iij; ialap. 3ij; sem. fenicul. ℥ anis. a 3. ℞. f. omnium puluis subtiliss. in 8. dos diuidend. & sumend. M. in liquore appropriato.

Hinc etenim licet vnus vel alter bolus, aut pilula *Mercurialis* identidē masticaretur, operante nihilominus sequentibus diebus hoc pul-

pulvere noxa ex *mercurio* quolibet dissipari potest, interim & curationis opus vrgeri &c. Coeteró, substituitur in Tabidis & Macilentis loco Gayaci & sarsaparillæ lignum sassafras, aut radix chinæ, aut vtrumque, imò & aliud quicquid hætenus à *Pudendagrológicis* magni fieri consuevit, vt Iuniperus, radix Angelicæ, lignum aloeticum, aristolochia, folia centaureæ minoris &c. Quod Topica; siquidè nil æquè ferum comperi in hac Lue, atque in Mulieribus Mammarum tubercula exulcerata, vacandum protinùs horum expugnationi. Ego ad hunc finem vel maximè conduxisse noui linimentum suprà, pag. 91. ad *Penis* vlcera commendatum, non neglectis tamen sempèr medicaminibus internis, iuxtà modò indicata. Quotiescunque verò rebelles tumores accidunt in hac Lue, præsertim exoletâ (prout foeminis continuò fit) prudentis est ad ea confugere, quæ paria morbo censentur, curamque instituere qualem in Lue *Legitima* proposuimus.

Denique in *Hereditaria* me gerere soleo hoc pacto. Infantem excoriatum, aut rimosum aquâ alibi etiàm descriptâ (*cap. 2. pag. 58.*) abluendum præcipio; mòx, quia Nutrices se penumeró pocillari nolunt, puluerem conficio,

ficio ex lignis præcitatis, ialappæ tantillo, corall. rubris, C. C. & ocul. cancr. præpar., cuius quantum summis primis digitis præhendi potest semel, bis, terue in diem osculo imponi iubeo quùm lactandus est pufio; interim pro certiori istius curatione & pro Nutricis præferuatione huic *Mercuriale* aliquid, vel *purgans*, aut *diaphoreticum* &c. cum aliquo prætextu [nam summâ opus arte) identidem ingerens, aut propinans: nec recensebo profectò pueros, de quorum vita quilibet ne hilum quidém [vt aiebant] persoluisset, tali nihilominus methodo ità curatos, vt pleni, pingues succulenti facti ipsis parentibus aliena specie imposuerint. Quanquàm aliàs Infantibus quòque vnius, alteriusue mensis, aut paucarum septimanarū securè omninò *Mercurius* dulcis propinari valet *a. gr. ij.*, vel *ij.* per tres aut quatuor septimanas singulis, aut alternis diebus, sicque *malum* (inquit *Bobonius*) *ad miraculum sanet*, qualia experimenta mecum testantur alij, v. g. *Riuerus* & *Rhodius* ex relatione *Schlegelij*. Sed Lues hæc ex Matre: quæ á Nutrice sui interdum malè conscia procedunt incommoda Febriculæ sunt, morbi chronici, contumaces, Vigiliæ, Marcescentiæ, Dolores vagi, Scabies & Pustulæ *Inguen* præfertim

sertim ad orientes & similia, quorum diagnofin fuo loco tradidimus; neque aliter curantur, quàm vt Lues *Spuria*, refpectu tamen, fempèr habito ad Puelli vires, & morbi diritatem. Vltimò à Genitore oriundi Herpetes, Scabies, Scrophulæ, Arthiritis, Epilepfia alijque huiusmodi affectus quandoquidè iam iam non aliter, quàm per *Mercurium* curari folent, recepta iam emiffa eft. Et quod *Pedarthrocaces* [fpinas ventofitatis) has non rarò internè decoctis ex lignis exoticis, potiffimùm verò *Saffafras* & radice chinæ [ob tabem, ad quam fempèr procliues funt tali morbo detenti] externè verò oleo *cariophyllorum*, alijque offium cariem impredientibus amuletis, DEO auxiliante, fuftulimus.

Porro autèm qualis effe debeat dieta Lue *Venerea* laborantium neminem latere opinor. Laudauimus iam fuprà aeris caliditatem, laudauimus & commeffationes, laudamus nunc & potum vini imprimis meracioris. Narrat *Emanuel Aranda* vti miles fibi perfpectus Algerij ex vfu egregij huiusce medicamenti, & ex laboribus, quos in Triremibus perdurauerat, à tam truculento morbo incolumis euaferat. Exercitationes igitur etiàm præ quiete conducunt, vt & vigilie præ fomno. Et quod excern-

IV.
Cura Di
ætetica

cernenda è corpore : mirum alicui videbitur de *U. Sectione* à me nihil vnquàm enunciatum. Sed nihil de ea effatus sùm, quia non referebat. Nàm si omni iure in tali morbo damnanda est *Phlebotomia*, vt quæ sanguinem inspissat, Virus fixat, vires prosternt &c. quorsum ego illam in campum veluti induxissem? Celebranda nihilominus, quotiescunque ex *Mercurio* malum aliquod formidatur, vt inflammatio, Corrosio, Suffocatio; aliàs, valeat [loquar cum Clarissimo *Wlpino Astense*] valeat cum suis Defensoribus. Ultimò, Animi pathemata, rectis *Ægri* moderentur habenis. Vitentur affectus, grauiore, Ira, Excandescencia, Tristitia, ac imprimis, quæ omnia mala grauiora efficit, Impatientia. Tùm etiàm metus Mortis ab adstantibus prudenti ratione & conuersatione auertendus, quo æger moderato gaudio tanto fælicius vigeat.

Jámque *his supremum Nos fabulæ actum addidimus*, cum *Tullio*.

FINIS

